

Գ.Գ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Լ.Յ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, Ա.Կ. ԹԱՍԼԱՔՅԱՆ,  
Գ.Վ. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ, Կ.Ա. ՆԱԿԱՍԱՐԴՅԱՆ



# ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գ. Գ. Գևորգյան Լ. Հ. Գալստյան Ա. Կ. Թասլաքյան  
Գ. Վ. Միքայելյան Կ. Ա. Նավասարդյան

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ  
ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ

Առաջին մաս

Չորրորդ լրամշակված  
հրատարակություն

Երևան  
ԵՊՀ հրատարակչություն  
2014

Երաշխավորված է ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից  
որպես բուհերի ուսումնական ձեռնարկ

ՀՏԳ- 517(076.1)

ԳՄԳ- 22.161 ց7

Մ 151

Մ 151 Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք/ Գ. Գ. Գևորգյան , Լ. Հ.  
Գալստյան, Ա. Կ. Թապալբյան, Գ. Վ. Սիքալեյան, Կ. Ա. Նա-  
վասարյան.- 4-րդ լրամշ. հրատ. -Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014.  
Մաս 1.- 266 էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի  
ֆիզիկամաթեմատիկական և բնագիտական  
ֆակուլտետների համար:

ՀՏԳ- 517(076.1)

ԳՄԳ- 22.161 ց7

ISBN 978-5-8084-1833-2

© ԵՊՀ հրատ., 2014

© Գևորգյան Գ.Գ. և ուրիշ., 2014

## Չորրորդ հրատարակության նախաբան

Այս հրատարակությունը պարունակում է նախորդ հրատարակությունների՝ ըստ էության բոլոր խնդիրներն ու վարժությունները:

Որոշ բաժինների Ա խմբերը լրացվել են մեթոդական առումով կարևոր նոր վարժություններով: Նույն նկատառումով կատարվել են մի շարք վարժությունների և խնդիրների վերադասավորում, ձևակերպումների փոփոխություններ և շտկումներ: Ինչ-որ չափով թարմացվել է խնդիրներին նախորդող տեսական նյութը:

Լսարանում աշխատելու ընթացքում տեքստերում և պատասխաններում նկատվել են որոշ անճշտություններ և վրիպակներ, որոնց ուղղումները մեզ ներկայացրել են ամբիոնի աշխատակիցներ Ա. Մ. Հակոբյանը, Մ. Ս. Մարտիրոսյանը և Մ. Պ. Պողոսյանը: Նրանց հայտնում ենք մեր անկեղծ երախտագիտությունը:

Երևան, 2014թ.

Հեղինակներ

## Առաջին հրատարակության նախաբան

Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացվող «Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրքը» հայերենով համապարփակ և ծավալուն ժողովածուի հրատարակման առաջին փորձն է: Այն ընդգրկում է համալսարանների առաջին և երկրորդ կուրսերի ծրագրով նախատեսված մաթեմատիկական անալիզի գրեթե բոլոր բաժինները:

Խնդրագիրքը լույս է տեսնում երկու հատորով: Առաջին հատորը նվիրված է թվային հաջորդականություններին ու մեկ փոփոխականի իրականարժեք ֆունկցիաների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվին: Երկրորդ հատորում շարադրվում են խնդիրներ և վարժություններ՝ շարքերի (այդ թվում աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերի), անվերջ արտադրյալների, պարամետրից կախված ինտեգրալների, շատ փոփոխականի ֆունկցիաների դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի ու Ստիլտեսի ինտեգրալի վերաբերյալ:

Խնդրագրքում անալիզի յուրաքանչյուր ամբողջական բաժին ներկայացված է առանձին գլխով, որն սկսվում է անհրաժեշտ տեսական նյութի սեղմ շարադրանքով: Յուրաքանչյուր գլուխ տրոհված է հիմնականում ըստ խնդիրների բարդության, Ա, Բ և Գ խմբերի: Ա խմբի վարժությունների զգալի մասը վերցված է Բ.Պ. Դեմիդովիչի «Сборник задач и упражнений по математическому анализу» դասական ժողովածուից: Ուսումնական գործընթացում դրանց օգտակարությունը հաստատված է տասնամյակների փորձով: Նույն այդ խնդրագրքի որոշ խնդիրներ, որոնք տեղ են գտել նաև Բ և Գ խմբերում, մեր կողմից շտկվել են, վերստին համակարգվել, լրացվել են անհրաժեշտ ընդհանրացումներով և հակադարձ խնդիրներով: Գ խմբի խնդիրներից շատերը հետազոտական բնույթի են և դրանց հաղթահարումը երբեմն մեծ հմտություն է պահանջում: Այդ խնդիրներն ընտրված են Գ. Պոլիայի և Գ. Սեզոյի «Задачи и теоремы из анализа» հայտնի խնդրագրքից, միջազգային ուսանողական մաթեմատիկական տարբեր օլիմպիադաների առաջադրանքներից, ինչպես նաև մի շարք այլ հայտնի աղբյուրներից, որոնց ցուցակը բերված է երկրորդ հատորի վերջում:

Նշենք, որ Գ խմբի խնդիրները հիմնականում նախատեսված են ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետներում կազմակերպվող արտալսարանային պարապմունքների կամ ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի համար:

Վերջին տարիներին տեսաբանական, տոպոլոգիական և հանրահաշվական տարբեր հասկացությունների բուռն ներթափանցումը մաթեմատիկա-

կան անալիզ մի շարք սահմանումների և թեորեմների նոր, արդիական շունչ է հաղորդել: Մենք փորձել ենք, իհարկե խուսափելով ավելորդ ծայրահեղություններից, թե՛ տեսական նյութի և թե՛ խնդիրների շարադրանքում հետևել ժամանակակից ոճին: Մասնավորապես, ֆունկցիայի անընդհատության, դիֆերենցիալի այստեղ բերված սահմանումները տարբերվում են Գ. Մ. Ֆիխտենգոլցի «Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթացում» տրված սահմանումներից: Հրաժարվել ենք մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի բարձր կարգի դիֆերենցիալների անպատու գաղափարից: Երկրորդ հատորում, սահմանելով հաշվելի բազմության և գրո չափի բազմության գաղափարները, հնարավորություն ենք ստացել շարադրելու բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք առաջին և երկրորդ կուրսերում ավանդաբար օգտագործվող խնդրագրքերում երբևէ չեն ընդգրկվել:

Խնդիրների և վարժությունների դասակարգման լայն սպեկտրը հնարավորություն է տալիս խնդրագիրքն օգտագործել ոչ միայն ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետներում, այլև տեխնիկական բուհերում և բնագիտական այն ֆակուլտետներում, որտեղ դասավանդվում է *մաթեմատիկական անալիզ* առարկան:

Գրքի ձեռագիրն ընթերցվել և քննարկվել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկական անալիզի, կիրառական անալիզի, ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոններում: Առանձնապես օգտակար են եղել Ռ. Ա. Ավետիսյանի, Ռ. Ս. Դավթյանի, Ս. Ա. Հակոբյանի և Լ. Վ. Սիքայելյանի դիտողություններն ու առաջարկությունները: Մենք մեր անկեղծ երախտագիտությունն ենք հայտնում ոչ միայն նրանց, այլև մեր բոլոր այն գործընկերներին, որոնց բարեկամական աջակցությունն էապես նպաստել է գրքի լույս ընծայմանը:

Երևան, 1998թ.

Հեղինակներ

# Գլուխ 1

## Թվային բազմություններ, տարրական ֆունկցիաներ

Բազմությունները հիմնականում նշանակվում են լատիներենի մեծատառերով: Այն փաստը, որ  $a$ -ն  $A$  բազմության տարր է, գրվում է  $a \in A$  ( $a$ -ն պատկանում է  $A$ -ին) տեսքով: Նույն փաստի բացասման համար օգտագործվում է  $a \notin A$  ձևը:

Եթե  $A$  բազմության յուրաքանչյուր տարրը պատկանում է նաև  $B$  բազմությանը, ապա  $A$ -ն անվանում են  $B$ -ի ենթաբազմություն և գրում՝  $A \subset B$  կամ  $B \supset A$  ( $A$ -ն ընկած է  $B$ -ի մեջ,  $A$ -ն պարունակվում է  $B$ -ում կամ  $B$ -ն պարունակում է  $A$ -ն):

Տե ս ա բ ա զ մ ա կ ա ն զ ո թ ծ ո ղ ո թ յ ու ն ն ե թ :  $A$  և  $B$  բազմությունների միավորումը  $(A \cup B)$  բազմություն է, որը կազմված է այն տարրերից, որոնք պատկանում են  $A$  և  $B$  բազմություններից գոնե մեկին:  $A$  և  $B$  բազմությունների հատումը  $(A \cap B)$  բազմություն է, որը կազմված է այն տարրերից, որոնք պատկանում են թե՛  $A$ -ին և թե՛  $B$ -ին:  $A$  և  $B$  բազմությունների տարբերությունը  $(A \setminus B)$  կազմված է  $A$ -ի այն տարրերից, որոնք չեն պատկանում  $B$ -ին: Ոչ մի տարր չպարունակող բազմությունը կոչվում է դատարկ բազմություն և նշանակվում՝  $\emptyset$ :

Բազմությունը, որի տարրերը բազմություններ են, կանվանենք ընտանիք:  $\alpha$  ընտանիքի միավորումը՝  $\bigcup \alpha$ -ն, այն տարրերի բազմություն է, որոնք պատկանում են  $\alpha$  ընտանիքի բազմություններից առնվազն մեկին:  $\alpha$  ընտանիքի հատումը՝  $\bigcap \alpha$ -ն, այն տարրերի բազմությունն է, որոնք պատկանում են  $\alpha$  ընտանիքի բազմություններից յուրաքանչյուրին:

Մաթեմատիկական տեքստերում հանդիպող “ցանկացած” և “գոյություն ունի” արտահայտությունների փոխարեն հաճախ օգտագործվում են համապատասխանաբար  $\forall$  և  $\exists$  նշանները: Օրինակ,  $\forall x \in A \exists y \in B (x + y = 1)$  արտահայտությունը կարդացվում է՝  $A$  բազմությանը պատկանող ցանկացած  $x$  տարրի համար գոյություն ունի  $B$ -ին պատկանող  $y$  տարր, այնպիսին, որ ճշմարիտ է  $x + y = 1$  հավասարությունը:

$A$  բազմության այն տարրերի ենթաբազմությունը, որոնք բավարարում են  $P$  պայմանին, նշանակվում է՝  $\{x \in A : P\}$ : Մասնավորապես,  $\{x \in A : x > 0\}$ -ն  $A$ -ին պատկանող դրական թվերի բազմությունն է, իսկ  $\{x \in A : x \notin B\}$ -ն վերը սահմանված  $A \setminus B$  բազմությունն է:

Եթե  $\alpha$  ընտանիքի բազմություններն ինդեքսավորված են, օրինակ  $\alpha = \{A_n : n \in N\}$ , ապա  $\bigcup \alpha$ -ի և  $\bigcap \alpha$ -ի համար օգտագործվում են նաև  $\bigcup_{n \in N} A_n$  և  $\bigcap_{n \in N} A_n$  նշանակումները:

Ստորև շարադրվելիք խնդիրներում և վարժություններում հանդիպում են բազմությունների նշանակման այն, ավելի կրճատ ձևեր: Օրինակ,  $\{m \in N : \exists k \in N (m = 4k)\}$  բազմության համար հավասարապես օգտագործվում են ինչպես  $\{4k\}_{k \in N}$ , այնպես էլ  $\{4k : k \in N\}$  նշանակումները: Եթե բազմությունը վերջավոր է (կազմված է վերջավոր թվով տարրերից), ապա այն կարող է ներկայացվել ձևավոր փակագծերով, որոնց ներսում մեկ առ մեկ, ստորակետերով անջատված, նշված են այդ բազմության բոլոր տարրերը: Մասնավորապես,  $\{a\}$ -ն միայն  $a$  տարրից կազմված բազմությունն է:

Թվային բազմությունների օրինակներ: Բազմությունը, որի տարրերը թվեր են, կոչվում է թվային բազմություն: Մաթեմատիկական անալիզում առավել հաճախ հանդիպող թվային բազմություններից են՝

$$R = (-\infty; +\infty) \text{ (իրական թվեր):}$$

$$N = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\} \text{ (բնական թվեր):}$$

$$Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n, \dots\} \text{ (ամբողջ թվեր):}$$

$$Q = \left\{ \frac{p}{q} : p \in Z, q \in N \right\} \text{ (ռացիոնալ թվեր):}$$

$$I = R \setminus Q \text{ (իրացիոնալ թվեր):}$$

$$[a; b] = \{x \in R : a \leq x \leq b\} \text{ (փակ միջակայք կամ հատված):}$$

$$(a; b) = \{x \in R : a < x < b\} \text{ (միջակայք կամ բաց միջակայք):}$$

$$\begin{aligned} [a; b) &= \{x \in R : a \leq x < b\} \\ (a; b] &= \{x \in R : a < x \leq b\} \end{aligned} \text{ (կիսաբաց կամ կիսափակ միջակայքեր):}$$

$$\begin{aligned} (a; +\infty) &= \{x \in R : x > a\} \\ [a; +\infty) &= \{x \in R : x \geq a\} \\ (-\infty; a) &= \{x \in R : x < a\} \\ (-\infty; a] &= \{x \in R : x \leq a\} \end{aligned} \text{ անվերջ բաց, փակ միջակայքեր } \\ \text{կամ ճառագայթներ:}$$

Ցանկացած  $A \subset R$  բազմության համար կնշանակենք.

$$A_- = \{x \in A : x \leq 0\}, \quad A_+ = \{x \in A : x \geq 0\};$$

$A \subset R$  բազմության համար  $R \setminus A$  բազմությունը կոչվում է  $A$ -ի լրացում և նշանակվում  $A^c$ :

Թվային բազմությունների հանրահաշվական գումարը ( $A+B$ ) և արտադրյալը ( $A \cdot B$ ) սահմանվում են հետևյալ ձևով.

$$A+B = \{a+b : a \in A, b \in B\}, \quad A \cdot B = \{ab : a \in A, b \in B\};$$

Եթե  $A = \{a\}$ , ապա  $\{a\} \cdot B$  գրելու փոխարեն գրում են  $aB$ : Ընդունված են նաև հետևյալ նշանակումները.  $a+A = \{a\}+A$ ,  $-A = (-1) \cdot A$ ,  $A-B = A+(-B)$ :

Գեկարտյան արտադրյալ: Կամայական  $a$  և  $b$  թվերի համար  $(a, b)$  զույգն անվանում են կարգավորված զույգ, նկատի ունենալով, որ եթե  $a \neq b$ , ապա  $(a, b) \neq (b, a)$ :

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$  կարգավորված զույգերի բազմությունը կոչվում է  $A$  և  $B$  բազմությունների *դեկարտյան արտադրյալ*: Ցանկացած  $P \subset A \times B$  ենթաբազմության համար

$$P_A = \{a \in A : \exists b \in B ((a, b) \in P)\} \text{ և } P_B = \{b \in B : \exists a \in A ((a, b) \in P)\}$$

բազմությունները կոչվում են  $P$  բազմության պրոյեկցիաներ համապատասխանաբար  $A$ -ի և  $B$ -ի վրա: Մասնավորապես՝  $(A \times B)_A = A$ ,  $(A \times B)_B = B$ :

Դեկարտյան արտադրյալի օրինակ է դեկարտյան հարթությունը: Այն իրենից ներկայացնում է  $Ox$  և  $Oy$  թվային առանցքների դեկարտյան արտադրյալը: Այս դեպքում հարթության յուրաքանչյուր կետ ընդունված կարգով նույնացվում է որոշակի  $(x, y)$  կարգավորված թվազույգի հետ, որում  $x$ -ը կոչվում է այդ կետի աբսցիս, իսկ  $y$ -ը՝ օրդինատ:



$A \times A$ -ի փոխարեն հաճախ գրում են  $A^2$  : Մասնավորապես, դեկարտյան հարթության համար ընդունված է  $R^2$  նշանակումը, որտեղ  $R$ -ը իրական թվերի բազմությունն է:

Ս ա հ մ ա ն ա փ ա կ ր ա զ մ ու թ յ ու ն ն ե ր :  $A$  թվային բազմությունը կոչվում է *վերևից (ներքևից) սահմանափակ*, եթե  $\exists M \in R \forall x \in A (x \leq M)$  ( $\exists m \in R \forall x \in A (x \geq m)$ ): Եվ վերևից և՛ ներքևից սահմանափակ բազմությունն անվանում են *սահմանափակ բազմություն*:

Եթե  $M_0$  թիվն այնպիսին է, որ

$$\forall x \in A (x \leq M_0) \text{ և } \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 \in A (x_0 > M_0 - \varepsilon),$$

ապա  $M_0$ -ն անվանում են  $A$  բազմության *ճշգրիտ վերին եզր* և նշանակում՝  $M_0 = \sup A$ : Նույն ձևով, եթե գոյություն ունի  $m_0$  թիվ այնպիսին, որ

$$\forall x \in A (x \geq m_0) \text{ և } \forall \varepsilon > 0 \exists x_0 \in A (x_0 < m_0 + \varepsilon),$$

ապա այն կոչվում է  $A$  բազմության *ճշգրիտ ստորին եզր* և նշանակվում՝  $m_0 = \inf A$ :

Թեորեմ: Վերևից (ներքևից) սահմանափակ ցանկացած ոչ դատարկ բազմություն ունի ճշգրիտ վերին (ստորին) եզր:

Եթե  $A$ -ն սահմանափակ չէ վերևից (ներքևից), ապա պայմանավորվում ենք գրել՝  $\sup A = +\infty$  ( $\inf A = -\infty$ ):

Բ ա ց, փ ա կ ր ա զ մ ու թ յ ու ն ն ե ր: Կ ու տ ա կ մ ա ն կ ե տ: Թվային բազմության տարրերը հաճախ անվանում են կետեր:

Տրված  $x_0$  կետի և  $\varepsilon > 0$  թվի համար  $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$  միջակայքը կոչվում է  $x_0$ -ի  $\varepsilon$ -*շրջակայք* կամ ուղղակի՝  $x_0$ -ի շրջակայք: Երբեմն  $(-\infty; a)$ ,  $(a; +\infty)$  և  $(-\infty; a) \cup (a; +\infty)$  բազմություններն անվանում են համապատասխանաբար  $-\infty$ -ի,  $+\infty$ -ի և  $\infty$ -ի շրջակայքեր:

$A$  բազմության  $a$  կետը կոչվում է այդ բազմության *ներքին կետ*, եթե գոյություն ունի  $a$ -ի շրջակայք, որը պարունակվում է  $A$ -ում:  $A$ -ն կոչվում է *բաց բազմություն*, եթե նրա բոլոր կետերը ներքին կետեր են: Բաց բազմության պարզագույն օրինակներ են վերջավոր կամ անվերջ բաց միջակայքերը:

Բազմությունը կոչվում է *փակ*, եթե նրա լրացումը բաց է:

Բազմության լրացման ներքին կետերն այդ բազմության համար կոչվում են *արտաքին կետեր*:

Եթե  $a$  կետի ցանկացած շրջակայք պարունակում է կետեր թե՛  $A$ -ից և թե՛  $A^c$ -ից, ապա  $a$ -ն անվանում են  $A$  բազմության *եզրային կետ*:  $A$  բազմության եզրային կետերի բազմությունն անվանում են  $A$ -ի *եզր* և նշանակում՝  $\partial A$ :

Եթե  $x_0 \in R$  կետի ցանկացած շրջակայքում կա  $x_0$ -ից տարբեր առնվազն մեկ կետ  $A$ -ից, ապա  $x_0$ -ն անվանում են  $A$  բազմության *սահմանային* կամ *կուտակման կետ*:  $A$  բազմության կուտակման կետերի բազմությունը նշանակում են  $A'$ , իսկ  $\bar{A} = A \cup A'$  բազմությունն անվանում են  $A$ -ի *փակում*:

$A \setminus A'$  բազմության կետերն անվանում են  $A$  բազմության *մեկուսացված կետեր*:

Ս ա թ ե մ ա տ ի կ ա կ ա ն ի ն դ ու կ ց ի ա յ ի ս կ զ ր ու ն ք ր : Բնական թվերի համար որևէ պնդում համարվում է ապացուցված, եթե՝

ա)  $n = 1$  թվի համար պնդումը ճշմարիտ է;

բ) ենթադրելով, որ պնդումը ճշմարիտ է  $n$ -ից փոքր բոլոր բնական թվերի համար, կարելի է ապացուցել, որ այն ճշմարիտ է նաև  $n$ -ի համար:

Ընդունված նշանակումներ են՝

$$0! = 1, 1! = 1, n! = n \cdot (n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, n \in N \text{ ( } n \text{ ֆակտորիալ)};$$

$$\left. \begin{aligned} 2!! &= 2, (2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n, n \in \mathbb{N}, n > 1 \\ 1!! &= 1, (2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n+1), n \in \mathbb{N} \end{aligned} \right\} \text{(կիսաֆակտորիալներ);}$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n, k \in \mathbb{Z}_+, \quad k \leq n \text{ (զուգորություն } n \text{-ից } k \text{-ական):}$$

Ֆուկցիոնալի գաղափարը: Դիցուք  $X$ -ը և  $Y$ -ը ոչ դատարկ բազմություններ են: Եթե  $X$  բազմության յուրաքանչյուր  $x$  տարրին համապատասխանեցված է  $Y$  բազմության որոշակի մեկ  $y$  տարր, ապա ասում են, որ տրված է  $f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիա, որի համար  $X$ -ը որոշման տիրույթն է, իսկ  $Y$ -ը՝ փոփոխման տիրույթը: Սովորաբար այն միակ  $y$ -ը, որը համապատասխանում է  $x \in X$  տարրին, նշանակում են  $f(x)$ : Հաճախ  $x$  փոփոխականն անվանում են *արգումենտ*, իսկ  $f(x)$ -ը՝  $x$  կետում ֆունկցիայի արժեքը: Ընդունված է նաև  $f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիան անվանել  $X$  բազմության *արտապատկերում*  $Y$ -ի մեջ:  $Y_0 = \{f(x) : x \in X\}$  բազմությունը կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի *արժեքների բազմություն*: Այդ կապակցությամբ ասում են նաև, որ  $f$ -ը  $X$  բազմությունն *արտապատկերում է*  $Y_0$ -ի վրա: Ֆունկցիան, որի արժեքների բազմությունը բաղկացած է միայն մեկ տարրից, կոչվում է *հաստատուն ֆունկցիա*:

Ընդունված նշանակումներ են՝

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \quad (A \subset X \text{ բազմության պատկեր});$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \quad (B \subset Y \text{ բազմության նախապատկեր}):$$

Ֆունկցիան կոչվում է *փոխմիարժեք* (*հակադարձելի*), եթե որոշման տիրույթի տարբեր կետերում ընդունում է տարբեր արժեքներ: Դիցուք  $f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիան  $X$ -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է  $Y$ -ի վրա: Այդ դեպքում յուրաքանչյուր  $y \in Y$  տարրին համապատասխանեցնելով այն միակ  $x$ -ը, որի համար  $f(x) = y$ , ստանում ենք  $Y$ -ը  $X$ -ի վրա արտապատկերող ֆունկցիա, որը կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի *հակադարձ ֆունկցիա* և նշանակվում  $f^{-1}: Y \rightarrow X$ :

Տրված  $f: X \rightarrow Y$  և  $g: Y \rightarrow Z$  ֆունկցիաների  $g \circ f: X \rightarrow Z$  վերադրումը (բարդ ֆունկցիան) սահմանվում է հետևյալ բանաձևով.  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ,  $x \in X$ :

Իրական փոփոխականի փոփոխման ֆունկցիաներ են, ապա  $f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիան ընդունված է անվանել *իրական փոփոխականի իրականարժեք ֆունկցիա*:

$f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիան կոչվում է *աճող* (*չնվազող*, *նվազող*, *չաճող*), եթե  $x_1, x_2 \in X$  և  $x_1 < x_2$  պայմաններից հետևում է, որ  $f(x_1) < f(x_2)$  (համապատասխանաբար՝  $f(x_1) \leq f(x_2)$ ,  $f(x_1) > f(x_2)$ ,  $f(x_1) \geq f(x_2)$ ): Այս չորս տիպի ֆունկցիաները միասին կոչվում են *մոնոտոն ֆունկցիաներ*:

$f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիան կոչվում է՝

- ա) *գույգ ֆունկցիա*, եթե  $X = -X$  և  $\forall x \in X \quad (f(-x) = f(x))$ ;
- բ) *կենտ ֆունկցիա*, եթե  $X = -X$  և  $\forall x \in X \quad (f(-x) = -f(x))$ :

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$  ֆունկցիան կոչվում է *պարբերական* ( $T$ -*պարբերական*) ֆունկցիա, եթե  $\exists T \neq 0$  այնպիսին, որ  $X+T = X$  և  $\forall x \in X \quad (f(x+T) = f(x))$ : Այդ դեպքում  $T$ -ն անվանում են *պարբերություն*:

Գեկարտյան հարթության վրա  $\{(x, f(x)): x \in X\}$  կարգավորված գույգերի բազմությունն անվանում են  $f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիայի գրաֆիկ:

Գեկարտյան և բևեռային կոորդինատներն են համապատասխանաբար բևեռային և դեկարտյան կոորդինատների համակարգերում, ապա  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ :

## Ա

1. Գտնել  $A$  և  $B$  բազմությունների միավորումը.

ա)  $A = \{-2, 1, 3, 7\}$ ,  $B = \{0, 1, \sqrt{2}, 7, 9\}$ ;

բ)  $A = [1; 4]$ ,  $B = [3; 6]$ ;

գ)  $A = [2; 3]$ ,  $B = [3; 4]$ ;

դ)  $A = (-\infty; 0)$ ,  $B = [0; +\infty)$ ;

ե)  $A = \mathbb{Q}$ ,  $B = \mathbb{I}$ ;

զ)  $A = \{2k : k \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{2k - 1 : k \in \mathbb{N}\}$ :

2. Գտնել  $A$  և  $B$  բազմությունների հատումը.

ա)  $A = \{-1, 2, 3, 8\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ;

բ)  $A = [-3; 2]$ ,  $B = (0; 4]$ ;

գ)  $A = [0; 2]$ ,  $B = (0; 4]$ ;

դ)  $A = (3; 7]$ ,  $B = (7; 11)$ ;

ե)  $A = \mathbb{Z}$ ,  $B = (-5; +\infty)$ ;

զ)  $A = \mathbb{Q}$ ,  $B = \mathbb{I}$ ;

է)  $A = (-\infty; 7]$ ,  $B = \{n^2 - 9 : n \in \mathbb{N}\}$ :

3. Գտնել  $A$  և  $B$  բազմությունների տարբերությունը.

ա)  $A = \{-3, 2, 1\}$ ,  $B = \{-5, -3, 1, 4, 6\}$ ;

բ)  $A = [5; 11]$ ,  $B = (7; 9)$ ;

գ)  $A = [2; 7]$ ,  $B = (3; 4]$ ;

դ)  $A = \mathbb{Z}_+$ ,  $B = \mathbb{N}$ ;

ե)  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = \mathbb{I}$ ;

4. Գտնել բազմության լրացումը.

ա)  $[0; 1]$ ,

բ)  $(-\infty; 3)$ ,

գ)  $(-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$ ,

դ)  $\mathbb{I}$ ,

ե)  $(-3; -1) \cup (1; 3)$ ,

զ)  $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 = 0\}$ :

5. Գտնել  $A = \{4k : k \in \mathbb{N}\}$  և  $B = \{6k : k \in \mathbb{N}\}$  բազմությունների հատումը:

6. Գտնել  $\{3k\}_{k \in \mathbb{Z}_+}$ ,  $\{3k + 1\}_{k \in \mathbb{Z}_+}$  և  $\{3k + 2\}_{k \in \mathbb{Z}_+}$  բազմությունների միավորումը:

7. Ցանկացած  $p \in \mathbb{N}$  թվի համար գտնել  $\{pk + n\}_{k \in \mathbb{Z}_+}$ ,  $n = 0, 1, \dots, p - 1$ , բազմությունների միավորումը:

8. Գտնել  $A$  և  $B$  բազմությունների հանրահաշվական գումարն ու տարբերությունը.

ա)  $A = [2; 5]$ ,  $B = [-3; 7]$ ;

բ)  $A = [0; +\infty)$ ,  $B = \mathbb{Z}$ ;

գ)  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = -\mathbb{N}$ :

9. Գտնել  $A$  և  $B$  բազմությունների հանրահաշվական արտադրյալը.

$$\text{ա) } A = \{1, 2\}, B = [-3; 1]; \quad \text{բ) } A = \{0\}, B = R; \quad \text{գ) } A = N, B = -N :$$

10. Դիցուք  $A$ -ն թվային բազմություն է: Ճշմարիտ են արդյոք  $A + A = 2A$ ,  $A - A = \{0\}$  հավասարությունները:

11. Դեկարտյան հարթության վրա պատկերել հետևյալ բազմությունները.

$$\text{ա) } [1; 4] \times [-2; 5]; \quad \text{բ) } (2; 3) \times ((-1; 2) \cup [4; 6]); \quad \text{գ) } (0; +\infty) \times (1; 3];$$

$$\text{դ) } Z \times R_+; \quad \text{ե) } R_+ \times Z; \quad \text{զ) } R_+^2; \quad \text{է) } Z^2 :$$

12. Դիցուք  $A$ -ն և  $B$ -ն թվային բազմություններ են: Ճշմարիտ են արդյոք  $A \times B = B \times A$ ,  $A \cdot A = A^2$ ,  $\{0\} \times B = \{0\}$  հավասարությունները:

13. Դիցուք  $P_x$ -ը և  $P_y$ -ը  $P \subset R^2$  բազմության պրոյեկցիաներն են, համապատասխանաբար  $Ox$  և  $Oy$  առանցքների վրա: Հետևյալ առնչություններից ո՞րն է ճշմարիտ կամայական  $P$  բազմության համար.

$$1) P_x \times P_y = P, \quad 2) P_x \times P_y \subset P, \quad 3) P_x \times P_y \supset P :$$

14. Դեկարտյան հարթության վրա պատկերել  $P = \{(x; y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  կարգավորված գույգերի բազմությունը, գտնել այդ բազմության  $P_x$  և  $P_y$  պրոյեկցիաները, հարթության վրա պատկերել  $P_x \times P_y$  արտադրյալը և համեմատել այն  $P$ -ի հետ:

\*\*\*

15. Ապացուցել, որ ցանկացած երկու ռացիոնալ թվերի գումարը, արտադրյալը և քանորդը (եթե բաժանարարը զրո չէ) ռացիոնալ թվեր են:

16. Ապացուցել, որ ցանկացած երկու իրարից տարբեր ռացիոնալ թվերի միջև գոյություն ունի երրորդը:

17. Դիցուք  $a, b, c, d \in N$  և  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ : Ստուգել, որ ցանկացած  $m$  և  $n$  բնական թվերի համար

$$\frac{a}{b} < \frac{ma + nc}{mb + nd} < \frac{c}{d} :$$

18. Ապացուցել, որ  $\sqrt{2}$  և  $\sqrt{3}$  թվերը իռացիոնալ են:

19. Ճշմարիտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու իռացիոնալ թվերի գումարը և արտադրյալը իռացիոնալ թվեր են:

20. Ապացուցել, որ եթե  $r \in Q$  և  $\alpha \in I$ , ապա  $r + \alpha \in I$ ,  $r - \alpha \in I$  և եթե  $r \neq 0$ , ապա  $r\alpha \in I$ :

21. Յույց տալ, որ ցանկացած  $r$  ռացիոնալ թիվ կարող է ներկայացվել որպես՝  
 ա) երկու իռացիոնալ թվերի գումար; բ) երկու իռացիոնալ թվերի արտադրյալ,  
 եթե  $r \neq 0$  :

22. Նկարագրել  $Q+Q$ ,  $I+Q$ ,  $I+I$ ,  $Q \cdot Q$  և  $I \cdot I$  բազմությունները:

23. Ապացուցել, որ եթե  $\alpha$ -ն և  $\beta$ -ն իռացիոնալ թվեր են, ապա  $\alpha + \beta$  և  $\alpha - \beta$  թվերից առնվազն մեկն իռացիոնալ է:

24. Յույց տալ, որ ցանկացած երկու իրարից տարբեր իռացիոնալ թվերի միջև կա երրորդը:

25. Ապացուցել, որ ցանկացած  $a$  և  $b$  թվերի համար տեղի ունեն`

$$\text{ա) } |a+b| \leq |a|+|b|; \quad \text{բ) } |a-b| \geq \left| |a|-|b| \right|$$

անհավասարությունները: Ստուգել, որ հավասարություն տեղի ունի այն և միայն այն դեպքում, երբ  $a \cdot b \geq 0$ :

\*\*\*

26. Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդով ապացուցել, որ ցանկացած  $a_1, a_2, \dots, a_n$  թվերի համար ճշմարիտ է

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$$

անհավասարությունը:

27. Կիրառելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի սկզբունքը՝ ապացուցել, որ ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի համար ճշմարիտ են հետևյալ հավասարությունները.

$$\text{ա) } 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2};$$

$$\text{բ) } 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6};$$

$$\text{գ) } 1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3};$$

$$\text{դ) } 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2;$$

$$\text{ե) } 1^3 + 3^3 + \dots + (2n-1)^3 = n^2(2n^2-1);$$

$$\text{զ) } \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right) = \frac{n+2}{2n+2};$$

$$\text{է) } \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!};$$

$$\text{ը) } \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1};$$

$$\text{բ) } \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2} x}{\sin \frac{x}{2}};$$

$$\text{ժ) } \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{n+1}{2} x}{\sin \frac{x}{2}};$$

28. Ստուգել, որ ցանկացած  $m, n \in \mathbb{N}$  ( $m \leq n$ ) թվերի համար՝

$$\text{ա) } C_n^m = C_n^{n-m}; \quad \text{բ) } C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}:$$

29. Ապացուցել Նյուտոնի երկանդամի բանաձևը.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \quad (n \in \mathbb{N}):$$

30. Օգտվելով Նյուտոնի երկանդամի բանաձևից՝ ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n; \quad \text{բ) } \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0;$$

$$\text{գ) } (1+x)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} x^2 \quad (x \geq 0); \quad \text{դ) } \sqrt[n]{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}:$$

31. Ապացուցել, որ նշված բնական թվերի համար ճշմարիտ է անհավասարությունը.

$$\text{ա) } 2^n > 2n+1 \quad (n > 2); \quad \text{բ) } 2^{\frac{n(n-1)}{2}} > n! \quad (n \geq 3);$$

$$\text{գ) } \frac{n}{2} < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2^n - 1} < n \quad (n > 1);$$

$$\text{դ) } 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}, \quad (n \geq 2);$$

$$\text{ե) } n! > n^2 \quad (n > 2); \quad \text{զ) } (2n)! < 2^{2n} (n!)^2;$$

$$\text{է) } \left| \sin \left( \sum_{k=1}^n x_k \right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \sin x_k \quad (0 \leq x_k \leq \pi; k = 1, 2, \dots, n);$$

$$\text{ը) } |\sin nx| \leq n |\sin x| \quad (n \geq 1):$$

32. Ապացուցել Բեռնուլիի անհավասարությունները.

ա) ցանկացած  $x > -1$  թվի և  $n$  բնական թվի համար  $(1+x)^n \geq 1+nx$  :  
Ստուգել, որ երբ  $n > 1$ , հավասարությունը տեղի ունի միայն  $x = 0$  դեպքում:

բ) եթե  $x_1, x_2, \dots, x_n$  թվերը միևնույն նշանի են և սեն  $-1$ -ից, ապա  
 $(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n) \geq 1+x_1+x_2+\dots+x_n$ :

33. Օգտվելով Բեռնուլիի անհավասարությունից՝ ապացուցել, որ ցանկացած  $n > 1$  բնական թվի համար  $\left(\frac{n+1}{2}\right)^n > n!$ :

34. Կիրառելով մաթեմատիկական ինդուկցիայի սկզբունքը՝ ապացուցել, որ ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի համար

ա)  $(11^{n+2} + 12^{2n+1})$ -ը առանց մնացորդի բաժանվում է 133-ի;

բ)  $(3^{2n+1} + 40n - 67)$ -ը առանց մնացորդի բաժանվում է 64-ի:

\*\*\*

35. Հետազոտել հետևյալ բազմությունների սահմանափակությունը.

ա)  $[0;1]$ ;                      բ)  $(0;1)$ ;                      գ)  $(-3;1) \cup [4;71]$ ;

դ)  $(0;+\infty)$ ;                      ե)  $(-\infty;6]$ ;                      զ)  $(-\infty;1] \cup [3;+\infty)$ :

36. Դիցուք  $A$ -ն սահմանափակ բազմություն է: Ապացուցել, որ՝

ա)  $A$ -ի ցանկացած ենթաբազմություն սահմանափակ է;

բ) ցանկացած  $B$  բազմության համար  $A \cap B$  և  $A \setminus B$  բազմությունները սահմանափակ են;

գ) եթե  $B$ -ն սահմանափակ բազմություն է, ապա  $A \cup B$ ,  $A+B$  և  $A \cdot B$  բազմություններից յուրաքանչյուրը սահմանափակ է:

37. Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \sup \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = 1; \quad \text{բ) } \inf \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = 0;$$

$$\text{գ) } \sup \left\{ \frac{1}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\} = 1; \quad \text{դ) } \inf \left\{ \frac{1}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\} = 0;$$

$$\text{ե) } \sup \left\{ \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = \frac{1}{2}; \quad \text{զ) } \inf \left\{ \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = -1;$$

$$\text{է) } \sup \left\{ \frac{n}{n+1} \sin \frac{2\pi n}{3} : n \in \mathbb{N} \right\} = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\text{ը) } \inf \left\{ \frac{n}{n+1} \sin \frac{2\pi n}{3} : n \in \mathbb{N} \right\} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

38. Գտնել տրված բազմության ճշգրիտ ստորին և վերին եզրերն ու ամենափոքրը և ամենամեծ տարրերը (եթե այդպիսիք գոյություն ունեն).

- ա)  $[0;1]$ ; բ)  $(0;1]$ ; գ)  $[0;+\infty)$ ; դ)  $(0;+\infty)$ ; ե)  $Q$ ; զ)  $I \cap R_+$ ;  
 է)  $I \cap [0;1]$ ; ը)  $Q \cap R_+$ ; թ)  $Q \cap [0;1]$ :

39. Ապացուցել, որ եթե  $A$  ոչ դատարկ բազմությունը սահմանափակ է վերևից (ներքևից), ապա  $-A$  բազմությունը սահմանափակ է ներքևից (վերևից), ընդ որում՝

ա)  $\inf(-A) = -\sup A$ ;                      բ)  $\sup(-A) = -\inf A$ :

40. Ապացուցել, որ եթե  $A \subset B$ , ապա

ա)  $\sup A \leq \sup B$ ;                              բ)  $\inf A \geq \inf B$ :

41. Ապացուցել, որ ցանկացած  $A$  և  $B$  ոչ դատարկ սահմանափակ բազմությունների համար

ա)  $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A; \sup B\}$ ;  
 բ)  $\inf(A \cup B) = \min\{\inf A; \inf B\}$ ;  
 գ)  $\max\{\inf A; \inf B\} \leq \inf(A \cap B) \leq \min\{\sup A; \sup B\}$ :

42. Ստուգել, որ  $(0;1)$ ,  $(0;+\infty)$  և  $(-\infty;0)$  միջակայքերը բաց բազմություններ են:

43. Ապացուցել, որ ցանկացած  $a$  և  $b$  ( $b \geq a$ ) թվերի համար  $(a;b)$  միջակայքը բաց բազմություն է, իսկ  $[a;b]$  հատվածը՝ փակ: Այստեղից հետևեցնել, որ ցանկացած կետի ցանկացած շրջակայքը բաց բազմություն է:

44. Պարզել՝ հետևյալ բազմություններից որոնք են բաց, որոնք՝ փակ և որոնք՝ ո՛չ բաց և ո՛չ էլ փակ.

- ա)  $(0;1) \cup (3;+\infty)$ ;                      բ)  $(-3;2) \cup (4;7]$ ;                      գ)  $[-3;1] \cup [3;7]$ ;  
 դ)  $[-2;5] \cup [7;+\infty)$ ;                      ե)  $[-5;2] \cap (1;3)$ ;                      զ)  $[-4;1] \cap (0;6)$ ;  
 է)  $\{-5\}$ ;                                      ը)  $\{-5;7\}$ ;                                      թ)  $Z$ :

45. Ապացուցել, որ երկու բաց բազմությունների միավորումը բաց է:

46. Ապացուցել, որ եթե  $a \neq b$ , ապա

- ա) գոյություն ունի  $a$  կետի  $V_a$  շրջակայք, որը չի պարունակում  $b$ -ն;  
 բ) գոյություն ունեն  $a$  և  $b$  կետերի  $V_a$  և  $V_b$  շրջակայքեր, որոնք չեն հատվում:

47. Ստուգել, որ  $a$  կետի ցանկացած երկու շրջակայքի հատումն  $a$ -ի շրջակայք է:

48. Ապացուցել, որ երկու բաց բազմությունների հատումը բաց բազմություն է:

49. Ապացուցել, որ բազմությունը փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ պարունակում է իր բոլոր կուտակման կետերը:

50. Ստուգել, որ  $R$ -ը միաժամանակ թե՛ բաց է, թե՛ փակ:



\*\*\*

51. Հետևյալ արտահայտություններում գտնել  $x$  փոփոխականի թույլատրելի արժեքների բազմությունը (ԹԱԲ) .

ա)  $\frac{2x-3}{x^2+3x+2}$ ;      բ)  $\sqrt{3x-x^3}$ ;      գ)  $\frac{2x-1}{\sqrt{x^2-3x+2}}$ ;

դ)  $\log_2 \frac{1+x}{1-x}$ ;      ե)  $\arcsin \frac{2x-5}{3}$ ;      զ)  $\log_2 \log_3 x$ ;

է)  $\frac{1+x^2}{1-tgx}$ ;      լ)  $\arccos \frac{1+x^2}{2x}$ ;      թ)  $\frac{ctgx}{1+\log_2^2(1-|x|)}$ ;

Այսուհետև, եթե վարժության մեջ  $y = f(x)$  բանաձևով տրված ֆունկցիայի որոշման տիրույթը նշված չէ, ապա համարվում է, որ այն  $f(x)$  արտահայտության ԹԱԲ-ն է:

52. Ստուգել, որ հետևյալ ֆունկցիաները մոնոտոն են և պարզել յուրաքանչյուրի մոնոտոնության բնույթը.

ա)  $y = 2x - 7$ ;      բ)  $y = 5 - 0,5x$ ;      գ)  $y = \arctgx$ ;

դ)  $y = x^2, x \in R_+$ ;      ե)  $y = x^2, x \in R_-$ ;      զ)  $y = ctgx, x \in (0; \pi)$ ;

է)  $y = \cos x, x \in (0; \pi)$ ;      լ)  $y = \cos x, x \in (-\pi; 0)$ ;      թ)  $y = a^x (a > 0)$ ;

53. Պարզել, թե հետևյալ ֆունկցիաներից որոնք են զույգ, որոնք՝ կենսո և որոնք՝  $n$ 'չ զույգ և  $n$ 'չ էլ կենսո.

ա)  $y = 3x - x^3$ ;      բ)  $y = x + x^2$ ;      գ)  $y = |\sin 3x|$ ;

դ)  $y = \sin^4 3x$ ;      ե)  $y = 5^x + 5^{-x}$ ;      զ)  $y = 5^x - 5^{-x}$ ;

է)  $y = (x-2)^2$ ;      լ)  $y = \lg\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$ ;      թ)  $y = \lg \frac{1-x}{1+x}$ ;

54. Ստուգել, որ հետևյալ ֆունկցիաները պարբերական են.

ա)  $y = \sin 3x$ ;      բ)  $y = \cos^2 x$ ;      գ)  $y = 1 + \cos x + \sin 2x$  :

55. Ապացուցել, որ եթե  $T$ -ն  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիայի համար պարբերություն է, ապա  $mT$  ( $m \in Z, m \neq 0$ ) թվերից յուրաքանչյուրը նույնպես պարբերություն է:

56. Ապացուցել, որ  $\Gamma$ -իրիխլեի ֆունկցիայի՝

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \text{երբ } x \in Q, \\ 0, & \text{երբ } x \in I, \end{cases}$$

համար ցանկացած գրոյից տարբեր ռացիոնալ թիվ պարբերություն է:

57. Ստուգել, որ  $y = \operatorname{sgn} x$  (սիգնում իքս) ֆունկցիան՝

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & \text{երբ } x < 0, \\ 0, & \text{երբ } x = 0, \\ 1, & \text{երբ } x > 0, \end{cases}$$

կենն է: Յույց տալ, որ  $|x| = x \operatorname{sgn} x$  :

**58.**  $y = [x]$  (ամբողջ մաս իքս) ֆունկցիան սահմանվում է հետևյալ կերպ. եթե  $x = n + r$ , որտեղ  $n \in Z$  և  $r \in [0;1)$ , ապա  $[x] = n$  ;

ա) գտնել  $y = [x]$  ֆունկցիայի արժեքները  $0; \pm 0,75; \pm \sqrt{2}; \pm \pi$  կետերում;

բ) գտնել ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը;

գ) ապացուցել, որ ֆունկցիան չնվազող է;

դ) պարզել կենն է այն, թե՛ ոչ:

**59.** Ապացուցել, որ  $y = x - [x]$  (կոտորակային մաս իքս) ֆունկցիան պարբերական է և գտնել նրա փոքրագույն դրական պարբերությունը: Ո՞րն է ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:

**60.** Դիցուք  $f(y)$  արտահայտության ԹԱԲ-ը  $(0;1)$  միջակայքն է: Գտնել ա)  $f(\sin x)$ ; բ)  $f(\lg x)$  արտահայտություններից յուրաքանչյուրի ԹԱԲ-ը:

**61.** Տրված  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  ֆունկցիայից կազմել  $y = f(f(x))$ ,

$y = f(f(f(x)))$  վերադրումները:

**62.** Տրված  $\varphi: X \rightarrow Y$  և  $\psi: Y \rightarrow Z$  ֆունկցիաների համար կազմել  $\psi \circ \varphi: X \rightarrow Z$  բարդ ֆունկցիան.

ա)  $\varphi(x) = x^2$ ,  $\psi(y) = 2^y$ ;                          բ)  $\varphi(x) = 2^x$ ,  $\psi(y) = y^2$ ;

գ)  $\varphi(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ ,  $\psi(y) = \arccos y$ ;          դ)  $\varphi(x) = 1 + \sin^2 x$ ,  $\psi(y) = \log_2 y$  :

**63.** Ապացուցել, որ եթե  $y = \varphi(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիան զույգ է (պարբերական է), ապա ցանկացած  $\psi(y)$  ( $y \in R$ ) ֆունկցիայի համար  $\psi(\varphi(x))$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիան կլինի զույգ (պարբերական):

**64.** Դիցուք  $\varphi: X \rightarrow Y$  և  $\psi: Y \rightarrow Z$  ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրն իր որոշման տիրույթում մոնոտոն է: Ի՞նչ կարելի է ասել  $z = \psi(\varphi(x))$  ( $x \in X$ ) բարդ ֆունկցիայի մոնոտոնության վերաբերյալ:

**65.** Դիցուք  $a$ -ն,  $b$ -ն դրական թվեր են և  $c > 1$ :  $y = x^2$  և  $y = \log_c x$  ֆունկցիաների ո՞ր հատկության վրա են հիմնված հետևյալ պնդումները.

ա)  $a > b$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $a^2 > b^2$ ;

բ)  $a > b$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\log_c a > \log_c b$  :

Եթե  $0 < c < 1$ , ապա ինչպե՞ս պետք է ձևափոխել բ) պնդումը:

**66.** Ապացուցել, որ ցանկացած աճող (մվազող) ֆունկցիա հակադարձելի է: Աշխարհի՞ստ է արդյոք պնդումը ցանկացած չմվազող (չաճող) ֆունկցիայի համար: Բերել համապատասխան օրինակներ:

**67.** Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{երբ } x \in Q, \\ -x, & \text{երբ } x \in I, \end{cases}$$

ֆունկցիան ոչ մի միջակայքի վրա մոնոտոն չէ, բայց հակադարձելի է :

**68.** Համոզվել, որ  $y = f(x)$  ( $x \in X$ ) ֆունկցիան հակադարձելի է, նշել հակադարձ ֆունկցիայի որոշման  $Y$  տիրույթը և տալ  $x = f^{-1}(y)$  ( $y \in Y$ ) ֆունկցիան բանաձևով.

ա)  $y = 3x - 1, x \in R$ ;                      բ)  $y = \log_2 x, x \in (0; +\infty)$ ;

գ)  $y = x^2, x \in R_+$ ;                            դ)  $y = x^2, x \in R_-$ ;

ե)  $y = tg^2 x, x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right)$ ;            զ)  $y = tg^4 x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ :

**69.** ա) Ապացուցել, որ գույգ ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է  $Oy$  առանցքի նկատմամբ, իսկ կենտ ֆունկցիայինը՝ կոորդինատների սկզբնակետի նկատմամբ:

բ) Ապացուցել, որ եթե  $f : X \rightarrow Y$  ֆունկցիան  $X$ -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է  $Y$ -ի վրա, ապա  $y = f(x)$  ( $x \in X$ ) և  $y = f^{-1}(x)$  ( $x \in Y$ ) ֆունկցիաներից մեկի գրաֆիկը  $y = x$  ուղիղի նկատմամբ համաչափ է մյուսի գրաֆիկին:

Հետևյալ վարժություններում (70-110) պահանջվում է կառուցել տրված ֆունկցիայի գրաֆիկը: Դրա համար անհրաժեշտ է.

1) եթե բանաձևով տրված ֆունկցիայի կողքին նշված չէ որոշման տիրույթը, ապա գտնել այն (տես 52 վարժությունից առաջ արված դիտողությունը);

2) հետազոտել ֆունկցիան գույգության, կենտության, պարբերականության և մոնոտոնության առումով;

3) ուսումնասիրել ֆունկցիայի վարքը որոշման տիրույթի եզրային կետերի շրջակայքում;

4) գտնել առանցքների հետ գրաֆիկի հնարավոր հատման կետերը;

5) որոշման տիրույթի մի քանի կետում հաշվել ֆունկցիայի արժեքները և հարթության վրա նշել այդ արժեքներին համապատասխանող կետերը: Տարրական ֆունկցիաների գրաֆիկները, որպես կանոն, ստացվում են նշված կետերը «սահուն» գծով միացնելիս: Դա կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ֆունկցիայի վերը թվարկված բոլոր առանձնահատկությունները:

**70.** Կոորդինատների միևնույն համակարգում կառուցել  $y = ax$  գծային և հա-

մասեռ ֆունկցիայի գրաֆիկը, երբ  $a = 0$ ;  $-\frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{2}$ ;  $-2$  և  $2$ : Համեմատել ստացված

գրաֆիկները:

71. Գծել  $y = x^2$  ֆունկցիայի գրաֆիկը (պարաբոլ): Կառուցել  $y = x^2 + 2x + 2$  ֆունկցիայի գրաֆիկը՝ ֆունկցիան նախապես ներկայացնելով  $y = y_0 + (x - x_0)^2$  տեսքով:

72. Կորոդիմաստների միևնույն համակարգում կառուցել հետևյալ աստիճանային ֆունկցիաների գրաֆիկները.

$$\text{ա) } y = x^3; \quad \text{բ) } y = x^4; \quad \text{գ) } y = \frac{1}{x^2}; \quad \text{դ) } y = \sqrt{x}; \quad \text{ե) } y = \sqrt[3]{x} :$$

Կառուցել կոտորակագծային ֆունկցիայի գրաֆիկը (հիպերբոլներ) (73-75).

$$73. y = \frac{1}{x}; \quad 74. y = 1 + \frac{1}{x-2}; \quad 75. y = \frac{2x+3}{x+1} :$$

Կառուցել ռացիոնալ ֆունկցիայի գրաֆիկը (76-81).

$$76. y = x + \frac{1}{x} \text{ (հիպերբոլ)}; \quad 77. y = x^2 + \frac{1}{x} \text{ (Նյուտոնի եռաժանի)}:$$

$$78. y = \frac{2x}{1+x^2} \text{ (Նյուտոնի օձաքար)}; \quad 79. y = \frac{1}{1+x^2} \text{ (Անյեզիի կոր)}:$$

$$80. y = \frac{1}{1-x^2}; \quad 81. y = \frac{x}{1-x^2} :$$

Կառուցել իռացիոնալ ֆունկցիայի գրաֆիկը (82-84).

$$82. \text{ա) } y = -\sqrt{-x-2}; \quad \text{բ) } y = \sqrt{-x-2};$$

$$83. \text{ա) } y = -\frac{1}{2}\sqrt{100-x^2}; \quad \text{բ) } y = \frac{1}{2}\sqrt{100-x^2};$$

$$84. \text{ա) } y = -\sqrt{x^2-1}; \quad \text{բ) } y = \sqrt{x^2-1} :$$

Կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը (85-100).

$$85. \text{ա) } y = \sin \frac{1}{2}x; \quad \text{բ) } y = \sin 2x; \quad 86. \text{ա) } y = |\sin x|; \quad \text{բ) } y = \sin^2 x :$$

$$87. \text{ա) } y = \sin x^2; \quad \text{բ) } y = \sin \frac{1}{x}; \quad 88. \text{ա) } y = \operatorname{tg} 3x; \quad \text{բ) } y = \frac{1}{3} \operatorname{tg} x :$$

$$89. \text{ա) } y = \sin(\arcsin x); \quad \text{բ) } y = \arcsin(\sin x):$$

$$90. \text{ա) } y = 2^x; \quad \text{բ) } y = \left(\frac{1}{2}\right)^x; \quad 91. \text{ա) } y = \log_2 x; \quad \text{բ) } y = \log_{\frac{1}{2}} x :$$

92. ա)  $y = 3^{|x|}$ ;      բ)  $y = \log_3|x|$ ;    93. ա)  $y = |\log_3 x|$ ;    բ)  $y = |\log_3|x||$  :

94. ա)  $y = x \sin x$ ;      բ)  $y = x^2 \sin x$ ;      գ)  $y = \frac{1}{x} \cos x$  :

95. ա)  $y = 2^x \sin x$ ;      բ)  $y = 2^x \sin^2 x$  :

96. ա)  $y = x \sin \frac{1}{x}$ ;      բ)  $y = x^2 \sin \frac{1}{x}$  :

97.  $y = \frac{1}{\sin x}$  :      98.  $y = \arctg \frac{1}{x}$  :      99.  $y = 2^{\frac{1}{x}}$  :      100.  $y = 2^{-\frac{1}{x^2}}$  :

Բևեռային կոորդինատների համակարգում կառուցել տրված  $r = r(\varphi)$  ֆունկցիայի գրաֆիկը (101-107) .

101.  $r = 3$  (շրջանագիծ):      102.  $\varphi = \frac{\pi}{3}$  (ճառագայթ):

103.  $r = \varphi$  (Արքիմեդի գալարագիծ):

104.  $r = \frac{\pi}{\varphi}$  (հիպերբոլական գալարագիծ):

105.  $r = 2(1 + \cos \varphi)$  (սրտաձև գիծ):      106.  $r = 10 \sin 3\varphi$  (եռաթերթ վարդ):

Գիցուք տրված են  $x = \varphi(t)$  և  $y = \psi(t)$  ( $t \in T$ ) ֆունկցիաները (պարամետրական հավասարումները): Գեկարտյան հարթության վրա  $\{(\varphi(t), \psi(t)): t \in T\}$  կետերի բազմությունն անվանում են տրված պարամետրական հավասարումներով որոշվող կոր:

Կառուցել հետևյալ պարամետրական հավասարումներով որոշվող կորերը (107-110).

107.  $x = 1 - t$ ,  $y = 1 - t^2$  :      108.  $x = 10 \cos t$ ,  $y = \sin t$  (էլիպս) :

109.  $x = 5 \cos t$ ,  $y = 5 \sin t$  (շրջանագիծ):

110.  $x = 2^t + 2^{-t}$ ,  $y = 2^t - 2^{-t}$  (հիպերբոլ):

Տրված  $F(x, y) = 0$  հավասարմամբ որոշվող կորն այդ հավասարմանը բավարարող  $(x, y)$  կարգավորված զույգերի բազմությունն է:

Կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը (111-114).

111. ա)  $x^2 - y^2 = 0$ ;      բ)  $xy = 0$  :      112.  $x^2 - 4x + y^2 = 0$  :

113. ա)  $x^2 - a^2 = 0$ ;      բ)  $y^2 - b^2 = 0$ ;      գ)  $y^2 - y = 0$  :

114. ա)  $\min\{x, y\} = 1$ ;      բ)  $\max\{x, y\} = 1$ ;      գ)  $\min\{x^2, y\} = 1$  :

115. Ստուգել, որ ցանկացած  $A, B$  և  $C$  բազմությունների համար ճշմարիտ են զուգորդական և բաշխական հետևյալ օրենքները.

ա)  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ;      բ)  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ ;

գ)  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ;

դ)  $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ :

116. Ստուգել, որ ցանկացած  $A$  և  $B$  բազմությունների համար  $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$ :

117. Ապացուցել Դ'Մորգանի երկակիության օրենքները՝

ա)  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ ;      բ)  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$  :

118. Ապացուցել, որ  $A \cup B = A$  և  $A \cap B = B$  հավասարություններից յուրաքանչյուրը ճշմարիտ է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $B \subset A$  :

119. Յուրաքանչյուր  $\alpha \in R$  թվի համար նշանակենք  $Q_\alpha = \alpha + Q$  : Ապացուցել, որ ցանկացած  $\alpha$  և  $\beta$  թվերի համար ճշմարիտ է հետևյալ հավասարություններից մեկը և միայն մեկը.  $Q_\alpha = Q_\beta$ ,  $Q_\alpha \cap Q_\beta = \emptyset$  :

120. Ցանկացած  $X_1, X_2, Y_1$  և  $Y_2$  բազմությունների համար ապացուցել հետևյալ առնչությունները.

ա)  $(X_1 \cup X_2) \times Y_1 = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_1)$ ;

բ)  $X_1 \times (Y_1 \cup Y_2) = (X_1 \times Y_1) \cup (X_1 \times Y_2)$ ;

գ)  $(X_1 \cap X_2) \times Y_1 = (X_1 \times Y_1) \cap (X_2 \times Y_1)$ ;

դ) եթե  $X_1 \subset X_2$ , ապա  $X_1 \times Y_1 \subset X_2 \times Y_1$  :

\*\*\*

121. Ապացուցել, որ հետևյալ թվերն իռացիոնալ են. ա)  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ;      բ)  $\sqrt[3]{3}$ ;

գ)  $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ ;      դ)  $\log_4 18$ ;      ե)  $\text{tg} 15^\circ$ ;      զ)  $\text{tg} 5^\circ$  :

122. ա) Ապացուցել, որ  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{5}$  թվերը չեն կարող լինել միևնույն թվաբանական պրոգրեսիայի որևէ անդամներ:

բ) Կարո՞ղ են արդյոք 10, 11, 12 թվերը լինել միևնույն երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամներ:

123. Կարո՞ղ է արդյոք իռացիոնալ թվի իռացիոնալ աստիճանը լինել ռացիոնալ թիվ:

124. Ապացուցել հավասարությունները.

$$\text{ա) } \sum_{k=1}^n k C_n^k = n 2^{n-1}; \quad \text{բ) } \sum_{k=1}^n (-1)^k k C_n^k = 0 \quad (n > 1);$$

$$\text{գ) } \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \dots + \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n};$$

$$\text{դ) } \frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)};$$

125. Ապացուցել անհավասարությունները.

$$\text{ա) } 2(\sqrt{n+1}-1) < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}-1 \quad (n > 1);$$

$$\text{բ) } \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}; \quad \text{գ) } \sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1} \quad (n \geq 3);$$

$$\text{դ) } n! < \left(\frac{n}{2}\right)^n \quad (n \geq 6); \quad \text{ե) } \frac{a^n + b^n}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^n \quad (a, b > 0):$$

126. Տրված են  $x_1, x_2, \dots, x_n$  դրական թվերը: Ապացուցել, որ

$$\text{ա) եթե } x_1 x_2 \dots x_n = 1, \text{ ապա } x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n;$$

$$\text{բ) } \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} \geq n;$$

$$\text{գ) } \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n};$$

$$\text{դ) } \left(\frac{x_1^{-1} + x_2^{-1} + \dots + x_n^{-1}}{n}\right)^{-1} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n};$$

ե) նախորդ կետերից յուրաքանչյուրում հավասարությունը տեղի ունի միայն այն դեպքում, երբ  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ :

\*\*\*

127. Դիցուք  $A$ -ն և  $B$ -ն ոչ դատարկ սահմանափակ թվային բազմություններ են: Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \sup(A+B) = \sup A + \sup B; \quad \text{բ) } \inf(A+B) = \inf A + \inf B:$$

128. Ապացուցել, որ եթե  $A$  և  $B$  բազմությունները կազմված են ոչ բացասական տարրերից, ապա

$$\text{ա) } \sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B; \quad \text{բ) } \inf(A \cdot B) = \inf A \cdot \inf B:$$

129. Բերել  $A$  և  $B$  բազմությունների այնպիսի օրինակներ, որ 41 վարժության մեջ առաջարկված անհավասարություններից

ա) միայն մեկը լինի խիստ; բ) երկուսն էլ լինեն խիստ:

130. ա) Ապացուցել, որ վերջավոր բազմության բոլոր կետերը մեկուսացված կետեր են: Որո՞նք են այդ բազմության եզրային կետերը:

բ) Բերել անվերջ և սահմանափակ բազմության օրինակ, որի բոլոր կետերը մեկուսացված են:

131. Դիցուք  $X$ -ը և  $Y$ -ը ոչ դատարկ թվային բազմություններ են և  $\forall x \in X \forall y \in Y (x \leq y)$ : Օգտվելով ճշգրիտ վերին եզրի գոյության մասին թեորեմից՝ ապացուցել, որ գոյություն ունի այնպիսի  $z \in R$ , որ  $\forall x \in X \forall y \in Y (x \leq z \leq y)$ :

132. ա) Ապացուցել, որ ոչ դատարկ փակ և սահմանափակ բազմությունն ունի թե՛ ամենամեծ և թե՛ ամենափոքր տարրեր:

բ) Ապացուցել, որ բաց բազմությունը չունի ո՛չ ամենամեծ և ո՛չ էլ ամենափոքր տարր:

133. Ապացուցել, որ եթե  $a$ -ն  $X$  բազմության կուտակման կետ է, ապա  $a$ -ի ցանկացած շրջակայք պարունակում է  $X$ -ին պատկանող անվերջ թվով կետեր:

\*\*\*

134. Դիցուք  $y = f(x)$  ֆունկցիան զույգ է: Ստուգել, որ հետևյալ ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրը զույգ է.

ա)  $y = f^2(x)$ ; բ)  $y = f^3(x)$ ; գ)  $y = |f(x)|$ ; դ)  $y = f(|x|)$ :

135. Յույց տալ, որ եթե  $y = f(x)$  ֆունկցիան զույգ է (կենտ է), ապա  $y = y_0 + f(x - x_0)$  ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է  $x = x_0$  ուղիղի ( $(x_0; y_0)$  կետի) նկատմամբ:

136. Ապացուցել, որ  $(-a; a)$  միջակայքում տրված ցանկացած իրականարժեք ֆունկցիա միակ ձևով կարելի է ներկայացնել որպես զույգ և կենտ ֆունկցիաների գումար:

137. Դիցուք՝  $X_0 \subset X_1$ ,  $X_0 \neq X_1$ :  $F: X_1 \rightarrow Y_1$  ֆունկցիան կոչվում է  $f: X_0 \rightarrow Y_0$  ֆունկցիայի շարունակություն, եթե  $\forall x \in X_0 (F(x) = f(x))$ :

Տրված է  $f: (0; a) \rightarrow R$  ֆունկցիան: Կառուցել  $f$ -ի  $F: (-a; a) \rightarrow R$  շարունակությունն այնպես, որ

ա)  $F$ -ը լինի զույգ ֆունկցիա; բ)  $F$ -ը լինի կենտ ֆունկցիա:

138. Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիայի համար ցանկացած իռացիոնալ թիվ պարբերություն է, ապա  $f$ -ը հաստատուն ֆունկցիա է:

139.  $\alpha$  և  $\beta$  թվերը կոչվում են *համաչափելի*, եթե  $\alpha = r \cdot \beta$ , որտեղ  $r \in Q \setminus \{0\}$ : Ապացուցել, որ եթե երկու պարբերական ֆունկցիաների պարբերությունները



համաչափելի են, ապա դրանց թե՛ գումարը և թե՛ արտադրյալը պարբերական ֆունկցիաներ են:

**140.** Դիցուք  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիայի համար գոյություն ունեն  $k > 0$  և  $T > 0$  հաստատումներ, այնպիսիք, որ  $\forall x \in R (f(x+T) = kf(x))$ : Ապացուցել, որ  $f$ -ը կարելի է ներկայացնել  $f(x) = a^x \varphi(x)$  տեսքով, որտեղ  $a > 0$ , իսկ  $\varphi(x)$ -ը  $T$  պարբերությամբ ֆունկցիա է:

**141.** Դիցուք  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է: Ապացուցել, որ  $f$ -ի արժեքների բազմությունը սահմանափակ է: Ճշմարիտ է արդյոք պնդումն  $(a; b)$  բաց միջակայքում մոնոտոն ֆունկցիայի համար: Բերել օրինակներ:

**142.** Դիցուք  $X$  փակ և սահմանափակ բազմության վրա որոշված  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է: Ապացուցել, որ

ա)  $f$ -ի արժեքների  $f(X)$  բազմությունը սահմանափակ է;

բ)  $f(X)$  բազմության մեջ կա ամենամեծը և ամենափոքրը:

**143.** Ապացուցել, որ եթե  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն չէ, ապա  $X$ -ում կա կետերի այնպիսի  $x_1 < x_2 < x_3$  եռյակ, որ  $f(x_2)$ -ը չի գտնվում  $f(x_1)$ -ի և  $f(x_3)$ -ի միջև:

**144.** Դիցուք  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը սահմանափակ է: Ստուգել, որ

ա)  $\varphi(x) = \sup\{f(\xi) : \xi \in X \text{ և } \xi \leq x\}$  ֆունկցիան չնվազող է;

բ)  $\psi(x) = \inf\{f(\xi) : \xi \in X \text{ և } \xi \leq x\}$  ֆունկցիան չաճող է;

գ) եթե  $f$ -ը մոնոտոն է, ապա  $\varphi$  և  $\psi$  ֆունկցիաներից մեկը համընկնում է  $f$ -ին, իսկ մյուսը հաստատուն է:

**145.** Տրված է  $f : X \rightarrow Y$  արտապատկերումը: Գտնել նշված  $A_1, A_2, A_3$  բազմությունների պատկերները.

ա)  $y = 2x - 0,5, A_1 = R, A_2 = [-1; 2), A_3 = Q$ ;

բ)  $y = x^2 - 4x + 3, A_1 = R, A_2 = [2; +\infty), A_3 = (1; 3)$ ;

գ)  $y = \sin x, A_1 = R, A_2 = \left[0; \frac{\pi}{2}\right), A_3 = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ;

դ)  $y = \lg x, A_1 = (0; +\infty), A_2 = (0; 1], A_3 = (1; 10)$ ;

ե)  $y = 2 + 2^x, A_1 = R, A_2 = [-1; 3], A_3 = (0; +\infty)$ :

**146.** Տրված է  $f : X \rightarrow R$  արտապատկերումը: Գտնել  $B_1, B_2, B_3$  բազմությունների նախապատկերները.

ա)  $y = 3x + 1, B_1 = R, B_2 = [-2; 7], B_3 = Q$ ;

- բ)  $y = 4x - x^2$ ,  $B_1 = (0;4)$ ,  $B_2 = \{0\}$ ,  $B_3 = (5;+\infty)$ ;  
 գ)  $y = \cos 2x$ ,  $B_1 = (-1;1]$ ,  $B_2 = \{-1,1\}$ ,  $B_3 = (\sqrt{2};+\infty)$ ;  
 դ)  $y = 2^x$ ,  $B_1 = (0;+\infty)$ ,  $B_2 = (-\infty;0]$ ,  $B_3 = \{-1;1\}$ ;  
 ե)  $y = \arcsin x$ ;  $B_1 = R$ ,  $B_2 = [\pi;3\pi]$ ,  $B_3 = \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right\}$ :

147. Ստուգել, որ  $y = ctg\pi x$  ֆունկցիան  $(0;1)$  միջակայքը փոխմիարժեք արտապատկերում է  $R$ -ի վրա:

148. Առաուցել ֆունկցիա, որը տրված  $X$  բազմությունը փոխմիարժեք արտապատկերում է  $Y$ -ի վրա.

- ա)  $X = [0;1]$ ,  $Y = [0;2]$ ;                      բ)  $X = N$ ,  $Y = \{2n : n \in N\}$ ;  
 գ)  $X = [3;7]$ ,  $Y = [7;15]$ ;                      դ)  $X = (-\infty;0)$ ,  $Y = R$ ;  
 ե)  $X = R$ ,  $Y = (-1;1)$ ;                      զ)  $X = Q$ ,  $Y = Q \setminus Q_-$ :

149. Տրված է  $f : X \rightarrow Y$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ ցանկացած  $X_1, X_2 \subset X$  բազմությունների համար

- ա)  $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$ ;  
 բ)  $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$ ;  
 գ)  $f(X_1 \setminus X_2) \supset f(X_1) \setminus f(X_2)$ :

Օրինակներով համոզվել, որ բ) և գ) կետերում պարունակման նշանը չի կարելի փոխարինել հավասարման նշանով:

150. Տրված է  $f : X \rightarrow Y$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ ցանկացած  $Y_1, Y_2 \subset Y$  բազմությունների համար

- ա)  $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$ ;  
 բ)  $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$ ;  
 գ)  $f^{-1}(Y_1 \setminus Y_2) = f^{-1}(Y_1) \setminus f^{-1}(Y_2)$ :

151. Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{երբ } x \neq 0, \\ a, & \text{երբ } x = 0 \quad (a \in R) \end{cases}$$

ֆունկցիան բավարարում է հետևյալ ֆունկցիոնալ հավասարմանը.  
 $xf(y) + yf(x) = (x+y)f(x)f(y)$ :

152. Ստուգել, որ  $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$  ֆունկցիան բավարարում է հետևյալ ֆունկցիոնալ հավասարմանը.  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$ :

153. Հայտնի է, որ  $y = f(x)$  ֆունկցիան բավարարում է  $2f(x) - 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$

ֆունկցիոնալ հավասարմանը: Գտնել  $f(x)$ -ը:

154. Գտնել  $f(x)$ -ը, եթե

$$\text{ա) } f(x+1) = x^2 - 3x + 2; \quad \text{բ) } f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2};$$

$$\text{գ) } f\left(\frac{x}{x+1}\right) = x^2; \quad \text{դ) } f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3};$$

155. Կառուցել  $\varphi(\psi(x))$  և  $\psi(\varphi(x))$  բարդ ֆունկցիաները և գտնել դրանցից յուրաքանչյուրի արժեքների բազմությունը, եթե

$$\text{ա) } \varphi(x) = \operatorname{sgn} x, \psi(x) = |x|; \quad \text{բ) } \varphi(x) = [x], \psi(x) = \sin \pi x:$$

156. Կառուցել  $y = [x] - 2\left[\frac{x}{2}\right]$  ֆունկցիայի գրաֆիկը, նախապես համոզվելով,

որ ֆունկցիան պարբերական է:

157. Կառուցել  $y = f(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիայի գրաֆիկը, եթե հայտնի է, որ ֆունկցիան բավարարում է  $f(x+1) = f(x)$  ֆունկցիոնալ հավասարմանը և, բացի այդ,  $f(x) = x(1-x)$ , երբ  $x \in [0;1]$ :

158. Տրված է՝  $y = f(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիան բավարարում է  $f(x+\pi) = f(x) + \sin x$  ֆունկցիոնալ հավասարմանը և  $f(x) = 0$ , երբ  $0 \leq x \leq \pi$ : Կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը:

159. Կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը.

$$\text{ա) } x^2 - xy + y^2 = 1 \text{ (էլիպս);} \quad \text{բ) } \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1 \text{ (պարաբոլ);}$$

$$\text{գ) } \sin x = \sin y; \quad \text{դ) } \cos(\pi x^2) = \cos(\pi y):$$

160. Կորդինատների միևնույն համակարգում կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը.

$$\text{ա) } |x| + |y| = a; \quad \text{բ) } x^2 + y^2 = a^2;$$

$$\text{գ) } \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2} \text{ (աստղաձև գիծ):}$$

161. Բևեռային կորդինատների համակարգում կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը.

$$\text{ա) } r^2 = 36 \cos 2\varphi \text{ (Բևեռնուլիի լեմնիսկառ);} \quad \text{բ) } r^2 + \varphi^2 = 1:$$

162. Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } (0;1) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[ \frac{1}{n+1}; \frac{n}{n+1} \right] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left( \frac{1}{n+1}; \frac{n}{n+1} \right);$$

$$\text{բ) } [0;1] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left[ -\frac{1}{n}; \frac{n+1}{n} \right] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left( -\frac{1}{n}; \frac{n+1}{n} \right):$$

$$\text{գ) } \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left[ 0; \frac{1}{n} \right] = \{0\}; \quad \text{դ) } \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left( 0; \frac{1}{n} \right) = \emptyset;$$

$$\text{ե) } \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [n; +\infty) = \emptyset; \quad \text{զ) } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n; n) = \mathbb{R}:$$

163. Ապացուցել, որ

ա) բաց բազմություններից կազմված ցանկացած ընտանիքի միավորումը բաց բազմություն է;

բ) փակ բազմություններից կազմված ցանկացած ընտանիքի հատումը փակ բազմություն է;

գ) բաց բազմություններից կազմված ցանկացած վերջավոր ընտանիքի հատումը բաց բազմություն է;

դ) փակ բազմություններից կազմված ցանկացած վերջավոր ընտանիքի միավորումը փակ բազմություն է:

164. Ստուգել, որ  $Q$  և  $I$  բազմությունները ո՛չ բաց են, ո՛չ փակ: Ապացուցել, որ  $\partial Q = \partial I = \mathbb{R}$ :

165. Ապացուցել, որ ցանկացած բազմության

ա) ներքին կետերի բազմությունը բաց բազմություն է;

բ) եզրային կետերի բազմությունը փակ բազմություն է;

գ) կուտակման կետերի բազմությունը փակ բազմություն է:

166. Ապացուցել հավասարությունները.

$$\text{ա) } [a; b] + [c; d] = [a + c; b + d];$$

$$\text{բ) } (a; b) + (c; d) = (a + c; b + d);$$

$$\text{գ) } [a; b] \cdot [c; d] = [ac; bd] \quad (a > 0, c > 0);$$

$$\text{դ) } (a; b) \cdot (c; d) = (ac; bd) \quad (a > 0, c > 0):$$

167. Ապացուցել, որ եթե  $A$  և  $B$  բազմությունները բաց են, ապա բաց են նաև  $A + B$  և  $A \cdot B$  բազմությունները:

168. Ապացուցել, որ եթե  $[a; b] = A \cup B$ , որտեղ  $A$ -ն և  $B$ -ն ոչ դատարկ փակ բազմություններ են, ապա  $A$  և  $B$  բազմություններն ունեն գոնե մեկ ընդհանուր կետ:

169. Գիցուք  $A$ -ն բաց բազմություն է, իսկ  $B$ -ն՝ փակ: Ստուգել, որ  $A \setminus B$  բազմությունը բաց է, իսկ  $B \setminus A$ -ն՝ փակ:

170. Ապացուցել, որ եթե  $X \subset R$  բազմությունը միաժամանակ բաց է և փակ, ապա  $X = \emptyset$  կամ  $X = R$ :

171.  $X \subset R$  բազմությունն անվանենք *կապակցված բազմություն*, եթե այն իր ցանկացած  $x_1 < x_2$  տարրերի հետ մեկտեղ պարունակում է ողջ  $(x_1; x_2)$  միջակայքը:

Ապացուցել, որ  $R$ -ում կապակցված բազմություններ են բոլոր բաց, փակ, կիսաբաց, վերջավոր և անվերջ միջակայքերը և միայն դրանք:

172. Ապացուցել, որ  $X \subset R$  բազմությունը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն չունեն հետևյալ պայմաններին բավարարող  $G_1$  և  $G_2$  բաց բազմություններ.

$$G_1 \cap X \neq \emptyset, \quad G_2 \cap X \neq \emptyset, \quad G_1 \cap G_2 = \emptyset, \quad X \subset G_1 \cup G_2:$$

173. Որպեսզի  $F \subset R$  բազմությունը լինի փակ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ  $F$ -ի հետ հատվող ցանկացած  $[a; b]$  հատվածի համար  $F \cap [a; b]$  բազմությունն ունենա ամենամեծ և ամենափոքր տարրեր: Ապացուցել:

\*\*\*

174. Գտնել  $x$ -ի բոլոր ա) ամբողջ, բ) ռացիոնալ արժեքների բազմությունը, որոնց համար  $\sqrt{x^2 + x + 1}$ -ը ռացիոնալ թիվ է:

175. Ստուգել, որ ցանկացած  $n \geq 2$  բնական թվի համար  $\sqrt{1 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{n}}}$  թիվը իռացիոնալ է:

176. Ապացուցել, որ եթե  $x_1, x_2, \dots, x_n$  և  $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \dots + \sqrt{x_n}$  թվերը ռացիոնալ են, ապա  $\sqrt{x_1}, \sqrt{x_2}, \dots, \sqrt{x_n}$  թվերը մույնպես ռացիոնալ են:

177. Ապացուցել, որ  $\sqrt[3]{2}$  թիվը հնարավոր չէ ներկայացնել  $p + q\sqrt{r}$  տեսքով, որտեղ  $p, q$  և  $r$  թվերը ռացիոնալ են:

178. Գտնել  $\left\{ \sqrt[3]{n} - \sqrt[3]{m} : n, m \in N \right\}$  բազմության կուտակման կետերի բազմությունը:

179. Գտնել հետևյալ բազմություններից յուրաքանչյուրի փակումը.

$$\text{ա) } \left\{ \frac{p^2}{q^2} : p, q \in N \right\}; \quad \text{բ) } \left\{ 2^{\frac{p}{q}} : p, q \in N \right\};$$

180. Ապացուցել, որ եթե  $y = f(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է  $x = a$  և  $x = b$  ( $b \neq a$ ) ուղիղների նկատմամբ, ապա  $f$ -ը պարբերական է:

181. Ապացուցել, որ եթե  $y = f(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է  $A(a_1, b_1)$  և  $B(a_2, b_2)$  ( $a_1 \neq a_2$ ) կետերի նկատմամբ, ապա  $f$ -ը գծային և պարբերական ֆունկցիաների գումար է: Մասնավորապես, եթե  $b_1 = b_2$ , ապա  $f$ -ը պարբերական է:

182. Ապացուցել, որ եթե  $y = f(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիայի գրաֆիկը համաչափ է  $A(a, b)$  կետի և  $x = c$  ( $c \neq a$ ) ուղիղի նկատմամբ, ապա  $f$ -ը պարբերական է:

183. Ստուգել, որ Ռ-իմանի ֆունկցիան՝

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{երբ } x = \frac{p}{q} \\ 0, & \text{երբ } x \in I, \end{cases} \quad \text{անկրճատելի կոտորակ է և } q \in N,$$

պարբերական է և գտնել նրա փոքրագույն դրական պարբերությունը:

184. Կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը.

$$\text{ա) } x^4 + y^4 = x^2 y; \quad \text{բ) } (x^2 + y^2)^2 = 2xy \quad (\text{լեմնիսկատ});$$

$$\text{գ) } x^3 + y^3 - 3xy = 0 \quad (\text{Դեկարտի տերև});$$

$$\text{դ) } (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2) \quad (\text{լեմնիսկատ}):$$

185. Բևեռային կոորդինատների համակարգում կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը.

$$\text{ա) } \varphi = 2\pi \sin r; \quad \text{բ) } r = \max\{2|\cos 2\varphi|, 1\}:$$

186. Գիցուք  $x^2 + (y - a)^2 = a^2$  հավասարումով որոշվող շրջանագիծը (անիվը), որի վրա նշված է  $A(0; 0)$  կետը, գլորվում է  $Ox$  առանցքի վրայով: Գտնել  $A$  կետի հետագծի (ցիկլոիդի) պարամետրական հավասարումները՝ որպես պարամետր ընտրելով շրջանագծի կենտրոնը  $A$  կետին միացնող շառավիղ-վեկտորի պտտման անկյունը:

187. Ստուգել, որ բևեռային կոորդինատների համակարգում  $r^2 = 18 \cos 2\varphi$  հավասարումով որոշվող կորը (Բեռնուլիի լեմնիսկատը) այն  $(r, \varphi)$  կետերի բազմությունն է, որոնց  $F_1(3, \pi)$  և  $F_2(3, 0)$  կետերից (լեմնիսկատի ֆոկուսներից) ունեցած հեռավորությունների արտադրյալը հաստատուն է: Գտնել այդ հաստատունը:

## Գլուխ 2

### Թվային հաջորդականություններ

Բնական թվերի բազմության վրա որոշված  $f: N \rightarrow X$  ֆունկցիան կոչվում է հաջորդականություն: Եթե  $X$ -ը թվային բազմություն է, ապա  $f$ -ն անվանում են *թվային հաջորդականություն*: Ցանկացած  $n \in N$  թվի համար  $x_n = f(n)$  արժեքն անվանում են հաջորդականության  $n$ -րդ կամ ընդհանուր անդամ: Այսուհետև  $f: N \rightarrow X$  հաջորդականությունը պարզապես կանվանենք  $x_n$  հաջորդականություն: Տրված  $x_n$ -ի համար  $x_{n-1}$ -ը և  $x_{n+1}$ -ը կոչվում են համապատասխանաբար նախորդ և հաջորդ անդամներ: Ֆունկցիայի մոնոտոնության, սահմանափակության, հաստատունության սահմանումները պահպանվում են նաև հաջորդականությունների համար: Ավելացնենք միայն, որ  $x_n$  հաջորդականությունը կանվանենք *ի վերջո մոնոտոն* (հաստատուն), եթե գոյություն ունի  $n_0 \in N$ , այնպիսին, որ  $x_n$ -ը մոնոտոն է (հաստատուն է)  $\{n_0, n_0 + 1, \dots\}$  բազմության վրա:

Հ ա ջ ո ռ դ ա կ ա ն ո թ յ ա ն ս ա հ մ ա ն:  $a$  թիվը կոչվում է  $x_n$  հաջորդականության սահման, եթե ցանկացած  $\varepsilon > 0$  թվի համար գոյություն ունի  $n_0 \in N$ , այնպիսին, որ բոլոր  $n \geq n_0$  բնական թվերի համար տեղի ունի  $|x_n - a| < \varepsilon$  անհավասարությունը.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in N \forall n \in N (n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon):$$

Եթե  $a$  թիվը  $x_n$  հաջորդականության սահմանն է, ապա գրում են  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  կամ  $x_n \rightarrow a$  ( $x_n$ -ը ձգտում է  $a$ -ի): Վերջավոր սահման ունեցող հաջորդականությունը կոչվում է զուգամետ, չունեցողը՝ տարամետ:

Չուզամետ հաջորդականության սահմանը միակն է:

$x_n$  հաջորդականությունը կոչվում է անվերջ փոքր, եթե  $x_n \rightarrow 0$ :  $x_n$  հաջորդականությունը կոչվում է անվերջ մեծ, եթե  $\forall E > 0 \exists n_0 \in N \forall n \in N (n \geq n_0 \Rightarrow |x_n| > E)$ : Այս դեպքում գրում են  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$  կամ  $x_n \rightarrow \infty$ : Ընդունված են նաև ա)  $x_n \rightarrow -\infty$ , բ)  $x_n \rightarrow +\infty$  նշանակումները, եթե ա)  $\forall E > 0 \exists n_0 \in N \forall n \in N (n \geq n_0 \Rightarrow x_n < -E)$ ; բ)  $\forall E > 0 \exists n_0 \in N \forall n \in N (n \geq n_0 \Rightarrow x_n > E)$ :

Ն ե ռ դ ը վ ա ծ մ ի ջ ա կ ա յ յ ք ե ռ ի լ ե մ մ ա ն: Փակ միջակայքերի (հատվածների)  $\{[a_n; b_n] : n \in N\}$  ընտանիքը կոչվում է ներդրված միջակայքերի ընտանիք, եթե  $\forall n \in N ([a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}])$ :

Լեմմա (Կոշի-Կանտորի սկզբունք): Եթե ներդրված միջակայքերի  $\{[a_n; b_n] : n \in N\}$  ընտանիքն այնպիսին է, որ  $b_n - a_n \rightarrow 0$ , ապա գոյություն ունի  $c$  թիվ, ընդ որում միակը, որը պատկանում է այդ միջակայքերից յուրաքանչյուրին.  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] = \{c\}$ :

Սահմանի գոյությունը հաստատվել է: Եթե  $y_n$  և  $z_n$  հաջորդականությունները զուգամետ են և  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ , ապա ցանկացած  $x_n$  հաջորդականություն, որը բավարարում է  $y_n \leq x_n \leq z_n$  անհավասարություններին, նույնպես զուգամետ է և  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ :

Վայերշտրասի թեորեմը: Ցանկացած ի վերջո չնվազող և վերևից սահմանափակ հաջորդականություն զուգամետ է:

Կոշիի գուգամիտությունը սկզբում է  $x_n$  հաջորդականությունը կոչվում է ֆունդամենտալ, եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} (m > n \geq n_0 \Rightarrow |x_m - x_n| < \varepsilon):$$

Ռաբեսգի  $x_n$  հաջորդականությունը լիմի զուգամետ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն լիմի ֆունդամենտալ:

Թվաբանական գործողություններ և սահմանափակություններ: Եթե  $x_n$  և  $y_n$  հաջորդականությունները զուգամետ են, ապա զուգամետ են  $x_n \pm y_n$ ,  $x_n y_n$ , իսկ եթե

$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$ ,  $\frac{x_n}{y_n}$  հաջորդականությունները, ընդ որում

$$\text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \lim_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$\text{գ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}:$$

$$\text{Եթե } \forall n \geq n_0 (x_n \leq y_n), \text{ ապա } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n:$$

Ենթահաջորդականություններ և սահմանափակություններ: Բնական քվերից կազմված ցանկացած  $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$  հաջորդականության համար  $z_n = x_{k_n}$  հաջորդականությունը կոչվում է  $x_n$  հաջորդականության ենթահաջորդականություն:

ա թիվը  $(-\infty, +\infty)$  կոչվում է  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահման, եթե  $x_n$  հաջորդականության որևէ ենթահաջորդականություն ձգտում է  $a$ -ի  $(-\infty, +\infty)$ :  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահմաններից ամենափոքրն (ամենամեծն) անվանում են  $x_n$  հաջորդականության ստորին (վերին) սահման և նշանակում՝

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \quad (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n):$$

$$x_n \rightarrow -\infty (+\infty), \text{ ապա } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty (+\infty):$$

Ռաբեսգի  $x_n$  հաջորդականությունն ունենա սահման (վերջավոր կամ անվերջ), անհրաժեշտ է և բավարար, որ  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ :

Բոլցանո-Վայերշտրասի թեորեմ: Եթե  $x_n$  հաջորդականությունն ունի առնվազն մեկ կուտակման կետ: Բ) Ցանկացած սահմանափակ հաջորդականություն ունի զուգամետ ենթահաջորդականություն:



## Ա

Ապացուցել  $x_n$  հաջորդականության սահմանափակությունը (188-197).

$$188. x_n = (-1)^n :$$

$$189. x_n = \sin n! :$$

$$190. x_n = \frac{1-n}{\sqrt{n^2+1}} :$$

$$191. x_n = \frac{n+(-1)^n}{3n-1} :$$

$$192. x_n = \frac{5n^2+6}{(n^4+1)(n^2-2)} :$$

$$193. x_n = \frac{\sqrt{n^2+2}}{(n+3)(\sqrt{n+1})} :$$

$$194. x_n = \frac{n + \arctg n}{n + \ln n} :$$

$$195. x_n = \frac{\lg^2 n + 10}{\lg^2 n + 2} :$$

$$196. x_n = \lg\left(\sqrt{2n^2+1}-n\right) - \lg n :$$

$$197. x_n = \frac{5^{2n+1} + 2^n}{1-25^n} :$$

Ստուգել, որ  $x_n$  հաջորդականությունը սահմանափակ չէ (198-206).

$$198. x_n = (-1)^n n^2 :$$

$$199. x_n = q^n \quad (q > 1) :$$

$$200. x_n = n + (-1)^n n :$$

$$201. x_n = n \sin \frac{\pi n}{4} :$$

$$202. x_n = 2^{n(-1)^n} :$$

$$203. x_n = \frac{1-n}{\sqrt{n}} :$$

$$204. x_n = (n-1)^{\sin \frac{n\pi}{2}} :$$

$$205. x_n = \frac{3^n - 2^n}{2^n + 1} :$$

$$206. x_n = \frac{\sqrt{n^3+2n}}{\sqrt{n+1}} :$$

Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականությունը մոնոտոն (ի վերջո մոնոտոն) է և պարզել մոնոտոնության բնույթը (207-217).

$$207. x_n = \frac{100n}{n^2+16} :$$

$$208. x_n = n^3 - 6n :$$

$$209. x_n = nq^n, \quad q > 0 :$$

$$210. x_n = \frac{1-n}{\sqrt{n}} :$$

$$211. x_n = \frac{n+1}{\sqrt{n^2+1}} :$$

$$212. x_n = 2^n - 100n :$$

$$213. x_n = 3^n - 2^n :$$

$$214. x_n = \frac{2^n}{n} :$$

$$215. x_n = \lg(n+1) - \lg n :$$

$$216. x_n = \lg(n^2 + 9n) - 2\lg n :$$

$$217. x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k(2k+1)} - \frac{1}{2(n+1)} :$$

Ելնելով հաջորդականության սահմանի սահմանումից՝ ապացուցել հավասարությունը (218-226).

$$218. \text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 ;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n-1} = \frac{3}{2} :$$

$$219. \text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0 ;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0, p > 0 :$$

$$220. \text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+(-1)^n}{n} = 0 ;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{12} = 0 :$$

$$221. \text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{3n-1}} = 0 ;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, |q| < 1 :$$

$$222. \text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \log_{n+1} 2 = 0 ;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \log_2 \frac{2n+1}{n} = 1 :$$

$$223. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2+n+1} = 1 :$$

$$224. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n \sin n + 1}{2n^2 + n - 1} = 0 :$$

$$225. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+1}{8n^2-2n+10} = \frac{1}{4} :$$

$$226. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n^2+1}}{\sqrt{n^2+2n+10}} = \sqrt{3} :$$

227. Գտնել բոլոր այն բնական  $n$ -երը, որոնց համար  $\frac{1}{2} < \frac{n+10}{2n-1} < \frac{1}{2} + \varepsilon$ , որտեղ

$$\text{ա) } \varepsilon = \frac{1}{2} ; \text{ բ) } \varepsilon = \frac{1}{k+1}, k \in \mathbb{N} :$$

228. Գիցուք  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  և  $y_n = x_{n+p}$  ( $p \in \mathbb{N}$ ): Ապացուցել, որ  $y_n$  հաջորդականությունը զուգամետ է և  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$  :

229. Ապացուցել, որ զուգամետ հաջորդականությունը սահմանափակ է:

230. Ապացուցել, որ ի վերջո հաստատուն հաջորդականությունը զուգամետ է:

231. Տրված է  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  : Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$  : Օրինակներով համոզվել, որ  $|x_n| \rightarrow |a| \Rightarrow x_n \rightarrow a$  հետևությունը ճշմարիտ չէ:

231.1. Տրված է  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  : Ապացուցել, որ ցանկացած բնական  $k$  թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{2k} = a^{2k}$  : Կառուցել  $x_n$  հաջորդականության օրինակ, որի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{2k} = a^{2k}$ , բայց  $x_n$ -ը չի ձգտում  $a$ -ի:

231.2. Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{2k-1} = a^{2k-1}$  ( $k \in \mathbb{N}$ ):

232. Ապացուցել, որ եթե  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  և ինչ-որ համարից սկսած  $x_n \geq b$  ( $x_n \leq c$ ), ապա  $a \geq b$  ( $a \leq c$ ):

233. Ապացուցել, որ եթե  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > a$  ( $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < b$ ), ապա ինչ-որ համարից սկսած՝  $x_n > a$  ( $x_n < b$ ):

234. Ապացուցել, որ  
 ա) անվերջ փոքր հաջորդականության և սահմանափակ հաջորդականության արտադրյալն անվերջ փոքր է;  
 բ) գրոյից տարբեր անդամներով  $x_n$  հաջորդականությունն անվերջ փոքր է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\frac{1}{x_n}$  հաջորդականությունն անվերջ մեծ է:

235. Ստուգել, որ հետևյալ հաջորդականություններն անվերջ փոքր են.

ա)  $x_n = \frac{\sin n}{n^\alpha}$ ,  $\alpha > 0$ ; բ)  $x_n = \frac{(-1)^n n}{n^2 + 1}$ ; գ)  $x_n = \left[ \frac{\sqrt{n}}{n\sqrt{n}} \right]$ :

Ստուգել, որ  $x_n$  հաջորդականությունն անվերջ մեծ է (236-241).

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 236. $x_n = (-1)^n n$ :      | 237. $x_n = \lg \lg n$ :             |
| 238. $x_n = (\lg n)^3$ :     | 239. $x_n = q^n,  q  > 1$ :          |
| 240. $x_n = 4\sqrt{n} - n$ : | 241. $x_n = \frac{2^n(n+1)}{2n+1}$ : |

242. Ստուգել, որ  $x_n = n^{(-1)^n}$  հաջորդականությունը սահմանափակ չէ, բայց անվերջ մեծ էլ չէ:

Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականությունը տարամետ է (243-248).

243.  $x_n = (-1)^n :$

244.  $x_n = \sin \frac{n\pi}{12} :$

245.  $x_n = \frac{n}{n+1} \cos \frac{2\pi n}{3} :$

246.  $x_n = 2^{(-1)^n n} :$

247.  $x_n = \frac{n^2 - 2n}{n+1} :$

248.  $x_n = n^2 \sin \frac{\pi n}{4} :$

Ապացուցել հավասարությունը (249-256).

249.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0 :$

250.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a > 1):$

251.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 :$

252.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0):$

253.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 :$

254.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ln n} = 1 :$

255.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0 \quad (a > 1):$

256.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0 :$

Հաշվել սահմանը (257-271).

257. ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) :$

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{(n+a_1)(n+a_2)} - n)$

258. ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2 \sin n!}}{n+1} ;$

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \operatorname{arctg} 2^n}{2^n} :$

259. ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2}{n^3} ;$

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2}{n^3} :$

260. ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right] ;$

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \dots \sqrt[2^n]{2}) :$

261. ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{3^n \lg n} ;$

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{-n}}{2^{-n} - 3^n} :$

262. ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 + 1}{n^3 - n + 10} ;$

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 5n + 3}{n^3 + n^2 - 7} ;$

զ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 2n^3 - 1}{3n^3 + n^2 - 5} ;$

$$\eta) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^p + a_1 n^{p-1} + \dots + a_{p-1} n + a_p}{b_0 n^q + b_1 n^{q-1} + \dots + b_{q-1} n + b_q} \quad (a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, p, q \in \mathbb{N}):$$

$$263. \text{ ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 4} - 2}{3n}; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(n\sqrt{n^2 + 1} - n^2\right)}:$$

$$264. \text{ ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{3}{\sqrt{n+3} - \sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}} \right);$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{n+1} - \sqrt[4]{n}}{\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}}:$$

$$265. \text{ ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt[3]{n^3 + 2n^2} - n \right); \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{(n-1)^2} \right):$$

$$266. \text{ ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \lg n}{1 + \lg n^2}; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg(2^n + 1)}{n+1}:$$

$$267. \text{ ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log_2(n+3)}{n^2 + 2}; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + \sqrt{n} \ln n}{n^2 + n + 1}:$$

$$268. \text{ ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3^n}{n + 3^n}; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \ln n + 5^n}{n^2 - 5^n}:$$

$$269. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \left(1 + \frac{p}{n}\right)^q - \left(1 + \frac{q}{n}\right)^p \right) \quad (p, q \in \mathbb{N}):$$

$$270. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2 + 3 - \dots + (2n-1) - 2n}{\sqrt{n^2 + 1}}:$$

$$271. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \left(a + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(a + \frac{2}{n}\right)^2 + \dots + \left(a + \frac{n-1}{n}\right)^2 \right]:$$

Օգտվելով մոնոտոն հաջորդականության զուգամիտության վերաբերյալ թեորեմից՝ ապացուցել հաջորդականության զուգամիտությունը (272-276).

$$272. \text{ ա) } x_n = \frac{1}{n}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{n+1}{3n+7}:$$

$$273. \text{ ա) } x_n = \frac{n}{3^n}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{3n}{n^2 + 7n - 1}:$$

$$274. \text{ ա) } x_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1};$$

$$275. \text{ ա) } x_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right);$$

$$\text{բ) } x_1 = 1, \quad x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{1 + (-1)^n}{2n}\right);$$

$$276. \text{ ա) } x_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n};$$

277. Ապացուցել, որ եթե մոնոտոն հաջորդականությունը սահմանափակ չէ, ապա անվերջ մեծ է:

$$278. \text{ Գիցուք՝ } x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} : \text{ Ապացուցել, որ}$$

ա)  $x_n$  հաջորդականությունը աճող է, իսկ  $y_n$ -ը նվազող;

բ) ցանկացած բնական  $m$ -ի և  $n$ -ի համար  $x_m < y_n$ ;

գ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  (այդ սահմանը նշանակում են  $e$ );

դ)  $2 < e < 3$ ;

ե)  $0 < e - x_n < \frac{e}{n}$ ;

զ)  $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ , որտեղ նշանակված է  $\ln x = \log_e x$ :

Օգտվելով Կոշիի զուգամիտության սկզբունքից՝ ապացուցել հաջորդականության զուգամիտությունը (279-283).

$$279. \text{ ա) } x_n = \frac{1}{n+2}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{n+1}{n^2+3};$$

$$280. \text{ ա) } x_n = \frac{2n+1}{3n+2}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{n+\sin n}{n+7};$$

$$281. \text{ ա) } x_n = a + aq + \cdots + aq^{n-1}, |q| < 1;$$

$$\text{բ) } x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n};$$

$$282. \text{ ա) } x_n = \frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)};$$

$$p) x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)} :$$

$$283. \text{ ա) } x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}; \quad \text{բ) } x_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} \quad (p > 2):$$

Օգտվելով Կոշիի զուգամիտության սկզբունքից՝ ապացուցել հաջորդականության տարամիտությունը (284-286).

$$284. \text{ ա) } x_n = (-1)^n + 1; \quad \text{բ) } x_n = (-1)^n \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n :$$

$$285. \text{ ա) } x_n = \sin \frac{\pi n}{4}; \quad \text{բ) } x_n = \frac{n \cos n\pi - 1}{2n} :$$

$$286. \text{ ա) } x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \quad \text{բ) } x_n = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} :$$

287. Չուգամե՞տ է արդյոք  $x_n$  հաջորդականությունը, եթե ցանկացած  $p$  բնական թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+p} - x_n) = 0$ : Բերել համապատասխան օրինակ:

287.1. ա) Դիցուք  $x_n$  հաջորդականության համար  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$  և

$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = b$ : Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը  $\{a; b\}$ -ն է:

բ) Դիցուք  $p \in \mathbb{N}$  և  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{pn+k} = a_k$ ,  $k = 0; 1; \dots; p-1$ : Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը  $\{a_0; a_1; \dots; a_{p-1}\}$ -ն է:

Գտնել  $\inf x_n$ -ը,  $\sup x_n$ -ը,  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ -ը և  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ -ը (288-295).

$$288. x_n = (-1)^{n-1} \left( 2 + \frac{3}{n} \right); \quad 289. x_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \frac{n\pi}{3} :$$

$$290. x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{\pi n}{4}; \quad 291. x_n = 1 + 2(-1)^{n+1} + 3(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} :$$

$$292. x_n = \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}; \quad 293. x_n = n^{(-1)^n} :$$

$$294. x_n = \frac{1}{n-10,2}; \quad 295. x_n = \sqrt[n]{1+2^{n(-1)^n}} :$$

296. Գիցուք՝  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , իսկ  $y_n$ -ը ցանկացած թվային հաջորդականություն է: Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = 0$ : Բերել համապատասխան օրինակներ:

297. Գիցուք՝  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ .

ա) Ճշմարիտ է արդյոք, որ կա՛մ  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , կա՛մ  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ :

բ) Կարո՞ղ են արդյոք  $x_n$  և  $y_n$  հաջորդականությունները միաժամանակ լինել անսահմանափակ:

Բերել համապատասխան օրինակներ:

գ) Ապացուցել, որ եթե  $x_n$  և  $y_n$  հաջորդականությունները դրական են, ապա կամ այդ հաջորդականություններից գոնե մեկը ձգտում է զրոյի, կամ  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ :

Այսուհետև պայմանավորվենք օգտագործել հետևյալ «թվաբանական» կանոնները.

$$+\infty + (+\infty) = +\infty, \quad +\infty + a = +\infty, \quad +\infty \cdot (+\infty) = +\infty,$$

$$-\infty + (-\infty) = -\infty, \quad -\infty + a = -\infty, \quad (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty:$$

298. Ապացուցել, որ  $a$  թիվը ( $-\infty$ -ը,  $+\infty$ -ը) կլինի  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահման այն և միայն այն դեպքում, երբ  $a$ -ի ( $-\infty$ -ի,  $+\infty$ -ի) ցանկացած շրջակայք պարունակում է  $x_n$ -ի անվերջ թվով անդամներ:

Գտնել հաջորդականության մասնակի սահմանները (299-302):

299.  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{7}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \frac{2^n - 1}{2^n}, \dots;$       300.  $x_n = \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{n};$

301.  $x_n = 3 \left( 1 - \frac{1}{n} \right) + 2(-1)^n;$       302.  $x_n = \frac{1}{2} \left[ (a+b) + (-1)^n (a-b) \right];$

303. Բերել թվային հաջորդականության օրինակ, որի մասնակի սահմանները նախապես տրված  $a_1, a_2, \dots, a_p$  թվերն են:

## Բ

Ապացուցել հաջորդականության սահմանափակությունը (304-307).

304.  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n;$       305.  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1};$



306.  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}$ ; 307.  $x_n = \log_2 \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right), n \geq 2$ :

308. Ինչպիսի՞  $p$ -ի և  $q$ -ի համար,  $0 \leq q < p$ ,

$$x_n = \sqrt[k]{n^p + an^q + 1} - \sqrt[k]{n^p + bn^q + 1} \quad (a \neq b)$$

հաջորդականությունը կլինի սահմանափակ:

309.  $x_n$  բնական թվերի հաջորդականությունն այնպիսին է, որ

$$S_n = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}$$

հաջորդականությունը սահմանափակ է: Ապացուցել,

որ սահմանափակ է նաև  $y_n = \left(1 + \frac{1}{x_1}\right) \left(1 + \frac{1}{x_2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)$  հաջորդականությունը:

Անդրադարձ բանաձևով տրված հաջորդականության ընդհանուր անդամն արտահայտել  $n$ -ով և հետազոտել սահմանափակությունը (310-313).

310.  $x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1}{2 - x_n}$ :

311.  $x_1 = 0, x_2 = 1, x_{n+2} = \frac{3x_{n+1} - x_n}{2}$ :

312.  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = 3x_{n+1} - 2x_n$ :

313.  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = -3x_{n+1} - 2x_n + 6$ :

Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականությունը սահմանափակ չէ (314-317).

314. ա)  $x_n = \sum_{k=1}^n kq^{n-k}, q \in R, q \neq 0$ ; բ)  $x_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} k^2$ :

315. ա)  $x_n = \frac{2^n}{n^2}$ ; բ)  $x_n = \frac{n+1}{\log_2(n+1)}$ :

316. ա)  $x_n = \sqrt[n]{n!}$ ; բ)  $x_n = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}$ :

317.  $x_1 = x_2 = 1, x_{n+2} = x_{n+1} + 6x_n$ :

Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականությունը մոնոտոն (ի վերջո մոնոտոն) է (318-321).

318.  $x_n = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=1}^n k \cdot k!$ :

319.  $x_n = \frac{a^n - 1}{n}, a > 0$ :

$$320. x_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, x > 0 :$$

$$321. x_1 = 0, x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{n+1} :$$

322. Գիցուք՝  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  և  $x_n \geq -1, n \in \mathbb{N}$  : Ապացուցել, որ ցանկացած  $p$ -ի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{1+x_n} = 1$  :

323. Գիցուք՝  $x_n \rightarrow \infty$ , երբ  $n \rightarrow \infty$  : Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$  :

324. Գիցուք՝  $x_n > 0$  և  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$  : Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \ln a$  :

325. Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - 1) = \ln a \quad (a > 0)$  :

326. Ապացուցել, որ  $x_n = \sin n$  հաջորդականությունը տարամետ է :

Հաշվել սահմանը (327-340).

$$327. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \cdots \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} ; \quad 328. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) :$$

$$329. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}} \right) :$$

$$330. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left( \frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}} \right) :$$

$$331. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right] :$$

$$332. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 3^n + 1}{n! + 1} ; \quad 333. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{n}{2}} + (n+1)!}{n(3^n + n!)} ; \quad 334. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{a} - 1}{\sqrt[n]{b} - 1} \quad (a, b > 1) :$$

$$335. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 4^n}{n + 5^n}} ; \quad 336. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n + n^2 2^n - 1}{n^4 + (n!)^2} :$$

$$337. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \cdots + \sqrt[n]{a_m}}{m} \right)^n, \text{ որտեղ } a_i > 0, i = 1, 2, \dots, m :$$

338.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \dots + \frac{1}{a_n a_{n+1}} \right)$ , որտեղ  $a_n$ -ը զրոյից տարբեր անդամներով և  $d \neq 0$  տարբերությամբ թվաբանական պրոգրեսիա է:

339.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left( \frac{1}{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} \right)$ , որտեղ  $a_n$ -ը

դրական անդամներով և  $d \neq 0$  տարբերությամբ թվաբանական պրոգրեսիա է:

340.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (q + 2q^2 + \dots + nq^n) \quad (|q| < 1)$ :

341. Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{1}{e}:$$

342. Գիցուք  $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ : Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } e - S_n < \frac{n+2}{n!(n+1)^2}; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e - S_n}{e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = 0:$$

343. Ապացուցել, որ  $\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e\left(\frac{n}{2}\right)^n$ :

344. Գիցուք  $m \in \mathbb{N}$  և  $M = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m}$ : Ապացուցել, որ  $e^M > m + 1$ :

Հետազոտել հաջորդականության զուգամիտությունը և հաշվել սահմանը (345-351).

345.  $x_1 = 0, x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{x_n + 2}$ :

346.  $0 < x_1 < 1, x_{n+1} = x_n(2 - x_n)$ :

347.  $x_1 = 13, x_{n+1} = \sqrt{12 + x_n}$ :

348.  $x_1 = \sqrt[k]{a}, x_{n+1} = \sqrt[k]{ax_n}, a > 0$ :

349.  $x_1 = 0, x_{n+1} = \frac{x_n + A}{4}$ :

350.  $x_1 = M > 0, x_{n+1} = \frac{1}{3} \left( 2x_n + \frac{M}{x_n^2} \right)$ :

351.  $x_1 = \sqrt{a}, x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}, a > 0$ :

352. Տրված է  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ : Ի՞նչ կարելի է ասել  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ -ի մասին:

353. Գիցուք  $x_n$  հաջորդականությունը սահմանափակ է վերևից և բավարար-

րում է  $x_{n+1} - x_n > -\frac{1}{n^2}$  ( $n \in N$ ) անհավասարությանը: Ապացուցել, որ  $x_n$ -ը զուգամետ է:

**354.** Գիցուք  $x_n$  հաջորդականության համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+2} - x_n) = 0$ : Ապացուցել,

որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$ :

**355.** Գտնել  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$  հաջորդականության մասնակի սահման-

ների բազմությունը:

**356.** Ապացուցել, որ ցանկացած հաջորդականություն ունի մոնոտոն ենթահաջորդականություն:

**357.** Ապացուցել, որ

$$\inf x_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \sup x_n:$$

Բերել օրինակներ, որ անհավասարության տարբեր մասերում լինի ա) հավասարություն; բ) խիստ անհավասարություն:

**357.1.** Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k; \quad \text{բ) } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k:$$

**358.** Ապացուցել, որ եթե  $x_n$  հաջորդականությունը զուգամետ է, ապա ցանկացած  $y_n$  հաջորդականության համար ճշմարիտ են հետևյալ հավասարությունները.

$$\text{ա) } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$\text{բ) } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n:$$

**359.** Ապացուցել, որ եթե  $x_n, y_n$  հաջորդականություններից որևէ մեկը սահմանափակ է, ապա

$$\text{ա) } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$\text{բ) } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n:$$

Բերել հաջորդականությունների օրինակներ, որ անհավասարությունների բոլոր մասերում լինեն խիստ անհավասարություններ:

**360.** Ապացուցել, որ եթե  $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < +\infty$ , ապա ցանկացած  $y_n$  հաջորդակա-

նության համար  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$ :

**361.** Ապացուցել, որ եթե  $x_n > 0$  ( $n \in N$ ) և  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 1$ , ապա  $x_n$  հա-

ջորդականությունը զուգամետ է:

**362.** Դիցուք  $x_n$  հաջորդականությունը բավարարում է  $0 \leq x_{m+n} \leq x_m + x_n$

( $m, n \in N$ ) պայմանին: Ապացուցել, որ  $\frac{x_n}{n}$  հաջորդականությունը զուգամետ է:

**363.** Ապացուցել, որ զուգամետ հաջորդականությունն ունի փոքրագույն կամ մեծագույն անդամ:

**364.**  $x_n$  հաջորդականությունն անվանում են սահմանափակ փոփոխության հաջորդականություն, եթե գոյություն ունի այնպիսի  $C$  հաստատուն, որ կամայական  $n$ -ի համար

$$\sigma_n = |x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \dots + |x_{n+1} - x_n| < C :$$

Ապացուցել, որ

ա) մոնոտոն և սահմանափակ հաջորդականությունն ունի սահմանափակ փոփոխություն;

բ) սահմանափակ փոփոխության հաջորդականությունը զուգամետ է: Բերել  $x_n$  հաջորդականության օրինակ, որը զուգամետ է, բայց սահմանափակ փոփոխության չէ:

գ) ցանկացած սահմանափակ փոփոխության հաջորդականության համար գոյություն ունեն  $a_n$  և  $b_n$  մոնոտոն աճող ու սահմանափակ հաջորդականություններ, այնպիսիք որ  $x_n = a_n - b_n$ , ( $n \in N$ ):

**365.** Ապացուցել, որ եթե  $x_n$  հաջորդականությունը զուգամետ է, ապա

$$y_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \quad (n \in N)$$

հաջորդականությունը նույնպես զուգամետ է և

$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ : Ընդհանուր դեպքում  $y_n$  հաջորդականության զուգամիտությունից չի հետևում  $x_n$  հաջորդականության զուգամիտությունը: Բերել օրինակ:

**366.** Դիցուք  $x_n$  հաջորդականության համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = a$  և

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1} - x_n) = 0 :$$

Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  :

**367.** Ապացուցել, որ եթե  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , ապա  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n) = +\infty$  :

368. Ապացուցել, որ եթե  $x_n$  հաջորդականությունը զուգամետ է և  $x_n > 0$ , ապա

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n :$$

369. Ապացուցել, որ եթե  $x_n > 0$  և գոյություն ունի  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ , ապա

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} :$$

370. Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$ :

371. Ապացուցել, որ ցանկացած սահմանափակ անվերջ բազմություն ունի կուտակման կետ:

372. Դիցուք՝  $[a_1; b_1] \supset [a_2; b_2] \supset \cdots \supset [a_n; b_n] \supset \cdots$ : Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n] \neq \emptyset;$$

բ)  $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n; b_n]$  բաղկացած է մեկ կետից այն և միայն այն դեպքում, երբ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0;$$

գ) ճշմարիտ են արդյոք ձևակերպված պնդումները  $(a_n; b_n)$  բաց միջակայքերի համար:

373. Դիցուք  $N_1$  և  $N_2$  բազմությունների միավորումը բնական թվերի բազմությունն է: Ապացուցել, որ եթե  $\{x_n\}_{n \in N_1}$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը  $A$ -ն է, իսկ  $\{x_n\}_{n \in N_2}$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը՝  $B$ -ն, ապա  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը  $A \cup B$ -ն է:

## Գ

374. Հետազոտել  $x_n = \left(1 + \frac{1}{a_1}\right) \left(1 + \frac{1}{a_2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)$  հաջորդականության սահմանափակությունը, որտեղ  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = (n+1)(a_n + 1)$ :

Ապացուցել  $x_n$  հաջորդականության սահմանափակությունը (375-377).

$$375. x_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} : \quad 376. x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k \frac{1}{n+1-j} : \quad 377. x_n = \frac{1}{(2n-1)!} \sum_{k=1}^n k \cdot k! :$$

$$378. \text{Տրված է } x_1 = 2, x_{n+1} = \frac{x_n^4 + 1}{5x_n} : \text{Ապացուցել, որ } \frac{4\sqrt[4]{3}}{15} < x_n \leq 2 :$$

$$379. \text{Գիցուք } x_1 = a \text{ և } x_n = \frac{x_{n-1}}{2 + x_{n-1}}, n > 1 : \text{Ինչպիսի՞ } a \text{-երի դեպքում բոլոր } n \text{-երի համար } x_n \text{-ը կլինի որոշված:}$$

$$380. \text{Գիցուք } x_1 = a :$$

ա) Ապացուցել, որ եթե  $a \notin [3;4]$ , ապա գոյություն ունի  $x_n$  հաջորդականություն, որը բավարարում է  $x_{n+1} = \frac{x_n}{4 - x_n}$  ( $n \in N$ ) հավասարմանը:

բ) գտնել  $a$ -ի այն արժեքները, որոնց դեպքում գոյություն չունի նշված հավասարմանը բավարարող հաջորդականություն:

$$381. \text{Տրված է } x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + y_n), y_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2}(x_n^2 + y_n^2)}, x_1 = a > 0, y_1 = b > a :$$

Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } y_n \geq x_n, x_n \uparrow \text{ (աճող է), } y_n \downarrow \text{ (նվազող է);}$$

$$\text{բ) } y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{b-a}{4^n} :$$

$$382. \text{Տրված է } x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, x_1 = a > 0, y_1 = b > a : \text{Ապացուցել, որ}$$

$$\text{ա) } x_n \uparrow, y_n \downarrow \text{ և } x_n, y_n \text{ հաջորդականությունները սահմանափակ են;}$$

$$\text{բ) } y_{n+1} - x_{n+1} \leq \frac{b-a}{2^n} \text{ (} n \in N \text{):}$$

$$383. x_n \text{ և } y_n \text{ հաջորդականությունները բավարարում են } x_1 = a > 0, y_1 = b > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + y_n), y_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n} \text{ պայմաններին: Ապացուցել, որ}$$

այդ հաջորդականությունները զուգամետ են և ունեն միևնույն սահմանը: Գտնել այդ սահմանը:

384. Գիցուք՝  $\binom{0}{\alpha} = 1$ ,  $\binom{n}{\alpha} = \binom{n-1}{\alpha} \frac{\alpha - n + 1}{n}$ , ( $n \in N, \alpha \in R$ ): Ապացուցել, որ

ա) եթե  $\alpha \geq -1$ , ապա  $\left| \binom{n}{\alpha} \right|$  հաջորդականությունն ի վերջո չաճող է;

բ) եթե  $\alpha < -1$ , ապա  $\left| \binom{n}{\alpha} \right|$  հաջորդականությունն ի վերջո չնվազող է:

385. Գիցուք՝  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{t}{n}\right)$ : Ապացուցել, որ ցանկացած  $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$  թվի

համար  $a_n$  հաջորդականությունն ի վերջո աճող է, իսկ ցանկացած  $t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$

թվի համար՝ նվազող:

386. Գիցուք՝  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ,  $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ : Ապացուցել, որ

ա)  $\frac{1}{4} < n \left( \frac{e}{x_n} - 1 \right) < \frac{1}{2}$  ( $n = 1, 2, \dots$ );

բ)  $\frac{3x_n + y_n}{4} < e < \frac{x_n + y_n}{2}$ ;

գ)  $\frac{e}{4n+4} < e - x_n < \frac{e}{2n}$ :

387. Գիցուք՝  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ,  $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ : Ապացուցել, որ

ա) կամայական  $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$  թվի համար գոյություն ունի այնպիսի

$n_0 = n_0(t)$  համար, որ  $(1-t)x_n + ty_n < e$ , երբ  $n > n_0$ ;

բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n \left(1 + \frac{1}{2n}\right) - e}{e - x_n} = 0$ ;

գ)  $\frac{e}{2n+2} < e - x_n < \frac{e}{2n+1}$ :



388. Ապացուցել, որ.

ա) եթե  $a < e$ , ապա ի վերջո  $n! \left(\frac{a}{n}\right)^n < e$ ;    բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n! \left(\frac{e}{n}\right)^n = +\infty$  :

389. Գիցուք  $\sigma_n = 3 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+1)!}$  : Ապացուցել, որ

ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = e$ ;    բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma_n - e}{e - S_n} = 0$ , որտեղ  $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$  :

390. Գիցուք  $a_n > 0$  ( $n \in N$ ): Ապացուցել, որ  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n}\right)^n \geq e$  :

Հետագոտել հաջորդականության զուգամիտությունը (391-394).

391.  $x_1 = \frac{1}{2}$ ,  $x_{n+1} = (1 - x_n)^2$ ;    392.  $x_1 = a$ ,  $0 < a < 1$ ,  $x_{n+1} = 1 - x_n^2$  :

393.  $x_1 > 0$ ,  $x_{n+1} = \frac{a}{x_n} + b$ ,  $a > 0$ ,  $b > 0$ ;    394.  $x_1 = \frac{1}{2}$ ,  $x_{n+1} = \frac{4}{3}x_n - x_n^2$  :

395. Գիցուք՝  $x_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n}}}}$  : Ապացուցել, որ

ա)  $x_n$  հաջորդականությունը մոնոտոն է և սահմանափակ;

բ) ցանկացած  $n$  և  $k$  բնական թվերի համար  $x_n < x_k + \frac{1}{2^{k-1}}$  :

396. Գիցուք՝  $x_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \dots + \sqrt{a_n}}}$  ( $a_i > 1$ ,  $i \in N$ ): Ապացուցել, որ  $x_n$

հաջորդականությունը զուգամետ է, եթե  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \ln a_n < \ln 2$  :

397. Տրված է  $x_n$  հաջորդականությունը: Գիցուք ցանկացած  $\alpha > 1$  թվի համար

$\lim_{m \rightarrow \infty} x_{[am]} = 0$ , որտեղ  $[am]$ -ը ( $m \in N$ )  $am$ -ի ամբողջ մասն է: Ապացուցել, որ

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  :

398. Գիցուք՝  $x_n > 0$  և  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  : Ապացուցել, որ

ա) գոյություն ունեն անվերջ թվով  $n_k$  համարներ, այնպիսիք, որ  $\forall n \in N$  ( $n < n_k \Rightarrow x_n > x_{n_k}$ );

բ) գոյություն ունեն անվերջ թվով  $n_k$  համարներ, այնպիսիք, որ  $\forall n \in N$  ( $n > n_k \Rightarrow x_n < x_{n_k}$ ):

399. Գիցուք  $x_n$ -ը ոչ բացասական թվերի հաջորդականություն է, որը բավարարում է  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} < +\infty$  և  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$  պայմաններին: Ապացուցել,

որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n^2} = 0$ :

$a$ -ի և  $b$ -ի ինչ<sup>օ</sup> արժեքների դեպքում  $x_n$  հաջորդականությունը կլինի զուգամետ (400-402).

400.  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = 4x_{n+1} - 3x_n$ : 401.  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = x_{n+1} + 2x_n$ :

402.  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = \frac{5}{2}x_{n+1} + x_n$ :

403. Տրված է  $x_1 = a, x_{n+1} = a \left( x_n + \frac{1}{x_n} \right)$  հաջորդականությունը: Ապացուցել, որ

ա)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , եթե  $a \geq 1$ ;                      բ)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{\frac{a}{1-a}}$ , եթե  $0 < a < 1$ :

404. Հետազոտել  $x_n = \sqrt{2\sqrt{3\cdots\sqrt{n}}}$  հաջորդականության զուգամիտությունը:

405. Գիցուք՝  $x_1 = 1, x_2 = 1, x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$  (Ֆիբոնաչիի հաջորդականություն): Ապացուցել, որ  $\frac{x_{n+1}}{x_n}$  հաջորդականությունը զուգամետ է և գտնել նրա սահմանը:

406. Գիցուք  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+2} = px_{n+1} + qx_n$ , որտեղ  $a, b, p, q$ -ն տրված հաստատուն թվեր են: Ապացուցել, որ

ա) եթե  $\lambda^2 - p\lambda - q = 0$  հավասարումն ունի  $\lambda_1$  և  $\lambda_2$  իրարից տարբեր իրական արմատներ, ապա

$$x_n = \frac{(\lambda_2 a - b)\lambda_1^{n-1} - (\lambda_1 a - b)\lambda_2^{n-1}}{\lambda_2 - \lambda_1};$$

բ) եթե  $\lambda^2 - p\lambda - q = 0$  հավասարումն ունի  $\lambda_0 \neq 0$  կրկնակի իրական արմատ, ապա  $x_n = (2a\lambda_0 - b + n(b - a\lambda_0))\lambda_0^{n-2}$ ;

407. Կառուցել թվային հաջորդականություն, որի համար  $A = \{a_i : i \in N\}$  բազմության բոլոր տարրերը լինեն մասնակի սահմաններ: Ստուգել, որ այդպիսի հաջորդականության համար  $A$  բազմության բոլոր կուտակման կետերը նույնպես մասնակի սահմաններ են:

**408.** Ապացուցել, որ

ա) ցանկացած հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը փակ է;

բ) ցանկացած  $A$  փակ և սահմանափակ բազմության համար գոյություն ունի հաջորդականություն, որի մասնակի սահմանների բազմությունը  $A$ -ն է:

**409.** Կառուցել հաջորդականություն,

ա) որը չունի վերջավոր մասնակի սահման;

բ) որն ունի միակ վերջավոր մասնակի սահմանը, բայց զուգամետ չէ;

գ) որն ունի անվերջ թվով մասնակի սահմաններ;

դ) որի համար յուրաքանչյուր իրական թիվ հանդիսանում է մասնակի սահման:

**410.** Ապացուցել, որ եթե  $A$  և  $B$  բազմությունները փակ են և սահմանափակ, ապա  $A+B$  և  $A \cdot B$  բազմությունները նույնպես փակ են և սահմանափակ: Բերել  $A$  և  $B$  փակ բազմությունների օրինակներ, որոնց համար  $A+B$  և  $A \cdot B$  բազմությունները փակ չեն:

**411.** Ապացուցել, որ եթե  $x_n$  հաջորդականությունը սահմանափակ է և

$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ , ապա այդ հաջորդականության մասնակի սահմանների

բազմությունը  $\left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n; \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \right]$  հատվածն է:

**412.** Կառուցել հաջորդականություն, որի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x_n| > 0$  և

$\left[ \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n; \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \right]$  հատվածի ցանկացած թիվ այդ հաջորդականության մաս-

նակի սահման է:

**413.** Ապացուցել, որ ցանկացած  $a_n$  չնվազող հաջորդականության համար

$x_n = \frac{a_n}{n + a_n}$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը հատ-

ված է կամ, եթե  $x_n$ -ը զուգամետ է՝ կետ: Բերել  $a_n$  հաջորդականության օրինակ, որի դեպքում  $x_n$  հաջորդականության մասնակի սահմանների բազմությունը  $[0;1]$  հատվածն է:

**414.** Ապացուցել, որ

ա)  $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$  հաջորդականությունը զուգամետ է

(այդ հաջորդականության սահմանն անվանում են Էյլերի հաստատուն և նրա մոտավոր արժեքն է՝  $C \approx 0,577216$ );

$$p) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2 :$$

415. Ապացուցել Շտոլցի թեորեմը. դիցուք  $x_n$  հաջորդականությունն ի վերջո մոնոտոն է,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , իսկ  $y_n$  հաջորդականությունն այնպիսին է, որ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = a : \text{ Ապացուցել, որ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a :$$

416. Դիցուք  $x_n$  հաջորդականությունն ի վերջո մոնոտոն է,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0 \text{ և } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = a, \text{ որտեղ } a \in \mathbb{R} \text{ կամ } a = \pm\infty : \text{ Ապացուցել, որ}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a :$$

Հաշվել սահմանը (417-422).

$$417. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p+1}} (1^p + 2^p + \dots + n^p) \quad (p \in \mathbb{N}) :$$

$$418. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^p} (1^p + 2^p + \dots + n^p) - \frac{n}{p+1} \right) \quad (p \in \mathbb{N}) :$$

$$419. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \dots (2n)} :$$

$$420. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^2 + \dots + n^n}{n^n} :$$

$$421. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left| \ln \left( \sqrt{n^2 + 1} - n \right) \right|^p :$$

$$422. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}} \cdots \frac{2}{\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\dots+\sqrt{2}}}}_{n \text{ հատ}}} :$$

423. Դիցուք  $a_n$  սահմանափակ հաջորդականության անդամները բնական

$$\text{թվեր են: Տրված է՝ } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1 : \text{ Ապացուցել, որ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = 1 :$$

424. Գիցուք  $x_n$  հաջորդականությունը ցանկացած  $m, n \in N$ ,  $m \neq n$ , թվերի համար բավարարում է  $|x_m - x_n| > \frac{1}{n}$  պայմանին: Ապացուցել, որ  $x_n$ -ը սահմանափակ չէ:

425. Գիցուք  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունեն այնպիսի  $m$  և  $n$  բնական թվեր, որ  $|a_m - a_n| > 1$  և  $|b_m - b_n| > 1$ :

426. Տրված է  $x_n$  հաջորդականությունը սահմանափակ է և բավարարում է  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - 2x_{n+1} + x_{n+2}) = 0$  պայմանին: Ապացուցել, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n+1}) = 0$ :

427. Գիցուք  $x_n$  հաջորդականությունը վերևից սահմանափակ է և բավարարում է  $x_{n+1} - x_n \geq -a_n$  պայմանին, որտեղ  $a_n \geq 0$  ( $n \in N$ ) և ցանկացած  $k$ -ի համար  $\sum_{n=1}^k a_n < 1$ : Ապացուցել, որ  $x_n$ -ը զուգամետ է:

428. Գիցուք  $\{X_n : n \in N\}$ -ը ոչ դատարկ, փակ և սահմանափակ ներդրված թվային բազմությունների ցանկացած ընտանիք է: Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \bigcap_{n \in N} X_n \neq \emptyset;$$

բ)  $\bigcap_{n \in N} X_n$ -ը կազմված է մեկ կետից, այն և միայն այն դեպքում, երբ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sup X_n - \inf X_n) = 0;$$

գ) բերել  $\{X_n : n \in N\}$  ներդրված փակ բազմությունների ընտանիքի այնպիսի օրինակ, որ  $\bigcap_{n \in N} X_n = \emptyset$ ;

դ) բերել  $\{X_n : n \in N\}$  ներդրված սահմանափակ բազմությունների ընտանիքի օրինակ, որի համար  $\bigcap_{n \in N} X_n = \emptyset$ :

## Գլուխ 3

### Ֆունկցիայի սահման

Սահմանափակ ֆունկցիաներ:  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան կոչվում է *սահմանափակ*, եթե սահմանափակ է  $f$ -ի արժեքների բազմությունը: Այս դեպքում  $\sup f(x) = \sup\{f(x): x \in X\}$  և  $\inf f(x) = \inf\{f(x): x \in X\}$  թվերը կոչվում են ֆունկցիայի համապատասխանաբար ճշգրիտ վերին և ճշգրիտ ստորին եզրեր: Եթե  $f$ -ի արժեքների բազմությունը վերին (ներքին) սահմանափակ չէ, ապա գրում են  $\sup f(x) = +\infty$  ( $\inf f(x) = -\infty$ ):

$f$  ֆունկցիան կոչվում է *a կետում սահմանափակ*, եթե գոյություն ունի  $a$  կետի  $U_a$  շրջակայք, այնպիսին, որ  $X \cap U_a$  բազմության վրա  $f$ -ի ընդունած արժեքների բազմությունը սահմանափակ է:

Ֆունկցիայի սահման: Դիցուք  $a$ -ն  $X$  բազմության կուտակման կետ է:  $A$  թիվը կոչվում է  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիայի սահման  $a$  կետում և նշանակվում  $A = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon)$$

(ֆունկցիայի սահման ըստ Կոշիի):

Որպեսզի  $A$  թիվը լինի  $f$  ֆունկցիայի սահմանն  $a$  կետում, անհրաժեշտ է և բավարար, որ ցանկացած  $x_n \rightarrow a$  ( $x_n \in X, x_n \neq a, n = 1, 2, \dots$ ) հաջորդականության համար  $y_n = f(x_n)$  հաջորդականությունը ձգտի  $A$ -ի (ֆունկցիայի սահման ըստ Հայնեի):

Ասում են, որ  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $a$  կետում ունի *անվերջ սահման* և գրում՝

ա)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ , բ)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ , գ)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ , եթե

ա)  $\forall E > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| > E)$ ,

բ)  $\forall E > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < -E)$ ,

գ)  $\forall E > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > E)$ :

Դիցուք  $\infty$ -ի ցանկացած շրջակայք  $X$  բազմության հետ ունի ոչ դատարկ հատում:  $A$  թիվն անվանում են  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիայի *սահման անվերջում* և գրում  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ , եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta > 0 \forall x \in X (|x| > \Delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon):$$

Համանմանորեն սահմանվում են ֆունկցիայի վերջավոր կամ անվերջ սահմաններ  $-\infty$ -ում և  $+\infty$ -ում:

Թեորեմ: Եթե  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $a$  կետում ունի վերջավոր սահման, ապա  $f$ -ն  $a$  կետում սահմանափակ է:

Կ ո շ ի ի ս կ զ ք ու ն ք ը : Որպեսզի  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $a \in X'$  կետում ունենա վերջավոր սահման, անհրաժեշտ է և բավարար, որ

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in X \left( 0 < |x_1 - a| < \delta \text{ և } 0 < |x_2 - a| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \right):$$

Թեորեմ: Եթե  $f$  և  $g$  ֆունկցիաներն  $a$  կետում ունեն վերջավոր սահման, ապա  $f \pm g$ ,  $f \cdot g$  և, եթե  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$ ,  $f(x)/g(x)$  ֆունկցիաները նույնպես ունեն վերջավոր սահման, ընդ որում՝

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}:$$

Մ ի ա կ ո ղ մ ա ն ի ս ա հ մ ա ն ն ե ր : Մ ա ս ն ա կ ի ս ա հ մ ա ն ն ե ր : Գիցուք  $X$  բազմության  $a$  կուտակման կետն այնպիսին է, որ ցանկացած  $\delta > 0$  թվի համար  $(a - \delta; a)$  միջակայքն  $X$  բազմության հետ ունի ոչ դատարկ հատում:  $A$  թիվը կոչվում է  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիայի *ձախակողմյան սահման*  $a$  կետում, եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \left( a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon \right):$$

Նույն ձևով սահմանվում է ֆունկցիայի *աջակողմյան սահմանը*  $a$  կետում: Չախակողմյան և աջակողմյան սահմանները համապատասխանաբար նշանակվում են  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0)$  և  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0)$ :

Գիցուք ցանկացած  $\delta > 0$  թվի համար  $(a - \delta; a)$  և  $(a; a + \delta)$  միջակայքերից յուրաքանչյուրն  $X$  բազմության հետ ունի ոչ դատարկ հատում: Որպեսզի  $a$  կետում  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան ունենա սահման, անհրաժեշտ է և բավարար, որ  $a$  կետում գոյություն ունենան ֆունկցիայի միակողմանի սահմանները և լինեն հավասար ( $f(a-0) = f(a+0)$ ):

$A$  թիվը կոչվում է  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիայի *մասնակի սահման* կամ *սահմանային արժեք*  $a$  կետում, եթե գոյություն ունի  $x_n \rightarrow a$  ( $x_n \in X, x_n \neq a, n = 1, 2, \dots$ ) հաջորդականություն, որի համար  $y_n = f(x_n)$  հաջորդականությունը ձգտում է  $A$ -ի:

Տրված  $a$  կետում  $f$  ֆունկցիայի մասնակի սահմաններից փոքրագույնը (մեծագույնը) կոչվում է *ստորին (վերին) սահման* և նշանակվում  $\liminf_{x \rightarrow a} f(x)$  ( $\limsup_{x \rightarrow a} f(x)$ ): Որպեսզի ֆունկցիան տրված կետում ունենա սահման, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այդ կետում նրա ստորին և վերին սահմանները համընկնեն:

Ա ն վ ե ր ջ մ ե ծ և ա ն վ ե ր ջ փ ո յ ք ք ֆ ու ն կ ց ի ա ն ե ր :  $f$  ֆունկցիան  $a$  կետում կոչվում է *անվերջ փոքր*, եթե  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ : Իսկ եթե  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ , ապա  $f$  ֆունկցիան  $a$  կետում կոչվում է *անվերջ մեծ*:

Գիցուք  $f$ -ը և  $g$ -ն  $X$ -ի վրա որոշված ֆունկցիաներ են,  $a \in X'$  և  $g$ -ն  $a$ -ի շրջակայքում ներկայացված է  $g(x) = \alpha(x)f(x)$  տեսքով:

1) Եթե  $\alpha$ -ն սահմանափակ ֆունկցիա է, ապա գրում են  $g(x) = O(f(x))$ , երբ  $x \rightarrow a$  : Եթե նաև  $f(x) = O(g(x))$ , երբ  $x \rightarrow a$ , ապա  $f$ -ը և  $g$ -ն կոչվում են *միևնույն կարգի ֆունկցիաներ*  $x \rightarrow a$ -ի ձգտելիս:

2) Եթե  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 1$ , ապա  $f$ -ը և  $g$ -ն կոչվում են *համարժեք* (ասիմպտոտորեն համար-

ժեք) ֆունկցիաներ  $x \rightarrow a$ -ի ձգտելիս: Այս դեպքում գրում են  $f(x) \sim g(x)$ ,  $x \rightarrow a$  :

3) Եթե  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ , ապա  $g$ -ն անվանում են  $f$ -ի նկատմամբ անվերջ փոքր և գրում  $g(x) = o(f(x))$ , երբ  $x \rightarrow a$  : Մասնավորապես, եթե գրված է  $g(x) = o(1)$ ,  $x \rightarrow a$ , նշանակում է  $g$ -ն անվերջ փոքր է  $x \rightarrow a$ -ի ձգտելիս:

Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան անվերջ փոքր է (մեծ է), երբ  $x \rightarrow a$  : Եթե  $f$ -ն  $a$  կետի շրջակայքում ներկայացված է  $f(x) = g(x) + o(g(x))$  տեսքով, ապա  $g$ -ն անվանում են  $f$ -ի գլխավոր մաս:

## Ա

429. Ցույց տալ  $f(x)$  ֆունկցիայի սահմանափակությունը.

ա)  $f(x) = \frac{\sin x^6}{1+x^4}$  ;

բ)  $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$  ;

գ)  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  ;

դ)  $f(x) = \frac{1+x^2}{1+x^4}$  :

430. Հետազոտել  $f(x) = \ln x \cdot \sin^2 \frac{\pi}{x}$  ֆունկցիայի սահմանափակությունը  $(0; \varepsilon)$  միջակայքում:

431. Ստուգել, որ  $f(x) = \frac{x}{1+x}$  ֆունկցիայի համար  $\sup_{x \in [0; +\infty)} f(x) = 1$ ,

$\inf_{x \in [0; +\infty)} f(x) = 0$  :

Հաշվել  $f(x)$  ֆունկցիայի ճշգրիտ ստորին և վերին եզրերը նշված բազմության վրա (432-438).

432.  $f(x) = x^2$ ,  $[-2; 5]$ :

433.  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $(-\infty; +\infty)$ :

434.  $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ ,  $(-\infty; +\infty)$ :

435.  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ,  $(0; +\infty)$ :

436.  $f(x) = \sin x + \cos x$ , ա)  $[0; 2\pi]$ , բ)  $R$  :



437.  $f(x) = [x]$ ,  $u$   $[0;2)$ ,  $p$   $(0;2]$ :

438.  $f(x) = \cos(x^2 + x + 1)$ ,  $[0;1]$ :

« $\varepsilon - \delta$ » լեզվով ձևակերպել հետևյալ պնդումները (439-441).

439. ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ ;    բ)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ ;    գ)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ :

440. ա)  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty$ ;    բ)  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ ;    գ)  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = +\infty$ :

441. ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ;    բ)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ ;    գ)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ :

Ելնելով ֆունկցիայի սահմանի սահմանումից՝ սպացուցել հավասարությունը (442-445).

442.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 4x + 1}{x - 1} = 2$ :

443.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3x^2}{x - 3} = 9$ :

444.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1} = \frac{7}{3}$ :

445.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 7}{x^2 - 1} = 3$ :

446. Սպացուցել, որ եթե  $x_0$  կետի որևէ շրջակայքում տեղի ունեն  $g_1(x) \leq f(x) \leq g_2(x)$  ( $x \neq x_0$ ) անհավասարությունները և  $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x) = a$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ :

447. Դիցուք  $f: (a; b) \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է: Սպացուցել, որ

ա) ցանկացած  $x_0 \in (a; b)$  կետում  $f$ -ն ունի  $f(x_0 - 0)$  և  $f(x_0 + 0)$  վերջավոր միակողմանի սահմաններ;

բ)  $a$  և  $b$  կետերից յուրաքանչյուրում գոյություն ունեն վերջավոր կամ անվերջ սահմաններ:

448. Ստուգել, որ  $x = 0$  կետում  $f(x)$  ֆունկցիան սահման չունի.

ա)  $f(x) = \arctg \frac{1}{x}$ ;    բ)  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ;    գ)  $f(x) = \operatorname{sgn} \left( \sin \frac{1}{x} \right)$ :

449. Ստուգել, որ  $f(x)$  ֆունկցիան սահման չունի, երբ  $x \rightarrow \pm\infty$ .

ա)  $f(x) = \cos x$ ;    բ)  $f(x) = x - [x]$ :

450. Դիցուք  $f(x)$  և  $g(x)$  ֆունկցիաները  $x_0$  կետում սահման չունեն: Հետևում է արդյոք դրանից, որ  $f(x) + g(x)$  և  $f(x) \cdot g(x)$  ֆունկցիաները նույնպես սահման չունեն:

451. Տրված է  $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  ( $n \in N, a_n \neq 0$ ) բազմանդամը:

Սպացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow \infty} |P(x)| = +\infty$ :

452. Տրված է  $Q(x) = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}$  ( $a_n \neq 0, b_m \neq 0$ ) ռացիոնալ ֆունկցիան: Ապացուցել, որ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} Q(x) = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m} \text{ երբ } n = m, \\ 0, \text{ երբ } n < m, \\ \infty, \text{ երբ } n > m: \end{cases}$$

Հաշվել սահմանը (453-475).

453.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} :$

454.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5} :$

455.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2}, m, n \in \mathbb{N} :$

456.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3} :$

457.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16} :$

458.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5} :$

459.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+20)^{30}}{(2x+1)^{50}} :$

460.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}} :$

461.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1} :$

462.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}, m, n \in \mathbb{N} :$

463.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} :$

464.  $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{\sqrt[3]{x+2}} :$

465.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}} :$

466.  $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4} :$

467.  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2} :$

468.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{(x+a)(x+b)} - x \right) :$

469.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) :$

470.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x-x^2} - (1+x)}{x} :$

$$471. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2} - 2}{x+x^2} :$$

$$472. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} :$$

$$473. \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - 3}{\sqrt[4]{x+9} - 2} :$$

$$474. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1} :$$

$$475. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+P(x)} - 1}{x}, \text{ որտեղ } P(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n :$$

476. Օգտվելով  $\sin x < x < \operatorname{tg} x$ ,  $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ , անհավասարություններից՝ ապա-

ցուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ :

477. Ապացուցել, որ

ա)  $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$  ;

բ)  $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$  ;

գ)  $\lim_{x \rightarrow a} \operatorname{tg} x = \operatorname{tga}$ ,  $a \neq \frac{2n-1}{2}\pi$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; դ)  $\lim_{x \rightarrow a} \operatorname{ctg} x = \operatorname{ctga}$ ,  $a \neq \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  :

Հաշվել սահմանը (478-493).

$$478. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} :$$

$$479. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x-a)}{x-a} :$$

$$480. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x}, \beta \neq 0 :$$

$$481. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} :$$

$$482. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\sin 5x} :$$

$$483. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{ctg}^2 x :$$

$$484. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} :$$

$$485. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tga}}{x - a} :$$

$$486. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} :$$

$$487. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x} :$$

$$488. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{x^2} :$$

$$489. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px} :$$

$$490. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right) :$$

$$491. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x} :$$

$$492. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x^3 - 1}{\sin^6 2x} :$$

$$493. \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( \cos \frac{1}{x} - \cos \frac{3}{x} \right) :$$

494. Ապացուցել, որ ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ :

495. Ապացուցել, որ ա)  $\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a$  ( $a > 0$ ); բ)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ :

496. Ապացուցել, որ ա)  $\lim_{x \rightarrow b} a^x = a^b$  ( $a > 0$ ); բ)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$  ( $a > 0, a \neq 1$ ):

496.1. Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$ :

497. Գիցուք՝  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0$ , իսկ  $v(x)$  ֆունկցիան այնպիսին է, որ գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow a} u(x)v(x)$ : Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow a} [1 + u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} u(x)v(x)}$ :

497.1. ա) Գիցուք  $u(x) \geq 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$  և  $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = c$  ( $b < \infty, 0 < c < \infty$ ):

Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow a} (u(x))^{v(x)} = b^c$ :

բ) Գիցուք  $u(x) \geq 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$  և  $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = +\infty$ : Ապացուցել, որ եթե  $b < 1$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow a} (u(x))^{v(x)} = 0$ :

Հաշվել սահմանը (498-510).

498. ա)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$ :

499. ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1}\right)^{\frac{x^3}{1-x}}$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4} + 0} \left[ \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{8} + x \right) \right]^{\operatorname{tg} 2x}$ :

500. ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-2}\right)^x$ :

501. ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2}\right)^{x^2}$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{1+x-x}\right)^{x^{-1}}$ :

502. ա)  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x^{-2}}$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$ :

$$503. \text{ ւ) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + tgx}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}};$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$504. \text{ ւ) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a}; (a > 0);$$

$$\text{բ) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) + \ln(x-h) - 2 \ln x}{h^2};$$

$$505. \text{ ւ) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln tgx}{1 - ctgx};$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 - 4x + 4)}{\ln(x^{10} + 5x + 2)};$$

$$506. \text{ ւ) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + x2^x}{1 + x3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 + x}{2 + xe^x} \right)^{ctg^2 x};$$

$$507. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(1 + xe^x)};$$

$$508. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1 + \sin x} - 1}{\ln(1 + tgx)};$$

$$509. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n (a > 0, b > 0):$$

$$510. \text{ ւ) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + 3^x)}{\ln(1 + 2^x)}; \quad \text{բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + 3^x)}{\ln(1 + 2^x)};$$

511. Հետևյալ ֆունկցիաներն անվանում են հիպերբոլական ֆունկցիաներ.

$$shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad x \in R \text{ (հիպերբոլական սինուս),}$$

$$chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad x \in R \text{ (հիպերբոլական կոսինուս),}$$

$$thx = \frac{shx}{chx}, \quad x \in R \text{ (հիպերբոլական տանգենս),}$$

$$cthx = \frac{chx}{shx}, \quad x \in R \setminus \{0\} \text{ (հիպերբոլական կոտանգենս):}$$

Ապացուցել, որ  $\text{ւ) } \lim_{x \rightarrow x_0} shx = shx_0$ ;  $\text{բ) } \lim_{x \rightarrow x_0} chx = chx_0$ ;  $\text{գ) } \lim_{x \rightarrow x_0} thx = thx_0$ ;

$\text{դ) } \lim_{x \rightarrow x_0} cthx = cthx_0$  ( $x_0 \neq 0$ ):

512. Ապացուցել, որ  $\text{ւ) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{shx}{x} = 1$ ;  $\text{բ) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{thx}{x} = 1$ ;  $\text{գ) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{chx - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$ :

Հաշվել սահմանը (513-515).

$$513. \lim_{x \rightarrow a} \frac{shx - sha}{x - a} :$$

$$514. \lim_{x \rightarrow a} \frac{chx - cha}{x - a} :$$

$$515. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln chx}{\ln \cos x} :$$

$$516. \text{Ապացուցել, որ ա) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1; \text{ բ) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg x}{x} = 1 :$$

Հաշվել սահմանը (517-520).

$$517. \lim_{x \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1-x}{1+x} :$$

$$518. \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{\pi}{4} - \arctg \frac{x}{x+1} \right) :$$

$$519. \lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos \left( \sqrt{x^2 + x} - x \right) :$$

$$520. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\arctg(x+h) - \arctg x}{h} :$$

521. Տրված է  $y = f(x)$  ֆունկցիան: « $\varepsilon - \delta$ » լեզվով ձևակերպել, թե  $h^\circ$  նշ և նշանակում ֆունկցիայի սահման ներքևից կամ վերևից.

ա)  $y \rightarrow b - 0$ , երբ  $x \rightarrow a$ ;      բ)  $y \rightarrow b - 0$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$ ;

գ)  $y \rightarrow b + 0$ , երբ  $x \rightarrow a - 0$ ;      դ)  $y \rightarrow b + 0$ , երբ  $x \rightarrow \infty$ ;

Հաշվել սահմանը և պարզել, թե ֆունկցիան իր սահմանին ձգտում է վերևից, թե՞ ներքևից (522-525).

$$522. \text{ա) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{1+x} ;$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x} ;$$

$$523. \text{ա) } \lim_{x \rightarrow 1-0} \arctg \frac{1}{1-x} ;$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow 1+0} \arctg \frac{1}{1-x} ;$$

$$524. \text{ա) } \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} ;$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} ;$$

$$525. \text{ա) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} ;$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} ;$$

Գտնել  $f(x_0 - 0)$ -ն և  $f(x_0 + 0)$ -ն (526-534).

$$526. f(x) = \frac{x - |x|}{2x}, \quad x_0 = 0 :$$

$$527. f(x) = 2^{ctg x}, \quad x_0 = 0 :$$

$$528. f(x) = \frac{2(1-x^2) + |x^2 - 1|}{3(1-x^2) - |1-x^2|}, \quad x_0 = 1 :$$

$$529. f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x), \quad x_0 = \frac{\pi}{2} :$$

$$530. f(x) = \frac{1}{x + 3^{\frac{1}{3-x}}}, \quad x_0 = 3 :$$

$$531. f(x) = x + [x^2], \quad x_0 = 10 :$$

532.  $f(x) = \frac{1}{x - [x]}$ ,  $x_0 = -1$ :

533.  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1 + x^n}$ ,  $x_0 = 1$ :

534.  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x^n - 3}{x^n - 1}$ ,  $x_0 = 1$ :

Գտնել  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ -ը և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ -ը (535-537).

535.  $f(x) = \left( \frac{1+x}{1+2x} \right)^x$ :

536.  $f(x) = \left( 1 + \frac{1}{|x|} \right)^x$ :

537.  $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ :

538. Ստուգել, որ եթե  $f(x) = o(1)$ ,  $g(x) = o(1)$  և  $f \sim g$ , երբ  $x \rightarrow a$ , ապա  $f - g = o(f)$ , երբ  $x \rightarrow a$ :

539. Ապացուցել, որ

ա)  $O(1) + O(1) = O(1)$ ;

բ)  $o(1) + O(1) = O(1)$ ;

գ)  $O(f(x)) + o(f(x)) = O(f(x))$ ;

դ)  $o(1) + o(1) = o(1)$ ;

ե)  $o(o(f(x))) = o(f(x))$ ;

զ)  $O(o(f(x))) = o(f(x))$ :

540. Գիցուք  $x \rightarrow 0$  և  $m > n > 0$ : Ապացուցել, որ

ա)  $O(x^n) + O(x^m) = O(x^n)$ ;

բ)  $O(x^n) \cdot O(x^m) = O(x^{m+n})$ :

541. Գիցուք  $x \rightarrow \infty$  և  $m > n > 0$ : Ապացուցել, որ

ա)  $O(x^n) + O(x^m) = O(x^m)$ ;

բ)  $O(x^n) \cdot O(x^m) = O(x^{m+n})$ :

542. Գիցուք  $x \rightarrow 0$ : Ապացուցել, որ

ա)  $2x - x^2 = O(x)$ ;    բ)  $x \sin \sqrt{x} = O(x^{\frac{3}{2}})$ ;    գ)  $x \sin \frac{1}{x} = O(|x|)$ :

543. Գիցուք  $x \rightarrow +\infty$ : Ապացուցել, որ

ա)  $\frac{x+1}{x^2+x} = O\left(\frac{1}{x}\right)$ ;

բ)  $x + x^2 \sin x^2 = O(x^2)$ ;

գ)  $\frac{\arctg x}{1+x^2} = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ ;

դ)  $x^p e^{-x} = o(x^{-2})$ :

544. Ապացուցել, որ

ա)  $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ , երբ  $x \rightarrow 0$ ;

բ)  $\lg(x-1) \sim x-1$ , երբ  $x \rightarrow 1$ ;

գ)  $\arctg \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$ , երբ  $x \rightarrow \infty$ ;

դ)  $\lg x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$ , երբ  $x \rightarrow 0$ ;

ե)  $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \sim \sqrt[8]{x}$ , երբ  $x \rightarrow 0$ ;    գ)  $x^2 + x \ln^{100} x \sim x^2$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$  :

545. Ապացուցել հետևյալ ասիմպտոտիկ բանաձևերը ( $x \rightarrow 0$ ).

ա)  $\sin x = x + o(x)$ ;

բ)  $tgx = x + o(x)$ ;

գ)  $e^x = 1 + x + o(x)$ ;

դ)  $a^x = 1 + x \ln a + o(x)$ ;

ե)  $\ln(1+x) = x + o(x)$ ;

զ)  $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ ;

է)  $\arcsin x = x + o(x)$ ;

ը)  $arctgx = x + o(x)$ ;

546. Ապացուցել ասիմպտոտիկ բանաձևը՝

$$\sqrt{x^2 + px + q} = x + \frac{p}{2} + O\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow +\infty :$$

Օգտվելով 545 խնդրում բերված ասիմպտոտիկ բանաձևերից՝ հաշվել ասիմանը (547-557).

547.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos 5x}{\ln \cos 4x}$  :

548.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 5x} - e^{\sin x}}{\ln(1+2x)}$  :

549.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{tg 2x - 3 \arcsin 4x}{\sin 5x - 6 arctg 7x}$  :

550.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin tg \frac{x^2}{2}}{\ln \cos 3x}$  :

551.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{arctg(2-x) + \sin(x-2)^2}{x^2 - 4}$  :

552.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1+x^2+x^3} - 1}{\ln \cos x}$  :

553.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{310} \sqrt{x} \cos x + \sin^3 x}{1 - \sqrt{1+x^3}}$  :

554.  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{2 \sin \sqrt{x^2 + \sqrt{x^3}} + \ln(1+x)}{x + \sqrt{x\sqrt{x}}}$  :

555.  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} (e^{7\sqrt[3]{x}} - 1)}{\ln(1 + \sqrt[3]{x}) \cdot \ln(1 + 3x)}$  :

556.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 2x - 2tgx)^2 + (1 - \cos 2x)^3}{tg^7 6x + \sin^6 x}$  :

557.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \arcsin 2x - 3x^3}{\sin 3x + tg^2 x + (e^x - 1)^{10}}$  :

558. Դիցուք  $f$  -ն անվերջ փոքր է, երբ  $x \rightarrow a$  : Կասենք, որ  $f$  -ը  $(x-a)$ -ի նկատմամբ  $k$  -րդ կարգի ( $k > 0$ ) անվերջ փոքր է, եթե  $f$  -ն ու  $(x-a)^k$  -ը միևնույն կարգի են: Որոշել անվերջ փոքր ֆունկցիայի կարգը, երբ  $x \rightarrow 0$ .

ա)  $f(x) = \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ ;

բ)  $f(x) = \sqrt{1-2x} - \sqrt[3]{1-3x}$ ;

գ)  $f(x) = \sqrt{4-x^4} + x^2 - 2$ ;

դ)  $f(x) = \sin\left(\sqrt{x^2+9} - 3\right)$ ;



$$b) f(x) = 2^{x^2} - 1;$$

$$q) f(x) = 1 - x^4 - \cos^2 x:$$

559. Դիցուք  $f$  -ն անվերջ մեծ է, երբ  $x \rightarrow a$ : Կասենք, որ  $f$  -ը  $\frac{1}{x-a}$  -ի նկատմամբ (եթե  $a = \infty$   $x$ -ի նկատմամբ)  $k$  -րդ կարգի ( $k > 0$ ) անվերջ մեծ է, եթե  $f$  -ն ու  $\frac{1}{(x-a)^k}$  -ը ( $x^k$  -ը) միևնույն կարգի են: Որոշել անվերջ մեծ ֆունկցիայի կարգը.

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}, \text{ երբ } x \rightarrow +\infty;$$

$$p) f(x) = \frac{\ln x}{(x-1)^2}, \text{ երբ } x \rightarrow 1;$$

$$q) f(x) = ctg^2 x^3, \text{ երբ } x \rightarrow 0;$$

$$n) f(x) = \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^5}, \text{ երբ } x \rightarrow 0:$$

Պարզել թե հետևյալ ֆունկցիաներից որո՞նք են անվերջ փոքր (560-562).

$$560. f(x) = \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}}, x \rightarrow 0:$$

$$561. f(x) = \sin \ln(x^2 + 1) - \sin \ln(x^2 - 1), x \rightarrow \infty:$$

$$562. f(x) = \frac{1}{1 + 2^x} \quad \text{a) երբ } x \rightarrow -\infty; \quad \text{p) երբ } x \rightarrow +\infty:$$

Պարզել թե հետևյալ ֆունկցիաներից որո՞նք են անվերջ մեծ (563-566).

$$563. f(x) = x \left( \sqrt{x^2 + 1} - x \right), \quad \text{a) } x \rightarrow -\infty; \quad \text{p) } x \rightarrow +\infty:$$

$$564. f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt[3]{(1 - \sin x)^2}}, x \rightarrow \frac{\pi}{2}:$$

$$565. f(x) = (1-x)^{\frac{1}{x^2}} \quad \text{a) } x \rightarrow +0; \quad \text{p) } x \rightarrow -0:$$

$$566. f(x) = chx - shx \quad \text{a) } x \rightarrow -\infty; \quad \text{p) } x \rightarrow +\infty:$$

567. Դիցուք  $x \rightarrow 1$ : Հետևյալ ֆունկցիաներից անջատել գլխավոր մասը  $C(x-1)^n$  տեսքով և որոշել անվերջ փոքրի կարգը  $(x-1)$ -ի նկատմամբ.

$$a) y = \sqrt[3]{1 - \sqrt{x}}; \quad \text{p) } y = \ln x; \quad \text{q) } y = e^x - e; \quad \text{n) } y = x^x - 1:$$

568. Դիցուք  $x \rightarrow +\infty$ : Հետևյալ ֆունկցիաներից անջատել գլխավոր մասը  $Cx^n$  տեսքով և որոշել անվերջ մեծի կարգը  $x$ -ի նկատմամբ.

$$\text{ա) } y = \frac{2x^5}{x^3 - 3x + 1}; \quad \text{բ) } y = \sqrt[3]{x^2 - x} + \sqrt{x}; \quad \text{գ) } y = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}}$$

569. Հաշվել  $\overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x)$ -ը և  $\underline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x)$ -ը, եթե

$$\text{ա) } f(x) = \sin^2 \frac{1}{x} + \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}; \quad \text{բ) } f(x) = (2 - x^2) \cos \frac{1}{x}$$

570. Հաշվել  $\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x)$ -ը և  $\underline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x)$ -ը, եթե

$$\text{ա) } f(x) = \sin x; \quad \text{բ) } f(x) = x^2 \cos^2 x;$$

$$\text{գ) } f(x) = \frac{\pi}{2} \cos^2 x - \operatorname{arctg} x$$

571. Ապացուցել, որ  $\chi$ -ի փունկցիան՝

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \text{եթե } x - \text{ը ռացիոնալ է,} \\ 0, & \text{եթե } x - \text{ը իռացիոնալ է,} \end{cases}$$

նշ մի կետում սահման չունի:

572. Կառուցել փունկցիա, որը միայն մեկ կետում ունի վերջավոր սահման:

## Բ

573. Դիցուք  $f_1(x)$  և  $f_2(x)$  փունկցիաները որոշված են  $X$  բազմության վրա: Ապացուցել, որ

$$\sup(f_1(x) + f_2(x)) \leq \sup f_1(x) + \sup f_2(x);$$

$$\inf(f_1(x) + f_2(x)) \geq \inf f_1(x) + \inf f_2(x):$$

Կառուցել  $f_1(x)$  և  $f_2(x)$  փունկցիաներն այնպես, որ ա) բերված անհավասարությունները լինեն խիստ, բ) տեղի ունենա հավասարություն:

574. Դիցուք

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{եթե } x - \text{ն իռացիոնալ է,} \\ n, & \text{եթե } x = \frac{m}{n} \in \mathcal{Q} \text{ (անկրճատելի կտորրակ է և } n \in \mathbb{N} \text{):} \end{cases}$$

Ապացուցել, որ  $f(x)$ -ը ոչ մի կետում սահմանափակ չէ:

575. Ապացուցել, որ  $\Omega$ -ի մանի փունկցիան՝

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{երբ } x = \frac{p}{q} \text{ (անկրճատելի կոտորակ է և } q \in N), \\ 0, & \text{երբ } x \text{-ն իռացիոնալ է,} \end{cases}$$

բոլոր կետերում ունի սահման:

**576.** Գիցուք  $y = R(x)$ -ը Ռիմանի ֆունկցիան է և  $f(y) = \operatorname{sgn}|y|$ : Ստուգել, որ  $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = 0$ ,  $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1$ , սակայն  $f(R(x))$  բարդ ֆունկցիան  $x_0 = 0$  կետում սահման չունի:

**577.** Ապացուցել, որ եթե  $f(x) \neq b$ , երբ  $x \neq a$  և գոյություն ունեն  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ ,

$\lim_{y \rightarrow b} g(y)$  սահմանները, ապա  $a$  կետում գոյություն ունի  $g(f(x))$  բարդ ֆունկցիայի սահմանը և  $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$ :

**577.1.** Ապացուցել, որ եթե գոյություն ունեն  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  և  $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = g(b)$

սահմանները, ապա  $a$  կետում գոյություն ունի  $g(f(x))$  բարդ ֆունկցիայի սահմանը և  $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b)$ :

Հաշվել սահմանը (578-585).

$$578. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(x^2+1) \cdots (x^n+1)}{[(nx)^n + 1]^{\frac{n+1}{2}}}; \quad 579. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2}, n \in N:$$

$$580. \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}, n \in N:$$

$$581. \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right), m, n \in N: \quad 582. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt[5]{1+5x} - (1+x)}:$$

$$583. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x}, m, n \in N:$$

$$584. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \cdots (1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^{n-1}}, n \in N:$$

$$585. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2) \cdots (x+a_n)} - x):$$

**586.** Ընտրել  $a_i$  և  $b_i$  ( $i=1,2$ ) թվերն այնպես, որ ճշմարիտ լինեն

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_1 x - b_1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2) = 0$$

հավասարությունները:

587. Ընտրել  $\lambda$  և  $\mu$  թվերն այնպես, որ

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \sqrt{a_k x^2 + b_k x + c_k} - \lambda x - \mu \quad (a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n)$$

ֆունկցիան լինի անվերջ փոքր, երբ  $x \rightarrow +\infty$ :

Հաշվել սահմանը (588-609).

588.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+2x) - 2\cos(a+x) + \cos a}{x^2}$  :

589.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ctg(a+2x) - 2ctg(a+x) + ctga}{x^2}$  :

590.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}$  :

591.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{tg(a+x)tg(a-x) - tg^2 a}{x^2}$  :

592.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}$  :

593.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$  :

594.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$  :

595.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{a_1 x + b_1}{a_2 x + b_2} \right)^x, a_1, a_2 > 0$  ;

596.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + tgx}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin^3 x}}$  :

597.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{tgx}$  :

598.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{\cos \alpha x} - \sqrt[m]{\cos \beta x}}{x^2}$  :

599.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( tg \left( \frac{\pi}{4} + ax \right) \right)}{\sin bx}$  :

600.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + \sin x \cos \alpha x}{1 + \sin x \cos \beta x} \right)^{ctg^3 x}$  :

601.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x^\alpha}{\sin \pi x^\beta}$  :

602.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(2^x \pi)}{\ln(\cos(2^x \pi))}$  :

603.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x}$  :

604. ա)  $\lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b}, a > 0$  ;

բ)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}, a > 0$  :

605. ա)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x^\beta - a^\beta}, a > 0$  ;

բ)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a}$  :

$$606. \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{a^x} - a^{x^a}}{a^x - a^a}, a > 0:$$

$$607. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+a)^{x+a} (x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}:$$

$$608. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a+b+c} \right)^{\frac{1}{x}}, a, b, c > 0:$$

$$609. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^{x^2} + b^{x^2}}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}}, a, b > 0:$$

610. Ապացուցել, որ եթե  $a > 1, n > 0, \varepsilon > 0$ , ապա

$$\omega) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{a^x} = 0; \quad \rho) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\varepsilon} = 0; \quad \text{q) } \lim_{x \rightarrow +0} x^\varepsilon \log_a x = 0:$$

Հաշվել սահմանը (611-625).

$$611. \lim_{x \rightarrow +0} \ln(x \ln a) \ln \left( \frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right), a > 1: \quad 612. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{ch \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^{n^2}:$$

$$613. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx - n}{\sin x^2}:$$

$$614. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx}{\sqrt{1+2x}-1}: \quad 615. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x + \dots + \operatorname{tg} nx}{\operatorname{arctg} x}:$$

$$616. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin x} - e^{\sin 2x}}{\sqrt[3]{\pi x^2} - \pi}: \quad 617. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln \sin \frac{x}{2}}{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{\pi}}:$$

$$618. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \left( x^2 + \cos \frac{\pi x}{2} \right)}{\sqrt{x} - 1}: \quad 619. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^{x^2} - 16}{\ln(x^2 - x - 1)}:$$

$$620. \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\arccos x}{\sqrt{-\ln x}}: \quad 621. \lim_{x \rightarrow 1-0} \left( \operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\frac{1}{\arccos^2 x}}:$$

$$622. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right):$$

623.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}), |x| < 1:$

624.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2) \cdots (1+a^n)}, a > 0:$  625.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n}:$

$\alpha$ -ի և  $\beta$ -ի ինչպիսի արժեքների դեպքում  $f(x)$  ֆունկցիան կլինի անվերջ փոքր (626-630).

626.  $f(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1} - \alpha x - \beta$     ա)  $x \rightarrow +\infty$ ;    բ)  $x \rightarrow -\infty$ :

627.  $f(x) = (x+4)e^{\frac{1}{x}} - \alpha x - \beta, x \rightarrow \infty:$

628.  $f(x) = \ln(1+e^{3x}) - \alpha x - \beta$     ա)  $x \rightarrow +\infty$ ;    բ)  $x \rightarrow -\infty$ :

629.  $f(x) = x \operatorname{arctg} x - \alpha x - \beta$     ա)  $x \rightarrow +\infty$ ;    բ)  $x \rightarrow -\infty$ :

630.  $f(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^\beta}, x \rightarrow +0:$

631. Գիցուք՝  $x \rightarrow 0$ : Գտնել  $f(x)$  ֆունկցիայի գլխավոր մասը՝  $Cx^\alpha$  տեսքով.

ա)  $f(x) = (\cos x)^{2 \sin x} - e^{-x^2};$     բ)  $f(x) = \sqrt[3]{\cos \sqrt{6x}} - 1 - 2 \ln(1-x^2):$

632. Հաշվել  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ -ը և  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ -ը, եթե

ա)  $f(x) = 2^{\sin x^2}, a = \infty;$     բ)  $f(x) = \frac{x}{1+x^2 \sin^2 x}, a = +\infty;$

գ)  $f(x) = e^{\cos \frac{1}{x^2}}, a = 0;$     դ)  $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x}}, a = 0;$

ե)  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x-2} \cdot \sin \frac{\pi}{x-2}, a = 2:$

633. Գտնել  $f(x)$  ֆունկցիայի սահմանային արժեքների բազմությունը.

ա)  $f(x) = \sin \frac{1}{x}, x \rightarrow 0;$     բ)  $f(x) = \frac{1}{x - [x]}, x \rightarrow \infty:$

634. Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos 4x + \sin x) = 2:$

Կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը (635-640).

635.  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n}, x \geq 0:$

636.  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} (x-1) \operatorname{arctg} x^n:$

637.  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+e^{n(x+1)}}:$

638.  $y = \lim_{t \rightarrow x} \frac{1}{t-x} \ln \frac{t}{x}, x > 0:$

$$639. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x t g^{2n} \frac{\pi x}{4} + \sqrt{x}}{t g^{2n} \frac{\pi x}{4} + 1}, \quad x \geq 0: \quad 640. y = \lim_{n \rightarrow \infty} x \operatorname{sgn} |\sin(n! \pi x)|:$$

## Գ

641. Դիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան որոշված է  $(a; +\infty)$  բազմության վրա և սահմանափակ է ցանկացած  $(a; b)$  միջակայքում: Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x));$$

$$\text{բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} \quad (f(x) \geq c > 0),$$

ենթադրելով, որ աջ կողմում գրված սահմանները գոյություն ունեն և վերջավոր են:

$$642. \text{ Հաշվել հետևյալ սահմանները. ա) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}}; \text{ բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}:$$

643. Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան որոշված է  $(a; +\infty)$  բազմության վրա, սահմանափակ է ցանկացած  $(a; b)$  միջակայքում և

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = \infty, \text{ ապա } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \infty:$$

644. Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան որոշված է  $(a; +\infty)$  բազմության վրա, սահմանափակ է ցանկացած  $(a; b)$  միջակայքում և գոյություն ունի

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

վերջավոր կամ անվերջ սահմանը, ապա

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}:$$

645. Դիցուք  $\alpha_{mn}$  հաջորդականությունը  $m$ -ի նկատմամբ հավասարաչափ ձգտում է զրոյի, երբ  $n \rightarrow \infty$ .  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow |\alpha_{mn}| < \varepsilon)$ :

Ապացուցել, որ եթե  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները որոշված են  $x = 0$  կետի շրջակայքում,  $f(x) > 0$  և  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1$ , ապա

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (g(\alpha_{1n}) + g(\alpha_{2n}) + \dots + g(\alpha_{nn})) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(\alpha_{1n}) + f(\alpha_{2n}) + \dots + f(\alpha_{nn})),$$

ընդունելով, որ աջ կողմում սահմանը գոյություն ունի:

Օգտվելով նախորդ խնդրից՝ հաշվել սահմանը (646-649).

$$646. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sqrt[3]{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right):$$

$$647. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{ka}{n^2}:$$

$$648. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( a^{\frac{k}{n^2}} - 1 \right), a > 0:$$

$$649. \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{ka}{n\sqrt{n}}:$$

$$650. \text{Գտնել } f(x)\text{-ը, եթե } f(0)=1, f(2x)=f(x)\cos^2 x \text{ և } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)=1:$$

651. Դիցուք  $x_0 = m$ ,  $x_n = m + \varepsilon \sin x_{n-1}$  ( $n \in \mathbb{N}, 0 < \varepsilon < 1$ ): Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $x_n$  հաջորդականության սահմանը և այն հանդիսանում է  $x - \varepsilon \sin x = m$  հավասարման (Կեպլերի հավասարման) միակ լուծումը:

652. Ապացուցել, որ ինչպիսին էլ լինեն անվերջի ձգտող  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$  ( $x_0 < x < +\infty$ ) ֆունկցիաները, գոյություն ունի  $f(x)$  ֆունկցիա, որն ավելի արագ է աճում, քան  $f_n(x)$ -երից յուրաքանչյուրը. ցանկացած  $n$ -ի համար

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f_n(x)} = \infty:$$

653. Դիցուք  $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  ֆունկցիան  $[a; b]$  հատվածի յուրաքանչյուր կետում ունի վերջավոր սահման: Ապացուցել, որ  $f$ -ը սահմանափակ է:

654. Դիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները որոշված են ամբողջ թվային առանցքի վրա և պարբերական են: Հայտնի է, որ  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$ : Ապացուցել, որ  $f(x) \equiv g(x)$ :

655. Դիցուք  $f: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ֆունկցիան  $(0; 1)$  միջակայքում սահմանափակ է և ցանկացած  $x$  և  $y$  դրական թվերի համար  $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  սահմանը (վերջավոր կամ անվերջ):

656. Դիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան  $(0; +\infty)$  միջակայքում մոնոտոն է, դրական և

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1: \text{ Ապացուցել, որ ցանկացած } C \text{ դրական թվի համար}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(Cx)}{f(x)} = 1:$$



657. Տրված է՝  $\lambda, \mu \in R, \lambda \neq \mu$  : Ապացուցել, որ  $\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |\sin \lambda x - \sin \mu x| \geq 1$  :

658. Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան որոշված է  $R$ -ի վրա և ցանկացած  $a$ -ի համար

$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{a}{n}\right) = 0$  : Հետևո՞ւմ է արդյոք այդտեղից, որ  $x = 0$  կետում  $f(x)$  ֆունկցիան ունի սահման:

## Գլուխ 4

### Անընդհատ ֆունկցիաներ, հավասարաչափ անընդհատություն

Ֆունկցիայի անընդհատությունը:  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $x_0 \in X$  կետում կոչվում է *անընդհատ*, եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon):$$

Եթե  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է  $X$  բազմության յուրաքանչյուր կետում, ապա այն անվանում են  $X$ -ի վրա *անընդհատ ֆունկցիա* և գրում  $f \in C(X)$ :

Եթե որևէ  $x_0 \in X$  կետում ֆունկցիան անընդհատ չէ, ապա այն անվանում են *խզվող ֆունկցիա*, իսկ  $x_0$ -ն՝ ֆունկցիայի *խզման կետ*:

$f: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիայի խզման կետերը դասակարգվում են երկու սեռի.  $x_0 \in (a; b)$  խզման կետը կոչվում է *առաջին սեռի*, եթե  $f$ -ն այդ կետում ունի  $f(x_0 - 0)$  և  $f(x_0 + 0)$  վերջավոր միակողմանի սահմաններ: Ընդ որում, երբ  $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$  խզումը կոչվում է *վերացնելի*: Իսկ երբ  $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$ , այդ դեպքում  $f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$  քիվն անվանում են  $x_0$  կետում ֆունկցիայի *բռնչք*: Հատվածի ծայրակետում ֆունկցիայի խզումը կոչվում է *առաջին սեռի*, եթե գոյություն ունի միակողմանի սահմանը:

Եթե ֆունկցիայի խզումը առաջին սեռի չէ, ապա այն անվանում են *երկրորդ սեռի խզում*:

Անընդհատ ֆունկցիայի լակուալ հատկությունն է: Եթե  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $x_0 \in X$  կետում անընդհատ է, ապա այն  $x_0$  կետում սահմանափակ է: Եթե նաև  $f(x_0) > p$  ( $f(x_0) < q$ ), ապա գոյություն ունի  $\delta > 0$  այնպիսին, որ ցանկացած  $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  կետում  $f(x) > p$  ( $f(x) < q$ ):

Դիցուք  $g: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում նույնպես անընդհատ է: Այդ դեպքում  $f \pm g$ ,

$fg$  ֆունկցիաները, ինչպես նաև  $\frac{f}{g}$  ֆունկցիան, եթե  $g(x_0) \neq 0$ , անընդհատ են  $x_0$  կետում:

Եթե  $f: X \rightarrow Y$  ֆունկցիան անընդհատ է  $x_0 \in X$  կետում, իսկ  $g: Y \rightarrow Z$  ֆունկցիան անընդհատ է  $y_0 = f(x_0)$  կետում, ապա  $z = g(f(x))$  բարդ ֆունկցիան անընդհատ է  $x_0$  կետում:

Անընդհատ ֆունկցիայի գլոբալ հատկությունն է: Դիցուք  $f \in C[a; b]$ : Այդ դեպքում.

ա) եթե  $f(a)f(b) < 0$ , ապա գոյություն ունի  $c \in (a; b)$ , այնպիսին, որ  $f(c) = 0$  (Բուլցանո-Կոշիի թեորեմ);

բ)  $f$ -ը սահմանափակ ֆունկցիա է: Գոյություն ունի կետ, որում ֆունկցիան ընդունում է իր մեծագույն արժեքը և գոյություն ունի կետ, որում ֆունկցիան ընդունում է իր փոքրագույն արժեքը (Վայերշտրասի թեորեմ);

զ) եթե  $f$ -ը անոդ (նվազող) է  $[a; b]$ -ում, ապա  $f$ -ի արժեքների բազմությունը  $[f(a); f(b)]$  ( $[f(b); f(a)]$ ) հատվածն է, և  $f^{-1}$  ֆունկցիան այդ հատվածի վրա անընդհատ է:

Հավասարաչափ անընդհատություն:  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան կոչվում *հավասարաչափ անընդհատ ֆունկցիա*, եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in X (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon):$$

Բաց բազմությունների  $\Sigma$  ընտանիքը կոչվում է  $X$  բազմության *բաց ծածկույթ*, եթե  $X \subset \bigcup \Sigma$ : Եթե  $\Sigma_0 \subset \Sigma$  վերջավոր ընտանիքն այնպիսին է, որ  $X \subset \bigcup \Sigma_0$ , ապա  $\Sigma_0$ -ն անվանում են  $X$  բազմության  $\Sigma$  ծածկույթից անջատված *վերջավոր ենթածածկույթ*:

Բորել-Լեբեգի լեմման:  $[a; b]$  հատվածի ցանկացած բաց ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

Կանտորի թեորեմը:  $[a; b]$  հատվածի վրա անընդհատ ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է:

## Ա

**659.** Յույց տալ, որ եթե  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիայի  $x_0$  անընդհատության կետը  $X$  բազմության կուտակման կետ է, ապա  $f$ -ը այդ կետում ունի սահման, ընդ որում՝  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ :

**660.** Ելնելով ֆունկցիայի անընդհատության սահմանումից՝ համոզվել, որ ֆունկցիան իր որոշման տիրույթի բոլոր մեկուսացված կետերում անընդհատ է:

**661.** Ապացուցել, որ որպեսզի  $f$ -ն  $x_0$  կետում լինի անընդհատ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն լինի  $x_0$ -ում թե՛ ձախից և թե՛ աջից անընդհատ:

**662.** Ստուգել, որ հետևյալ ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրն իր որոշման տիրույթի վրա անընդհատ է (տես վարժ. 477, 495, 496).

ա)  $y = ax + b$ ;                      բ)  $y = x^2$ ;                      գ)  $y = \sqrt{x}$ ;

դ)  $y = x^n$  ( $n \in N$ );                ե)  $y = \cos x$ ;                      զ)  $y = tgx$ ;

է)  $y = arctgx$ ;                      ը)  $y = \ln x$ ;                      թ)  $y = 2^x$ :

Հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը: Դասակարգել խզման կետերն ըստ սեռի (663-682).

**663.**  $y = [x]$ :      **664.**  $y = x - [x]$ :      **665.**  $y = \operatorname{sgn} x$ :      **666.**  $y = \operatorname{sgn}|x|$ :

**667.**  $y = \begin{cases} x^2, & \text{երբ } x \in (-\infty; 1), \\ 2x - 1, & \text{երբ } x \in [1; +\infty): \end{cases}$

$$668. y = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{երբ } x \neq 2, \\ 4, & \text{երբ } x = 2: \end{cases}$$

$$669. f(x) = \left| \frac{\sin x}{x} \right|, \text{ երբ } x \neq 0, f(0) = 1:$$

$$670. f(x) = \frac{1}{x}, \text{ երբ } x \neq 0, f(0) = 0:$$

$$671. f(x) = \operatorname{ctgx}, \text{ երբ } x \neq \pi n, f(\pi n) = 0 \quad (n \in Z):$$

$$672. f(x) = \frac{1+x}{1+x^3}, \text{ երբ } x \neq -1, f(-1) = \frac{1}{3}:$$

$$673. f(x) = \sqrt{x} - \lfloor \sqrt{x} \rfloor:$$

$$674. f(x) = x^2 - \lfloor x^2 \rfloor:$$

$$675. f(x) = x[x]:$$

$$676. f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x):$$

$$677. y = \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil:$$

$$678. y = \operatorname{sgn}(x - \lfloor x \rfloor):$$

$$679. y = \lfloor x \rfloor \sin \pi x:$$

$$680. y = (-1)^{\lfloor x^2 \rfloor}:$$

$$681. y = x \ln x, \text{ երբ } x > 0, y(0) = 0: \quad 682. y = e^{-\frac{1}{|x|}}, \text{ երբ } x \neq 0, y(0) = 0:$$

683. Ընտրել  $a$  պարամետրի արժեքն այնպես, որ ֆունկցիան լինի անընդհատ.

$$\text{ա) } y = \begin{cases} x^2, & \text{երբ } x \leq 4, \\ 3x + a, & \text{երբ } x > 4; \end{cases}$$

$$\text{բ) } y = \begin{cases} \sin|x| - \ln|x|, & \text{երբ } |x| \geq 1, \\ ax^2 - 1, & \text{երբ } |x| < 1: \end{cases}$$

$$\text{գ) } y = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & \text{երբ } -1 < x < 0, \\ e^{ax+1}, & \text{երբ } x \geq 0; \end{cases}$$

$$\text{դ) } y = \begin{cases} (1+x)^{1+x}, & \text{երբ } x < 1, \\ a^2 x^2 - 2ax + 1, & \text{երբ } x \geq 1: \end{cases}$$

684. Համոզվել, որ  $a$  պարամետրի ցանկացած արժեքի համար

$$\text{ա) } y = \begin{cases} \ln|x|, & \text{երբ } x \neq 0, \\ a, & \text{երբ } x = 0; \end{cases}$$

$$\text{բ) } y = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{|x|}, & \text{երբ } x \neq 0, \\ a, & \text{երբ } x = 0 \end{cases}$$

ֆունկցիաները  $x_0 = 0$  կետում խզվող են: Պարզել խզման սեռը:

685. Ստուգել, որ  $\Gamma$ -իրիխլեի ֆունկցիան՝

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \text{երբ } x \in Q, \\ 0, & \text{երբ } x \in I, \end{cases}$$

ամենուրեք խզվող է: Պարզել խզումների սեռը:

**686.** Ապացուցել, որ եթե  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է  $x_0 \in X$  կետում, ապա  $|f(x)|$  ֆունկցիան այդ կետում նույնպես անընդհատ է: Բերել  $f(x)$  խրգվող ֆունկցիայի այնպիսի օրինակ, որ  $|f(x)|$  և  $f^2(x)$  ֆունկցիաները լինեն անընդհատ:

**687.** Դիցուք տրված է  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ

ա)  $|f(x)|$  և  $f^2(x)$  ֆունկցիաներից մեկի  $x_0 \in X$  կետում անընդհատությունից հետևում է մյուսի անընդհատությունը նույն կետում;

բ)  $f(x)$  և  $f^3(x)$  ֆունկցիաներից մեկի  $x_0 \in X$  կետում անընդհատությունից հետևում է մյուսի անընդհատությունը նույն կետում:

**688.** Դիցուք  $f : X \rightarrow R$  և  $g : X \rightarrow R$  ֆունկցիաներից մեկը  $x_0 \in X$  կետում անընդհատ է, իսկ մյուսը՝ խզվող: Հետազոտել  $f + g$ ,  $fg$  ֆունկցիաների անընդհատությունն այդ կետում:

**689.** Դիցուք  $f : X \rightarrow R$  և  $g : X \rightarrow R$  ֆունկցիաները  $x_0 \in X$  կետում խզվող են: Հետազոտել  $x_0$  կետում

ա)  $f + g$  ֆունկցիայի անընդհատությունը;

բ)  $fg$  ֆունկցիայի անընդհատությունը:

Բերել համապատասխան օրինակներ:

**690.** Տրված են  $f : X \rightarrow Y$  և  $g : Y \rightarrow R$  ֆունկցիաները: Դիցուք  $f$ -ը  $x_0 \in X$  կետում կամ  $g$ -ն  $y_0 = f(x_0)$  կետում խզվող է: Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ  $z = g(f(x))$  ( $x \in X$ ) բարդ ֆունկցիան  $x_0$  կետում խզվող է: Բերել համապատասխան օրինակներ:

**691.** Կառուցել  $f : R \rightarrow R$  ամենուրեք խզվող ֆունկցիայի օրինակ, այնպիսին, որ  $y = f(f(x))$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիան լինի ամենուրեք անընդհատ:

**692.** Կառուցել  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիա, որի անընդհատության կետերի բազմությունը կազմված է նախապես տրված  $a_1, a_2, \dots, a_n$  թվերից:

**693.** Կառուցել  $f : R \rightarrow R$  շնվազող ֆունկցիա, որի խզման կետերի բազմությունը կազմված է նախապես տրված  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$  թվերից:

Հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը (694-699).

**694.**  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$  ( $0 \leq x \leq 1$ ):

**695.**  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + x^n}$  ( $x \geq 0$ ):

**696.**  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}}$  :

**697.**  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2n} x$  :

$$698. y = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^{\alpha x})}{\ln(1 + e^{\alpha})} :$$

$$699. y = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} (1 + x)^{th\alpha x} :$$

700. Գտնել

$$y = \begin{cases} \sin \pi x, & \text{երբ } x \in Q, \\ 0, & \text{երբ } x \in I \end{cases}$$

Ֆունկցիայի անընդհատության կետերի բազմությունը:

701. Կառուցել  $[a; b]$  հատվածի վրա որոշված այնպիսի ֆունկցիայի օրինակ, որն ընդունում է տարբեր նշանի արժեքներ, սակայն ոչ մի կետում զրո չի դառնում:

702. Կառուցել  $X$  բազմություն և նրա վրա անընդհատ այնպիսի ֆունկցիայի օրինակ, որն ընդունում է տարբեր նշանի արժեքներ, բայց ոչ մի կետում զրո չի դառնում:

703. Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{երբ } x \neq 0, \\ 0, & \text{երբ } x = 0 \end{cases}$$

ֆունկցիան անընդհատ չէ, սակայն ցանկացած  $[a; b]$  հատվածում ընդունում է  $f(a)$ -ի և  $f(b)$ -ի միջև ընկած բոլոր արժեքները:

704. Ստուգել, որ հետևյալ հավասարումներից յուրաքանչյուրը նշված միջակայքում ունի առնվազն մեկ իրական արմատ.

$$\text{ա) } x^3 + 5x^2 - 7 = 0, x \in [1; 2]; \quad \text{բ) } x^4 + 6x^3 - 1 = 0, x \in [0; 1];$$

$$\text{գ) } 16x^2 - 2tgx - 7 = 0, x \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right); \quad \text{դ) } x^3 + \ln x - 20 = 0, x \in (0; e):$$

705. Ապացուցել, որ հետևյալ հավասարումներից յուրաքանչյուրն ունի առնվազն երկու իրական արմատ.

$$\text{ա) } 2x^2 + 9 \sin x - 1 = 0; \quad \text{բ) } sh^2 x + 3x^5 - 2 = 0;$$

$$\text{գ) } e^x - x - 2 = 0; \quad \text{դ) } x^3 \operatorname{sgn} x + x^2 + 3x - 1 = 0:$$

706. Ապացուցել, որ կենտ աստիճանի ցանկացած հանրահաշվական բազմանդամ ունի առնվազն մեկ իրական արմատ:

707. Պարզել, թե հետևյալ բազմություններից ո՞րը կարող է լինել  $[a; b]$  հատվածի վրա անընդհատ որևէ ֆունկցիայի արժեքների բազմություն.

$$\text{ա) } [-3; 1]; \quad \text{բ) } (-3; 1); \quad \text{գ) } (-3; 1];$$

$$\text{դ) } \{-3\}; \quad \text{ե) } \{-3; 1\}; \quad \text{զ) } [-3; 1] \cup [2; 3];$$

$$\text{է) } [-3; +\infty); \quad \text{ը) } Q; \quad \text{թ) } R:$$

708. Կառուցել  $(0;1)$  միջակայքի վրա այնպիսի անընդհատ ֆունկցիա, որը չունենա  $n$ 'չ ամենամեծ,  $n$ 'չ ամենափոքր արժեքներ:

709. Կառուցել  $[0;1]$  կիսաբաց միջակայքի վրա այնպիսի անընդհատ ֆունկցիա, որը չունենա  $n$ 'չ ամենամեծ,  $n$ 'չ ամենափոքր արժեքներ:

710. Ապացուցել, որ եթե ֆունկցիան որոշված է և անընդհատ  $[0;1] \cup [2;4]$  բազմության վրա, ապա այն ունի ամենամեծ և ամենափոքր արժեքներ:

711. Բերել  $[a;b]$  հատվածի վրա որոշված խզվող ֆունկցիայի օրինակ, որը ցանկացած  $(\alpha; \beta) \subset [a;b]$  միջակայքում ընդունում է մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:

712. Ապացուցել, որ եթե  $f: [a;b] \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և չնվազող, ապա  $f([a;b]) = [f(a); f(b)]$ :

713. Կառուցել  $[a;b]$  հատվածի վրա որոշված այնպիսի փոխմիարժեք և խզվող ֆունկցիա, որի համար  $f([a;b]) = [f(a); f(b)]$ :

\*\*\*

714. Ապացուցել, որ հավասարաչափ անընդհատ ֆունկցիան անընդհատ է:

715. Բերել  $(a;b)$  միջակայքի վրա անընդհատ ֆունկցիայի օրինակ, որը հավասարաչափ անընդհատ չէ:

716. Ապացուցել, որ եթե  $y = f(x)$  ֆունկցիան անընդհատ է  $(a;b)$  միջակայքի վրա, որտեղ  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ , և գոյություն ունեն  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  և  $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$

վերջավոր սահմանները, ապա  $f(x)$ -ը  $(a;b)$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ է:

717. Ապացուցել, որ  $f(x)$  ֆունկցիան  $X$  բազմության վրա հավասարաչափ անընդհատ չէ, այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունեն  $\varepsilon_0$  դրական թիվ և  $x'_n, x''_n \in X$  հաջորդականություններ այնպես, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$  և  $|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$ :

Հետազոտել ֆունկցիայի հավասարաչափ անընդհատությունը (718-729).

718.  $y = 2x - 3, x \in R$ :

719.  $y = \sqrt{x}, x \in R_+$ :

720.  $y = x^3, x \in R$ :

721.  $y = \sqrt[3]{x}, x \in R$ :

722.  $y = \frac{1}{x^2}$ , ա)  $x \in (0; +\infty)$ ; բ)  $x \in [1; +\infty)$ :

$$723. y = \frac{1+x}{1+x^2}, x \in R:$$

$$724. y = \frac{\sin x}{x}, x \in (0; +\infty):$$

$$725. y = \sin 2x, x \in R:$$

$$726. y = \arctg x, x \in R:$$

$$727. y = \operatorname{tg} x, \text{ ա) } x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]; \text{ բ) } x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right):$$

$$728. y = \ln x, \text{ ա) } x \in [1; +\infty); \text{ բ) } x \in (0; 1):$$

$$729. y = e^x, \text{ ա) } x \in R; \text{ բ) } x \in R_-:$$

## Բ

Հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը: Գրասակարգել խզումներն ըստ սեռի (730-733).

$$730. y = x \sin \frac{1}{x}, \text{ երբ } x \neq 0, y(0) = 0:$$

$$731. y = \arctg \frac{1}{x}, \text{ երբ } x \neq 0, y(0) = 0:$$

732.  $f(x) = (x-2)\chi(x)$ , որտեղ  $\chi(x)$ -ը Գիբիխեի ֆունկցիան է:

733.  $y = (x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)\chi(x)$ , որտեղ  $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ը իրարից տարբեր իրական թվեր են:

734. Ստուգել, որ Ռիմանի ֆունկցիան (տես վարժ. 575) անընդհատ է բոլոր իռացիոնալ կետերում և խզվող՝ ռացիոնալ կետերում:

735. Գիցուք  $Q_2 = \left\{ \frac{2p-1}{2^q} : p \in Z, q \in Z_+ \right\}$ -ը երկուական ռացիոնալ թվերի բազմությունն է: Ստուգել, որ

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^q}, & \text{երբ } x = \frac{2p-1}{2^q} \in Q_2, \\ 0, & \text{երբ } x \in R \setminus Q_2 \end{cases}$$

ֆունկցիան անընդհատ է  $R \setminus Q_2$  բազմության վրա և խզվող՝  $Q_2$ -ի վրա: Պարզել խզումների սեռը:

736. Հետազոտել հետևյալ ֆունկցիայի անընդհատությունը.

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{p}{q+1}, & \text{երբ } x = \frac{p}{q} \quad (\text{անկրճատելի կոտորակ է և } q \in N), \\ |x|, & \text{երբ } x \in I: \end{cases}$$



737. Տրված  $M \subset R$  բազմության համար

$$\chi_M(x) = \begin{cases} 1, & \text{երբ } x \in M, \\ 0, & \text{երբ } x \in M^c \end{cases}$$

ֆունկցիան կոչվում է  $M$  բազմության *բնութագրիչ ֆունկցիա* : Նկարագրել այդ ֆունկցիայի անընդհատության և խզման կետերի բազմությունները և դասակարգել խզումներն ըստ սեռի:

738. Հետազոտել  $\varphi \circ \psi$  և  $\psi \circ \varphi$  բարդ ֆունկցիաների անընդհատությունը, եթե

ա)  $\varphi(x) = \operatorname{sgn} x$ ,  $\psi(x) = 1 + x^2$ ;

բ)  $\varphi(x) = |2x - 1|$ ,  $\psi(x) = \chi(x)$  (Դիրիխլեի ֆունկցիան է);

գ)  $\varphi(x) = \psi(x) = \chi(x)$ :

$f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $x_0 \in X$  կետում կոչվում է

1) *ձախից անընդհատ*, եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (x_0 - \delta < x \leq x_0 \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon);$$

2) *աջից անընդհատ*, եթե

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (x_0 \leq x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon):$$

739. Դիցուք  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան բավարարում է հետևյալ պայմաններից որևէ մեկին.

ա)  $\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 \forall x \in X (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$ ;

բ)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \Rightarrow |x - x_0| < \delta)$ ;

գ)  $\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 \forall x \in X (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \Rightarrow |x - x_0| < \delta)$ :

Հետևում է արդյոք այդտեղից, որ  $f$ -ը  $x_0$  կետում անընդհատ է: Եթե ոչ, ապա ա), բ), գ) պայմաններից որը ֆունկցիայի ինչ հատկություն է բնորոշում:

Հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը, անընդհատությունը ձախից և աջից (740-744).

740.  $y = \frac{|\sin x|}{x}$ , երբ  $x \neq 0$ ,  $y(0) = -1$ :

741.  $y = \frac{e^x - 1}{|x|}$ , երբ  $x \neq 0$ ,  $y(0) = -1$ :

742.  $y = [\ln x]$ :

743.  $y = \ln x - [\ln x]$ :

744.  $y = \operatorname{sgn}(ctgx)$ , երբ  $x \neq \pi n$ ,  $y(\pi n) = (-1)^n$ ,  $n \in Z$ :

745. Դիցուք  $f: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան սահմանափակ է: Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } m(x) = \inf f([a; x]) \text{ և } M(x) = \sup f([a; x])$$

ֆունկցիաները  $(a; b]$ -ի յուրաքանչյուր կետում ձախից անընդհատ են;

բ) եթե  $f$  -ը անընդհատ է, ապա  $m(x)$  և  $M(x)$  ֆունկցիաները նույնպես անընդհատ են:

**746.** Ապացուցել, որ եթե  $f : X \rightarrow R$  և  $g : X \rightarrow R$  ֆունկցիաները  $x_0 \in X$  կետում անընդհատ են, ապա այդ կետում անընդհատ են նաև

$$\varphi(x) = \min \{f(x), g(x)\} \text{ և } \psi(x) = \max \{f(x), g(x)\}$$

ֆունկցիաները:

**747.** Դիցուք  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $X$  -ի վրա անընդհատ է և  $c > 0$ : Ապացուցել, որ

$$f_c(x) = \begin{cases} -c, & \text{եթե } f(x) < -c, \\ f(x), & \text{եթե } |f(x)| \leq c, \\ c, & \text{եթե } f(x) > c \end{cases}$$

ֆունկցիան  $X$  -ի վրա անընդհատ է:

**748.** Ապացուցել, որ  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է  $x_0 \in X$  կետում այն և միայն այն դեպքում, երբ  $X$  -ի կետերից կազմված ցանկացած  $x_n \rightarrow x_0$  հաջորդականության համար  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$  (անընդհատությունը ըստ Հայնեի):

**749.** Ապացուցել, որ եթե  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիան աճող է (նվազող է), ապա ցանկացած  $x_n$  հաջորդականության համար

$$f(x_n) \rightarrow f(x_0) \Rightarrow x_n \rightarrow x_0 :$$

**750.** Ստուգել, որ  $y = (1 + x^2) \operatorname{sgn} x$  ֆունկցիան հակադարձելի է և խզվող, սակայն հակադարձ ֆունկցիան անընդհատ է:

**751.** Ապացուցել, որ եթե  $f$  -ը  $(a; b)$  միջակայքի վրա մոնոտոն է և հակադարձելի, ապա  $f^{-1}$ -ն իր որոշման տիրություն ամենուրեք անընդհատ է: Ճշմարիտ է արդյոք պնդումը ցանկացած հակադարձելի, բայց ոչ մոնոտոն ֆունկցիայի համար:

**752.** Կառուցել  $f : X \rightarrow R$  փոխմիարժեք ֆունկցիա, որը  $x_0 \in X$  կետում անընդհատ է, բայց նրա հակադարձը  $y_0 = f(x_0)$  կետում խզվող է:

**753.** Ապացուցել, որ եթե  $f$  -ն անընդհատ է  $[a; b]$  հատվածի վրա և հակադարձելի, ապա այն  $[a; b]$ -ի վրա մոնոտոն է:

**754.** Ապացուցել, որ մոնոտոն ֆունկցիայի խզումները կարող են լինել միմիայն առաջին սեռի:

**755.** Կառուցել  $[0; 1]$  հատվածի վրա որոշված մոնոտոն և սահմանափակ ֆունկցիա, որի խզման կետերի բազմությունն անվերջ է:

756. Դիցուք  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և ունի  $T$  պարբերություն: Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $x_0 \in R$ , այնպիսին, որ  $f(x_0 + \frac{T}{2}) = f(x_0)$ :

757. Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և պարբերական, ապա այն սահմանափակ է:

758. Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և պարբերական, ապա կա՛մ այն ունի փոքրագույն դրական պարբերություն, կա՛մ հաստատուն է:

759.  $x_0 \in X$  կետը կոչվում է  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիայի *անշարժ կետ*, եթե  $f(x_0) = x_0$ :

Ապացուցել, որ եթե  $f: [0;1] \rightarrow [0;1]$  ֆունկցիան անընդհատ է, ապա այն ունի անշարժ կետ:

760. Կառուցել  $f: R \rightarrow R$  անընդհատ ֆունկցիա, որն անշարժ կետ չունի:

761. Կառուցել  $f: (0;1) \rightarrow (0;1)$  անընդհատ ֆունկցիա, որն անշարժ կետ չունի:

762. Ապացուցել, որ հատվածի վրա անընդհատ ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը հատված է:

763. Դիցուք  $f \in C[a;b]$ : Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ն  $[a;b]$  հատվածի ոչ մի կետում զրո չի դառնում, ապա գոյություն ունի  $\delta > 0$ , այնպիսին, որ  $[a;b]$ -ի բոլոր կետերում  $|f(x)| > \delta$ : Կմնա՞ արդյոք պնդումը ճշմարիտ, եթե  $[a;b]$  հատվածը փոխարինենք  $(a;b)$  միջակայքով:

\*\*\*

764. Ապացուցել Բորել-Լեբեգի լեմմայի հետևյալ ընդհանրացումը.  $[a;b] \cup [c;d]$  բազմության ցանկացած բաց ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

765. Բերել  $(a;b)$  միջակայքի այնպիսի բաց ծածկույթի օրինակ, որից հնարավոր չէ անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

766. Բերել  $[a;+\infty)$  միջակայքի այնպիսի բաց ծածկույթի օրինակ, որից հնարավոր չէ անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

767. Ապացուցել, որ եթե  $F$  բազմության ցանկացած բաց ծածկույթից հնարավոր է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ, ապա  $F$ -ը սահմանափակ է:

768. Փակ բազմությունների  $\alpha$  ընտանիքն անվանենք  $F$  բազմության փակ ծածկույթ, եթե  $F \subset \cup \alpha$ : Կառուցել  $[a;b]$  հատվածի փակ ծածկույթ, որից հնարավոր չէ անջատել վերջավոր ենթածածկույթ:

769. Դիցուք  $f$  ֆունկցիան որոշված է և հավասարաչափ անընդհատ  $(a;b)$  վերջավոր միջակայքի վրա: Ապացուցել, որ

ա)  $f$ -ը սահմանափակ է;

բ) գոյություն ունեն  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$  և  $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$  վերջավոր սահմանները;

գ) գոյություն ունի (ընդ որում միակը)  $f$ -ի  $F: [a; b] \rightarrow R$  անընդհատ շարունակություն:

**770.** Դիցուք  $f$  ֆունկցիան որոշված է և հավասարաչափ անընդհատ  $[a; +\infty)$  միջակայքի վրա: Ճշմարիտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.

ա)  $f$ -ը սահմանափակ է;

բ) գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  վերջավոր սահման:

Բերել համապատասխան օրինակներ:

**771.** Ապացուցել, որ եթե վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում անընդհատ և սահմանափակ ֆունկցիան մոնոտոն է, ապա այն այդ միջակայքի վրա հավասարաչափ անընդհատ է:

**772.** Ապացուցել, որ եթե ֆունկցիան անընդհատ է  $[a; b]$  և  $[c; d]$  հատվածներից յուրաքանչյուրի վրա, ապա այն  $[a; b] \cup [c; d]$  բազմության վրա հավասարաչափ անընդհատ է:

**773.** Ստուգել, որ  $y = \frac{\sin x}{|x|}$  ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է  $[-1; 0)$  և

$(0; 1]$  միջակայքերից յուրաքանչյուրի վրա, սակայն  $[-1; 0) \cup (0; 1]$  բազմության վրա հավասարաչափ անընդհատ չէ:

**774.** Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և պարբերական, ապա այն  $R$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ է:

**775.** Դիցուք  $f: X \rightarrow R$  և  $g: X \rightarrow R$  ֆունկցիաները հավասարաչափ անընդհատ են: Ապացուցել, որ

ա)  $f + g$  ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է;

բ) եթե  $X$ -ը վերջավոր միջակայք է, ապա  $f \cdot g$  ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է:

**776.** Ստուգել, որ  $y = x$  և  $y = \sin x$  ֆունկցիաները  $R$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ են, սակայն  $y = x \sin x$  ֆունկցիան  $R$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ չէ:

Հետազոտել ֆունկցիայի հավասարաչափ անընդհատությունը (777-786).

**777.**  $y = \sin x^2$ ,  $x \in (0; +\infty)$ :

**778.**  $y = \sin \frac{1}{x}$ ,  $x \in (0; 1)$ :

**779.**  $y = x \sin \frac{1}{x}$ ,  $x \in R \setminus \{0\}$ :

**780.**  $y = \frac{\sin x^2}{x}$ ,  $x \in (0; +\infty)$ :

781.  $y = x \arctg x^2, x \in R:$

782.  $y = x^2 \arctg x, x \in R:$

783.  $y = x + \sin x, x \in R:$

784.  $y = x^n e^{-|x|} (n \in N), x \in R:$

785.  $y = \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{|x|}}, x \in R \setminus \{0\}:$

786.  $y = \sqrt{x} \ln x, x \in (0; +\infty):$

787. Գիցուք  $P(x)$ -ը հանրահաշվական բազմանդամ է: Ապացուցել, որ  $y = P\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$  ֆունկցիան  $R \setminus \{0\}$  բազմության վրա հավասարաչափ անընդ-

հատ է:

788. Տրված  $f: X \rightarrow R$  սահմանափակ ֆունկցիայի և ցանկացած  $\delta > 0$  թվի համար

$$\omega_f(\delta) = \sup\{|f(x_1) - f(x_2)| : x_1, x_2 \in X \text{ և } |x_1 - x_2| < \delta\}$$

ֆունկցիան անվանում են  $f$  ֆունկցիայի *անընդհատության մոդուլ*:

Յույց տալ, որ

ա)  $\omega_f(\delta)$ -ն ոչ բացասական շնվազող ֆունկցիա է և, հետևաբար, գոյություն ունի  $\omega_f(+0) = \lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_f(\delta)$  վերջավոր սահմանը;

բ)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in X (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \omega_f(+0) + \varepsilon)$ ;

գ) եթե  $g: X \rightarrow R$ -ը մեկ այլ սահմանափակ ֆունկցիա է, ապա

$$\omega_{f+g}(\delta) \leq \omega_f(\delta) + \omega_g(\delta);$$

դ)  $f: X \rightarrow R$  սահմանափակ ֆունկցիան  $X$  բազմության վրա կլինի հավասարաչափ անընդհատ այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\omega_f(+0) = 0$ :

789. Հետևյալ ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրի անընդհատության մոդուլի համար ստանալ  $\omega_f(\delta) \leq C \cdot \delta^\alpha$  տեսքի գնահատական ( $C$ -ն և  $\alpha$ -ն հաստատուններ են).

ա)  $y = x^3, x \in [0; 1];$

բ)  $y = \sqrt{x}, x \in [0; 1];$

գ)  $y = \arctg x, x \in R;$

դ)  $y = \sin x + \cos x, x \in R;$

ե)  $y = \sin x^2, x \in R;$

զ)  $y = \sin \frac{1}{x}, x \in (0; +\infty):$

\*\*\*

$f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան կոչվում է *ադիտիվ ֆունկցիա*, եթե այն բավարարում է  $f(x+y) = f(x) + f(y)$  ֆունկցիոնալ հավասարմանը:

790. Ապացուցել, որ միակ անընդհատ և ադիտիվ ֆունկցիան  $f(x) = ax$  գծային և համասեռ ֆունկցիան է, որտեղ  $a = f(1)$ :

791. Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է և աղիտիվ, ապա այն գծային է և համասեռ:

792. Ապացուցել, որ եթե աղիտիվ ֆունկցիան  $x=0$  կետում սահմանափակ է, ապա այն գծային է և համասեռ:

793.  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան անվանենք  $x_0$  կետում Չեզարոյի իմաստով անընդհատ, եթե ցանկացած  $x_n$  հաջորդականության համար

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \rightarrow x_0 \Rightarrow \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n} \rightarrow f(x_0):$$

Ցույց տալ, որ

ա)  $f(x) = ax + b$  գծային ֆունկցիան Չեզարոյի իմաստով անընդհատ է

$R$ -ի վրա;

բ) եթե  $f$ -ը Չեզարոյի իմաստով անընդհատ է առնվազն մեկ կետում, ապա այն գծային է:

794. Դիցուք  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան բավարարում է  $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$  ֆունկցիոնալ հավասարմանը: Ապացուցել, որ

ա) եթե  $f$ -ը հաստատունից տարբեր է և անընդհատ, ապա այն ցուցչային ֆունկցիա է.  $f(x) = a^x$ , որտեղ  $a = f(1)$ ;

բ) եթե  $f$ -ը հաստատունից տարբեր է և  $(0; \varepsilon)$  միջակայքում սահմանափակ, ապա այն ցուցչային է:

795. Ապացուցել, որ միակ անընդհատ և նույնաբար զրոյից տարբեր  $f$  ֆունկցիան, որը ցանկացած  $x, y$  դրական թվերի համար բավարարում է  $f(xy) = f(x) + f(y)$  հավասարմանը և  $f(a) = 1$  պայմանին,  $f(x) = \log_a x$  ֆունկցիան է, որտեղ  $a$ -ն  $1$ -ից տարբեր դրական հաստատուն է:

796. Ապացուցել, որ նույնաբար զրոյից տարբեր միակ անընդհատ ֆունկցիան, որը բավարարում է  $f(xy) = f(x)f(y)$  ( $x, y > 0$ ) ֆունկցիոնալ հավասարմանը,  $f(x) = x^a$  աստիճանային ֆունկցիան է:

797. Գտնել բոլոր  $f(x)$  ( $x \in R$ ) անընդհատ ֆունկցիաները, որոնք բավարարում են  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$  ֆունկցիոնալ հավասարմանը:

798. Դիցուք տրված է  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան: Հետևյալ արտահայտությունները կոչվում են  $f$ -ի համապատասխանաբար *առաջին* և *երկրորդ կարգի վերջավոր աճեր*.

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x), \quad \Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x)):$$

Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ն անընդհատ է և ցանկացած  $x$ -ի ու  $\Delta x$ -ի համար  $\Delta^2 f(x) = 0$ , ապա  $f$ -ը գծային է.  $f(x) = ax + b$ :

## Գ.

**799.** Տրված է  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ  $f$ -ը  $x_0 \in X$  կետում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f(x_0)$  կետի ցանկացած  $V$  շրջակայքի համար գոյություն ունի  $x_0$  կետի  $U$  շրջակայք այնպիսին, որ  $f(U \cap X) \subset V$ :

**800.** Ապացուցել, որ  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան  $R$ -ի վրա անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ

ա) ցանկացած  $G \subset R$  բաց բազմության  $f^{-1}(G)$  նախապատկերը բաց բազմություն է;

բ) ցանկացած  $F$  փակ բազմության նախապատկերը փակ է:

**801.** Ապացուցել, որ  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $X$ -ի վրա անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ

ա) ցանկացած  $G$  բաց բազմության համար գոյություն ունի  $P$  բաց բազմություն, այնպիսին, որ  $f^{-1}(G) = P \cap X$ ;

բ) ցանկացած  $F$  փակ բազմության համար գոյություն ունի  $K$  փակ բազմություն, այնպիսին, որ  $f^{-1}(F) = K \cap X$ :

**802.** Ապացուցել, որ  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան կլիմի ամենուրեք անընդհատ այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած  $a \in R$  թվի համար

ա)  $\{x \in R: f(x) < a\}$  և  $\{x \in R: f(x) > a\}$  բազմությունները լինեն բաց;

բ)  $\{x \in R: f(x) \leq a\}$  և  $\{x \in R: f(x) \geq a\}$  բազմությունները լինեն փակ:

**803.** Տրված է  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ցանկացած  $a \in R$  թվի համար  $\{x \in X: f(x) = a\}$  բազմությունը կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի  $a$ -կետերի բազմություն: Ապացուցել, որ եթե  $X$  բազմությունը փակ է և  $f \in C(X)$ , ապա ցանկացած  $a \in R$  թվի համար  $f$ -ի  $a$ -կետերի բազմությունը փակ է:

**804.** Դիցուք՝  $f, g \in C[a; b]$ : Ապացուցել, որ  $\{x \in [a; b]: f(x) = g(x)\}$  բազմությունը փակ է:

**805.**  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան կոչվում է բաց արտապատկերում, եթե ցանկացած  $G$  բաց բազմության  $f(G)$  պատկերը բաց է: Ապացուցել, որ եթե  $f$  բաց արտապատկերումն անընդհատ է, ապա այն մոնոտոն է:

**806.** Տրված է  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ եթե ցանկացած  $\alpha < \beta$  թվերի համար  $(\alpha; \beta)$ -ի պատկերը  $f(\alpha)$ ,  $f(\beta)$  ծայրակետերով միջակայքն է, ապա  $f$ -ն անընդհատ է և աճող:

**807.** Դիցուք  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է: Ապացուցել, որ եթե ցանկացած  $G \subset R$  բաց բազմության  $f(G)$  պատկերը փակ է, ապա  $f$ -ը հաստատուն է:

**808.** Ապացուցել, որ եթե  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է, ապա ցանկացած  $X \subset R$  կապակցված բազմության  $f(X)$  պատկերը կապակցված է (տես 171 խնդիրը):

**809.** Դիցուք  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է: Ապացուցել, որ եթե ցանկացած  $A$  կապակցված բազմության  $f(A)$  պատկերը կապակցված է, ապա  $f$ -ն անընդհատ է:

**810.** Դիցուք  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և  $f(a) \cdot f(b) < 0$ : Ստուգել, որ  $\{x \in (a; b) : f(x) > 0\}$  և  $\{x \in (a; b) : f(x) < 0\}$  բազմությունները բաց են և ոչ դատարկ: Օգտվելով 171 խնդրում ձևակերպված պնդումից, ապացուցել միջանկյալ արժեքի վերաբերյալ Բոլցանո-Կոշիի թեորեմը:

**811.** Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան անընդհատ է  $(a; b)$  միջակայքում և  $x_1, x_2, \dots, x_n$  կետերը այդ միջակայքից են, ապա դրանց միջև կգտնվի մի  $\xi$  կետ, այնպիսին, որ

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]:$$

**812.** Դիցուք  $f$ -ը որոշված է և անընդհատ  $(a; b)$  ( $b \leq +\infty$ ) վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում: Ապացուցել, որ  $b$  կետում ֆունկցիայի *սահմանային արժեքների բազմությունը* փակ է և կապակցված: Այլ կերպ՝ եթե  $l = \lim_{x \rightarrow b} f(x)$  և

$L = \overline{\lim}_{x \rightarrow b} f(x)$ , ապա ցանկացած  $l \leq \lambda \leq L$  թվի համար գոյություն ունի  $x_n \rightarrow b$  ( $x_n \in (a; b), n = 1, 2, \dots$ ) հաջորդականություն, այնպիսին, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lambda$ :

**813.** Դիցուք  $y = f(x)$  ֆունկցիան  $(0; +\infty)$  միջակայքում անընդհատ է և սահմանափակ: Ապացուցել, որ ցանկացած  $T$  թվի համար գոյություն ունի  $x_n \rightarrow +\infty$  հաջորդականություն, այնպիսին, որ  $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0$ :

**814.** Դիցուք  $f : [0; 1] \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և  $f(0) = f(1)$ : Ապացուցել, որ



ա) ցանկացած  $n \in N$  բնական թվի համար գոյություն ունի  $\frac{1}{n}$  երկարության հորիզոնական հատված, որի ծայրակետերը գտնվում են  $f$  ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա (հատվածը ներգծված է գրաֆիկին);

բ) եթե  $l \neq 0$  թիվը  $\frac{1}{n}$  տեսքի չէ, ապա կարելի է կառուցել նշված պայմաններին բավարարող  $f$  ֆունկցիա, որի գրաֆիկին  $l$  երկարությամբ հորիզոնական հատված ներգծելն անհնար է:

**815.** Դիցուք  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան չնվազող է և  $Q \cap [f(a), f(b)] \subset f([a; b])$ : Ապացուցել, որ  $f$ -ն անընդհատ է:

**816.**  $A \subset [a; b]$  բազմությունը կոչվում է  $[a; b]$ -ում խիտ, եթե  $\bar{A} = [a; b]$ : Ապացուցել, որ եթե  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան չնվազող է և նրա արժեքների բազմությունը խիտ է  $[f(a), f(b)]$ -ում, ապա  $f$ -ն անընդհատ է:

**817.** Դիցուք  $f, g \in C[a; b]$ : Ապացուցել, որ եթե  $\{x \in [a; b] : f(x) = g(x)\}$  բազմությունը խիտ է  $[a; b]$ -ում, ապա  $f = g$ :

**818.** Դիցուք  $f_1 : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  ֆունկցիան անընդհատ է և  $f_1(0) = 0$ ,  $f_1(1) = 1$ : Նշանակենք  $f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x))$  ( $n \in N$ ): Ապացուցել հետևյալ պնդումները.

ա)  $\forall x \in [0; 1] (f_2(x) = x) \Rightarrow \forall x \in [0; 1] (f_1(x) = x)$ ;

բ)  $\exists n \in N \forall x \in [0; 1] (f_n(x) = x) \Rightarrow \forall x \in [0; 1] (f_1(x) = x)$ ;

գ)  $\forall x \in [0; 1] \exists n_x \in N (f_{n_x}(x) = x) \Rightarrow \forall x \in [0; 1] (f_1(x) = x)$ :

**819.** Դիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները  $[0; 1]$  հատվածն անընդհատ արտապատկերում են  $[0; 1]$ -ի սեռ, ընդ որում՝  $f \circ g = g \circ f$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $c \in [0; 1]$  կետ, որ  $f(c) = g(c)$ :

**820.** Դիցուք  $f : [0; 1] \rightarrow R$  ֆունկցիան բավարարում է  $f(0) > 0$  և  $f(1) < 0$  պայմաններին: Ապացուցել, որ եթե  $f = g + h$ , որտեղ  $g$ -ն անընդհատ է, իսկ  $h$ -ը՝ չնվազող, ապա գոյություն ունի  $x_0 \in (0; 1)$  կետ, այնպիսին, որ  $f(x_0) = 0$ :

**821.** Տրված է  $f : R_+ \rightarrow R_+$  անընդհատ ֆունկցիան: Դիցուք կամայական  $h > 0$  թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nh) = 0$  ( $n \in N$ ): Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ :

**822.** Դիցուք  $f : R_+ \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և կամայական  $x \in R_+$  թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$  ( $n \in N$ ): Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ :

Կառուցել համապատասխան օրինակ:

**823.** Ապացուցել, որ եթե  $f : R_+ \rightarrow R$  ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է և կամայական  $x \in R_+$  թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$  ( $n \in N$ ), ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  :

**824.** Ապացուցել, որ եթե  $f : R_+ \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և կամայական  $x \in R_+$  թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + \sqrt{n}) = 0$  ( $n \in N$ ), ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  :

**825.** Դիցուք  $f : R_+ \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է, իսկ դրական թվերից կազմված  $c_n$  աճող հաջորդականությունը բավարարում է  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = +\infty$  և  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (c_{n+1} - c_n) = 0$  պայմաններին: Ապացուցել, որ եթե ցանկացած  $x \in R_+$  թվի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + c_n) = 0$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  :

**826.** Տրված  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիայի և  $x_0 \in X$  կետի համար նշանակենք՝

$$\Omega_f(x_0; \delta) = \sup\{f(x_1) - f(x_2) : x_1, x_2 \in (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \cap X\} :$$

Ապացուցել, որ

ա)  $0 \leq \Omega_f(x_0; \delta) \leq +\infty$  և որպես  $\delta$  -ից կախված ֆունկցիա  $\Omega_f(x_0; \delta)$ -ն  $(0; +\infty)$  միջակայքի վրա չնվազող է;

բ) գոյություն ունի  $\Omega_f(x_0) = \lim_{\delta \rightarrow +0} \Omega_f(x_0; \delta)$  վերջավոր կամ անվերջ

սահմանը (կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի տատանում  $x_0$  կետում);

գ)  $f$ -ը  $x_0$  կետում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $\Omega_f(x_0) = 0$  (անընդհատությունը ըստ Բեռի);

դ) եթե  $X$ -ը փակ բազմություն է, ապա ցանկացած  $a \in (0; +\infty)$  թվի համար  $\{x \in X : \Omega_f(x) \geq a\}$  բազմությունը փակ է;

ե)  $\bigcup_{n \in N} \left\{ x \in X : \Omega_f(x) \geq \frac{1}{n} \right\}$ -ը  $f$  ֆունկցիայի խզման կետերի բազմու-

թյունն է:

**827.** Դիցուք  $F$ -ը կամայական փակ բազմություն է: Կառուցել  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիա, որի խզման կետերի բազմությունը  $F$ -ն է:

Ճշմարիտ է արդյոք, որ ցանկացած ֆունկցիայի խզման կետերի բազմությունը փակ է:

**828.** Տրված է  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ  $f$ -ն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած  $c > 0$  թվի համար

$$f_c(x) = \begin{cases} -c, & \text{երբ } f(x) < -c, \\ f(x), & \text{երբ } |f(x)| \leq c, \\ c, & \text{երբ } f(x) > c \end{cases}$$

Ֆունկցիան անընդհատ է:

**829.** Դիցուք  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է և

$$\forall x_1, x_2 \in R \left( |f(x_1) - f(x_2)| \geq |x_1 - x_2| \right):$$

Ապացուցել, որ  $f$  -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է  $R$ -ը  $R$ -ի վրա:

**830.**  $K$  բազմությունը կոչվում է *կոմպակտ*, եթե նրա ցանկացած բաց ծածկույթից կարելի է անջատել վերջավոր ենթածածկույթ: Ապացուցել, որ  $K \subset R$  բազմությունը կոմպակտ է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն փակ է և սահմանափակ:

**831.** Ապացուցել Վայերշտրասի թեորեմի հետևյալ ընդհանրացումը.

ա) կոմպակտի վրա անընդհատ ֆունկցիան սահմանափակ է;

բ) կոմպակտի վրա անընդհատ ֆունկցիան ունի մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ;

գ) կոմպակտի վրա անընդհատ ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը կոմպակտ է (կոմպակտի անընդհատ պատկերը կոմպակտ է):

**832.** Ապացուցել նախորդ խնդրի ա) պնդման հետևյալ ընդհանրացումը. եթե  $f: K \rightarrow R$  ֆունկցիան որոշված է  $K$  կոմպակտի վրա և յուրաքանչյուր կուտակման կետում ունի վերջավոր սահման, ապա  $f$  -ը սահմանափակ է:

**833.** Ապացուցել Կանտորի թեորեմի հետևյալ ընդհանրացումը. կոմպակտի վրա անընդհատ ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է:

**834.** Դիցուք  $X$  -ը թվային բազմություն է: Ապացուցել Վայերշտրասի թեորեմի հետևյալ շրջումը.

ա) եթե կամայական  $f: X \rightarrow R$  անընդհատ ֆունկցիա սահմանափակ է, ապա  $X$  -ը կոմպակտ է;

բ) եթե կամայական  $f: X \rightarrow R$  անընդհատ ֆունկցիա ունի մեծագույն արժեք, ապա  $X$  -ը կոմպակտ է:

**835.** Դիցուք  $X$  -ը թվային բազմություն է: Ճշմարիտ է արդյոք Կանտորի թեորեմի հետևյալ շրջումը. եթե կամայական  $f: X \rightarrow R$  անընդհատ ֆունկցիա հավասարաչափ անընդհատ է, ապա  $X$  -ը կոմպակտ է: Բերել համապատասխան օրինակ:

**836.** Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան հավասարաչափ անընդհատ է, ապա գոյություն ունեն  $a$  և  $b$  հաստատուններ, այնպիսիք, որ  $|f(x)| \leq a|x| + b$  :

Ճշմարիտ է արդյոք հակադարձ պնդումը: Կառուցել  $f: R \rightarrow R$  անընդհատ և աճող ֆունկցիա, որը բավարարում է  $|f(x)| \leq |x|$  անհավասարությանը, բայց  $R$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ չէ:

**837.** Ապացուցել, որ սահմանափակ բազմության վրա հավասարաչափ անընդհատ ֆունկցիան սահմանափակ է:

**838.** Դիցուք  $A$ -ն ոչ դատարկ և սահմանափակ թվային բազմություն է, իսկ  $\bar{A}$ -ն՝  $A$ -ի փակումը: Ապացուցել, որ  $f: A \rightarrow R$  ֆունկցիան ունի  $F: \bar{A} \rightarrow R$  անընդհատ շարունակություն այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f$ -ը  $A$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ է: Համոզվել, որ այդպիսի շարունակությունը միակն է:

## Գլուխ 5

### Ֆունկցիայի ածանցյալ

Տրված է  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան: Դիցուք  $x_0 \in X$  կետը  $X$ -ի կուտակման կետ է: Ցանկացած  $x \in X$  կետի համար  $\Delta x = x - x_0$  տարբերությունը կոչվում է *արգումենտի ած*, իսկ  $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$  տարբերությունը՝  $\Delta x$  աճին համապատասխանող *ֆունկցիայի ած*:

Սա հ ն ա ն ու մ: Եթե գոյություն ունի

$$f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

վերջավոր,  $+\infty$  կամ  $-\infty$  սահման, ապա այն կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի *ածանցյալ*  $x_0$  կետում:

Մի ա կ ող մ ա ն ի ա ծ ա ն ց յ ա լ ն ե ր: Եթե  $x_0$  կետում գոյություն ունի  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$  հարա-

բերության ձախակողմյան (աջակողմյան) սահմանը, ապա այն կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի *ձախակողմյան (աջակողմյան) ածանցյալ*  $x_0$  կետում և նշանակվում է  $f'_-(x_0)$  ( $f'_+(x_0)$ ):

Որպեսզի  $f$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում ունենա վերջավոր ածանցյալ, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այդ կետում գոյություն ունենան նրա վերջավոր միակողմանի ածանցյալները և լինեն իրար հավասար:

Ֆ ու ն կ ց ի ա յ ի դ ի ֆ ե ր ե ն ց ի ա լ: Եթե գոյություն ունի  $A$  հաստատուն, այնպիսին, որ  $f$  ֆունկցիայի աճը  $x_0$  կետում ներկայացվում է

$$\Delta f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

տեսքով, ապա  $f$ -ն անվանում են  $x_0$  կետում *դիֆերենցելի*:

Որպեսզի  $f$ -ն  $x_0$  կետում լինի դիֆերենցելի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն այդ կետում ունենա վերջավոր ածանցյալ: Ընդ որում՝  $A = f'(x_0)$ :

Դիցուք  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան  $x_0 \in X$  կետում դիֆերենցելի է.

$$\Delta f(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0):$$

Սա հ ն ա ն ու մ:  $\Delta x$ -ին  $f'(x_0) \cdot \Delta x$ -ը համապատասխանեցնող գծային ֆունկցիան կոչվում է  $x_0$  կետում  $f$  ֆունկցիայի *դիֆերենցիալ* և նշանակվում է  $df(x_0)$ .

$$(df(x_0))(\Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x:$$

Մասնավորապես,  $f(x) = x$  ֆունկցիայի համար,  $(dx)(\Delta x) = (x)' \cdot \Delta x = \Delta x$  և հետևաբար կարող ենք գրել.

$$df(x_0) = f'(x_0) dx,$$

որտեղ  $dx$ -ն  $y = x$  ֆունկցիայի դիֆերենցիալն է:

Ածանցանկան ներդրումը: Գիցուք  $c$ -ն հաստատուն է, իսկ  $u = u(x)$  և  $v = v(x)$  ֆունկցիաները  $x_0$  կետում դիֆերենցելի են: Այդ դեպքում

$$\begin{aligned} 1. (cu)' &= cu'; & 2. (u+v)' &= u' + v'; \\ 3. (uv)' &= u'v + uv'; & 4. \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0): \end{aligned}$$

Եթե  $x = \varphi(t)$ -ն դիֆերենցելի է  $t_0$  կետում, իսկ  $y = f(x)$  ֆունկցիան  $x_0 = \varphi(t_0)$  կետում, ապա  $f \circ \varphi$  բարդ ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $t_0$  կետում և

$$(f \circ \varphi)'(t_0) = f'(x_0) \cdot \varphi'(t_0):$$

Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցիալի համար ստացվում է հետևյալ բանաձևը՝

$$d(f \circ \varphi)(t_0) = f'(x_0) \cdot \varphi'(t_0) dt = f'(x_0) d\varphi = f'(x_0) dx,$$

որի կապակցությամբ ասում են, որ  $y = f(x)$  ֆունկցիայի դիֆերենցիալի տեսքը մնում է անփոփոխ, երբ  $x$ -ը դառնում է որևէ այլ փոփոխականից կախված ֆունկցիա:

Եթե  $f: X \rightarrow Y$  հակադարձելի ֆունկցիան  $x_0 \in X$  կետում դիֆերենցելի է,  $f'(x_0) \neq 0$  և  $f^{-1}$  հակադարձ ֆունկցիան  $y_0 = f(x_0)$  կետում անընդհատ է, ապա  $f^{-1}$ -ը  $y_0$ -ում դիֆերենցելի է և  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ :

Տարրական ֆունկցիաների ածանցյալները և դրանց սահմանները:

$$\begin{aligned} 1. c' &= 0: & 2. (x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}: \\ 3. (a^x)' &= a^x \ln a \quad \left((e^x)' = e^x\right): & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \quad \left((\ln x)' = \frac{1}{x}\right): \\ 5. (\sin x)' &= \cos x: & 6. (\cos x)' &= -\sin x: \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}: & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}: \\ 9. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}: & 10. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}: \\ 11. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}: & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}: \\ 13. (\operatorname{sh} x)' &= \operatorname{ch} x: & 14. (\operatorname{ch} x)' &= \operatorname{sh} x: \\ 15. (\operatorname{th} x)' &= \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}: & 16. (\operatorname{cth} x)' &= -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}: \end{aligned}$$

Ածանցյալի մեխանիկական իմաստը: Գիցուք կետը ուղղաձիգ շարժվում է  $S = S(t)$  օրենքով, որտեղ  $t$ -ն ժամանակն է, իսկ  $S(t)$ -ն ժամանակի  $t$  պահին կետի անցած ճանապարհը:  $S(t)$  ֆունկցիայի ածանցյալն ըստ  $t$ -ի՝  $S'(t)$ -ն, ժամանակի  $t$  պահին կետի շարժման արագությունն է: Եթե կետի ուղղաձիգ շարժման արագությունը փոփոխվում է  $V = V(t)$  օրենքով, ապա  $V'(t)$ -ն ժամանակի  $t$  պահին կետի շարժման արագացումն է:

Ածանցյալի երկրաչափական իմաստը: Եթե  $y = f(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում դիֆերենցելի է, ապա  $y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ -ն  $(x_0, f(x_0))$  կետում  $y = f(x)$  ֆունկցիայի գրաֆիկի շոշափողի հավասարումն է: Փաստորեն,  $f'(x_0)$ -ն շոշափողի անկյունային գործակիցն է:

Ուղիղը, որն անցնում է  $(x_0, f(x_0))$  կետով և ուղղահայաց է այդ կետում գրաֆիկի շոշափողին, կոչվում է նորմալ: Եթե  $f'(x_0) \neq 0$ , ապա նորմալի հավասարումն է՝  $y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ : Այն դեպքում, երբ շոշափողն ունի հորիզոնական դիրք՝  $f'(x_0) = 0$ , նորմալի հավասարումն ընդունում է  $x = x_0$  տեսքը:

Ասում են, որ  $y = f(x)$  և  $y = g(x)$  ֆունկցիաների գրաֆիկներն  $x_0$  արագիս ունեցող կետում հատվում են  $\varphi$  անկյան տակ, եթե  $f(x_0) = g(x_0)$  և այդ կետով գրաֆիկներին տարված շոշափողները կազմում են  $\varphi$  անկյուն:

$$tg\varphi = \left| \frac{f'(x_0) - g'(x_0)}{1 + f'(x_0)g'(x_0)} \right| \quad \left( 0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2} \right):$$

Այն դեպքում, երբ  $1 + f'(x_0)g'(x_0) = 0$ ՝  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ : Նկատենք, որ  $\varphi$ -ն  $x_0$  արագիս ունեցող կետով գրաֆիկներին տարված շոշափողների կազմած սուր անկյունն է:

Պարամետրական հավասարումն արված ֆունկցիայի անցյալը: Տրված են  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$  ( $t \in T$ ) պարամետրական հավասարումները: Եթե  $t$  պարամետրի փոփոխման այս կամ այն միջակայքում պարամետրական հավասարումներով որոշվող կորի աղեղն իրենից ներկայացնում է որոշակի  $y = f(x)$  ֆունկցիայի գրաֆիկ, ապա  $f$ -ն անվանում են պարամետրական հավասարումներով տրված ֆունկցիա: Դա մասնավորապես կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ  $x = \varphi(t)$  ֆունկցիան  $T_0 \subset T$  միջակայքում հակադարձելի է: Այդ դեպքում  $f(x) = \psi(\varphi^{-1}(x))$ :

Եթե  $\varphi$  և  $\psi$  ֆունկցիաները  $t = t_0$  կետում բավարարում են  $\varphi^{-1}$  հակադարձ ֆունկցիայի և  $\psi \circ \varphi^{-1}$  բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցելիության պայմաններին, ապա  $f$ -ն  $x_0 = \varphi(t_0)$  կետում դիֆերենցելի է, ընդ որում

$$f'(x_0) = y'_x(x_0) = \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)} \quad (t_0 = \varphi^{-1}(x_0)):$$

Բարձր կարգի անցյալն է: Եթե  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $x_0 \in X$  կետի որևէ շրջակայքի յուրաքանչյուր կետում, ապա այդ շրջակայքում որոշված  $f'(x)$  ֆունկցիայի ածանցյալն  $x_0$  կետում կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի երկրորդ կարգի ածանցյալ  $x_0$ -ում և նշանակվում  $f''(x_0)$  կամ  $\frac{d^2 f(x_0)}{dx^2}$ : Համանմանորեն սահմանվում են երրորդ՝  $f'''(x_0)$ , չորրորդ՝  $f^{(4)}(x_0)$  և ավելի բարձր կարգի ածանցյալները:

Եթե  $f$  ֆունկցիայի  $n$ -րդ կարգի ածանցյալը՝  $f^{(n)}(x)$ -ը, գոյություն ունի  $X$  բազմության յուրաքանչյուր կետում և ներկայացնում է անընդհատ ֆունկցիա, ապա գրում են՝  $f \in C^n(X)$ :

Տարրական ֆունկցիաների  $n$ -րդ կարգի ածանցյալներին այնուհետև.

$$1. (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}:$$

$$2. (a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a \quad \left( (e^x)^{(n)} = e^x \right):$$

$$3. (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}:$$

$$4. (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right):$$

$$5. (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right):$$

Լայպիցի բանաձևը: Եթե  $u$  և  $v$  ֆունկցիաներն  $n$  անգամ դիֆերենցելի են, ապա  $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$ , որտեղ  $u^{(0)} = u$  և  $v^{(0)} = v$ :

## Ա

**839.** Տրված է  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան: Դիցուք  $x$  փոփոխականի աճն  $x_0$  կետում  $\Delta x$ -ն է: Գտնել  $\Delta f(x_0)$  աճը, եթե

ա)  $f(x) = ax + b$ ;    բ)  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ;    գ)  $f(x) = a^x$ ;    դ)  $f(x) = tgx$ :

**840.** Ստուգել, որ

$$\text{ա) } \Delta[f(x) \pm g(x)] = \Delta f(x) \pm \Delta g(x);$$

$$\text{բ) } \Delta[f(x)g(x)] = g(x + \Delta x)\Delta f(x) + f(x)\Delta g(x);$$

$$\text{գ) } \Delta\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)\Delta f(x) - f(x)\Delta g(x)}{g(x)g(x + \Delta x)}:$$

**841.** Ելնելով ածանցյալի սահմանումից՝ գտնել հետևյալ ֆունկցիաների ածանցյալները.

$$\text{ա) } y = x^2; \quad \text{բ) } y = \frac{1}{x}; \quad \text{գ) } y = \sqrt{x}; \quad \text{դ) } y = \sqrt[3]{x};$$

$$\text{ե) } y = \sin x; \quad \text{զ) } y = \arccos x; \quad \text{է) } y = \operatorname{arctg} x:$$



842. Յույց տալ, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան ղիֆերենցելի է  $x=0$  կետում և  $f(0)=0$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0)$ :

843. Յույց տալ, որ եթե  $f(x)$  և  $g(x)$  ֆունկցիաները ղիֆերենցելի են  $x=0$  կետում,  $f(0)=g(0)=0$  և  $g'(0) \neq 0$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(0)}{g'(0)}$ :

844. Ելնելով ածանցյալի սահմանումից, հաշվել հետևյալ ֆունկցիաների ածանցյալները  $x=x_0$  կետում.

ա)  $y = x^2 + 3x - 1, x_0 = 1$ ;      բ)  $y = 2x^3 - 2x + 3, x_0 = 0$ ;

գ)  $y = x^2 \sin(x-2), x_0 = 2$ ;      դ)  $y = x + (x-1)\arcsin \sqrt{\frac{x}{x+1}}, x_0 = 1$ ;

ե)  $y = x|x|, x_0 = 0$ :

845. Ստուգել, որ հետևյալ ֆունկցիաները  $x=x_0$  կետում ղիֆերենցելի չեն.

ա)  $y = \sqrt{x}, x_0 = 0$ ;      բ)  $y = |x|, x_0 = 0$ ;

գ)  $y = \sqrt[3]{x-1}, x_0 = 1$ ;      դ)  $y = |\ln x|, x_0 = 1$ :

846. Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում ղիֆերենցելի է և  $n \in \mathbb{N}$ , ապա

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right] = f'(x_0):$$

Ճշմարիտ է արդյոք, որ եթե նշված սահմանը գոյություն ունի, ապա  $f$ -ն  $x_0$  կետում ղիֆերենցելի է:

Ցուցում: Դիտարկել Դիրիխլեի ֆունկցիան:

847. Դիցուք  $f(x)$  և  $g(x)$  ֆունկցիաները ղիֆերենցելի են: Ապացուցել, որ

$f(x) \pm g(x)$ ,  $f(x)g(x)$  և եթե  $g(x) \neq 0$ , ապա նաև  $\frac{f(x)}{g(x)}$  ֆունկցիաները նույն-պես ղիֆերենցելի են և ճշմարիտ են ածանցման հետևյալ կանոնները.

ա)  $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$ ;

բ)  $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ ;

գ)  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ :

Գտնել ֆունկցիայի ածանցյալը (848-954).

$$848. y = x^3(x^2 - 1):$$

$$849. y = (x^2 + 1)(3x - 2)(1 - x^3):$$

$$850. y = \frac{ax + b}{cx + d}:$$

$$851. y = \frac{1 + x - x^2}{1 - x + x^2}:$$

$$852. y = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}:$$

$$853. y = \frac{(2-x^2)(3-x^3)}{(1-x)^2}:$$

$$854. y = \sqrt[3]{x}:$$

$$855. y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}:$$

$$856. y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}:$$

$$857. y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}:$$

$$858. y = x\sqrt[4]{x}:$$

$$859. y = \frac{x + \sqrt{x}}{x - 2\sqrt[3]{x}}:$$

$$860. y = x \sin x - x^2 \cos x:$$

$$861. y = xtgx + ctgx:$$

$$862. y = \frac{\sin x}{1 + \cos x}:$$

$$863. y = \frac{x \sin x}{1 + tgx}:$$

$$864. y = e^x(x^2 + x - 1):$$

$$865. y = e^x \sin x + x \ln x:$$

$$866. y = 2^x ctgx:$$

$$867. y = (1 + 3x)^5:$$

$$868. y = \sqrt{2 - 3x}:$$

$$869. y = \sqrt[3]{1 - x^2}:$$

$$870. y = x\sqrt{1 + x^2}:$$

$$871. y = \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}}:$$

$$872. y = \left(\frac{1 + x^2}{1 - x}\right)^3:$$

$$873. y = \sqrt{x + \sqrt{x}}:$$

$$874. y = \sqrt{x + \sqrt{x + x\sqrt{x}}}::$$

$$875. y = \sqrt[3]{\frac{1 + x^3}{1 - x^3}}:$$

$$876. y = \sin^3 3x:$$

$$877. y = \cos(3x - 1)\sin 2x:$$

$$878. y = tg(x^2 + 1) + tg 2:$$

$$879. y = (2 - x^2)\cos x + 2x \sin x:$$

$$880. y = \sqrt{1 + \sin 2x}:$$

$$881. y = \sin^2 x^2:$$

$$882. y = \cos^2 \sqrt[3]{x^2 - 1}:$$

$$883. y = \frac{\sin^2 x}{\cos x}:$$

$$884. y = tg \frac{x}{2} - \frac{1}{3} tg^3 x :$$

$$886. y = \sqrt[3]{ctg^2 x} :$$

$$888. y = \sin\left(\cos \frac{1}{x}\right) :$$

$$890. y = \frac{\sin^2 3x}{1 + ctg 3x} :$$

$$892. y = 2^{tg \frac{1}{x}} :$$

$$894. y = x^2 e^{-2x^3} :$$

$$896. y = e^{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}} :$$

$$898. y = e^{-2x} chx^3 :$$

$$900. y = e^{e^x} :$$

$$902. y = \ln(3x+1) + \ln 3 :$$

$$904. y = \ln\left(\sqrt{x-1} + \sqrt{x^2+1}\right) :$$

$$906. y = \log_2^3(2x+3)^2 :$$

$$908. y = e^{\sqrt{\ln(x^2+x+1)}} :$$

$$910. y = \ln(\ln(\ln x)) :$$

$$912. y = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2-1}{x^2+1} :$$

$$914. y = \ln^2(1 + \cos x) :$$

$$916. y = \frac{1}{4x^4} \ln \frac{1}{x} - \frac{1}{16x^4} :$$

$$918. y = \arcsin \frac{x}{2} :$$

$$885. y = tg^5(x^2 + 2x - 1) :$$

$$887. y = x^2 \sin(\sin x) :$$

$$889. y = \sin(\cos^2(tg^3 x)) :$$

$$891. y = \sqrt{1 + tg(x^2 + x^{-2})} :$$

$$893. y = e^{-x^2} \cos \frac{x}{2} :$$

$$895. y = e^{\cos x} \sin x^2 :$$

$$897. y = sh(\cos x) :$$

$$899. y = \frac{chx^2}{sh^2 x^2} :$$

$$901. y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x} :$$

$$903. y = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) :$$

$$905. y = \lg^3 x^2 :$$

$$907. y = 10^{\frac{x}{\log_3 x}} :$$

$$909. y = \ln\left(\sqrt{2} \cos x + \sqrt{\cos 2x}\right) :$$

$$911. y = \ln(\ln^2(\ln^3 x)) :$$

$$913. y = \ln tg\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right) :$$

$$915. y = \ln \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} :$$

$$917. y = x(\sin \ln x - \cos \ln x) :$$

$$919. y = \arccos \frac{1}{x} :$$

$$920. y = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{x} :$$

$$922. y = \arccos(\cos^2 x) :$$

$$924. y = \arcsin \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$926. y = \frac{1}{2} \ln \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}} :$$

$$928. y = \frac{1+x^2 \operatorname{arctg} x^2}{\sqrt{1+x^4}} :$$

$$930. y = \frac{x}{\sqrt{e^{2x}-1}} - \operatorname{arctg} \sqrt{e^{2x}-1} :$$

$$932. y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x} :$$

$$934. y = \arccos(\sin x^2 - \cos x^2)$$

$$936. y = \arcsin(\sin x^2) + \arccos(\cos x^2) :$$

$$937. y = \arcsin \frac{\sin \alpha \sin x}{1 - \cos \alpha \cos x} :$$

$$939. y = x - \ln \sqrt{1+e^{2x}} + e^{-x} \operatorname{arctg} e^x :$$

$$941. y = \sqrt{\operatorname{arctg} \sqrt{\cos \ln^3 x}} :$$

$$943. y = \arccos \left( \frac{1}{chx} \right) :$$

$$945. y = x^{x^x} :$$

$$947. y = (chx)^{e^x} :$$

$$949. y = x^{x^a} + x^{a^x} + a^{x^x} :$$

$$951. y = (\sin x)^{\cos x} :$$

$$921. y = \arcsin \sqrt{1-x^2} :$$

$$923. y = \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x} :$$

$$925. y = \ln \left( \arccos \frac{1}{\sqrt{x}} \right) :$$

$$927. y = \left( \frac{1}{3} \right)^{\arcsin x^2} :$$

$$929. y = 3^{\operatorname{arctg}(2x+\pi)} :$$

$$931. y = \operatorname{arctg} e^{\frac{x}{2}} - \ln \sqrt{\frac{e^x}{e^x+1}} :$$

$$933. y = \operatorname{arctg} \frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}} :$$

$$935. y = \operatorname{arctg}(tg^2 x) :$$

$$938. y = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{|a|} :$$

$$940. y = \arccos(\sin^2 x^4 - \cos^2 x^4) :$$

$$942. y = \operatorname{arctg}(thx) :$$

$$944. y = x^x :$$

$$946. y = x^{e^x} :$$

$$948. y = x^{\frac{1}{x}} :$$

$$950. y = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} :$$

$$952. y = \left( \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^{x \arcsin 2x} :$$

$$953. y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x :$$

$$954. y = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^x :$$

$y = f(x)$  ֆունկցիայի սնդուլի լոգարիթմի ածանցյալը կոչվում է  $f(x)$  ֆունկցիայի լոգարիթմական ածանցյալ.  $\frac{d}{dx} \ln|f(x)| = \frac{f'(x)}{f(x)}$ : Գտնել ֆունկցիայի լոգարիթմական ածանցյալը (955-958).

$$955. y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} :$$

$$956. y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}} :$$

$$957. y = (x-a_1)^{\alpha_1} \cdots (x-a_n)^{\alpha_n} :$$

$$958. y = \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^n :$$

Գտնել ֆունկցիայի աջակողմյան և ձախակողմյան ածանցյալներն  $x_0$  կետում (959-965).

$$959. y = |x|, x_0 = 0 :$$

$$960. y = |x^2 - 5x + 6|, x_0 = 2 :$$

$$961. y = |2^x - 2|, x_0 = 1 :$$

$$962. y = x|\sin x|, x_0 = 1 :$$

$$963. y = \sqrt{1 - e^{-x^2}}, x_0 = 0 :$$

$$964. y = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 2-x, & x > 1, \end{cases} x_0 = 1 :$$

$$965. y = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x^2 + 2x, & x > 0, \end{cases} x_0 = 0 :$$

Գտնել ածանցյալը (966-971).

$$966. y = |(x-1)^2(x+1)^3| :$$

$$967. y = |\sin^3 x| :$$

$$968. y = \begin{cases} 1-x, & -\infty < x < 1, \\ (1-x)(2-x), & 1 \leq x \leq 2, \\ x-2, & 2 < x < +\infty: \end{cases}$$

$$969. y = \begin{cases} (x-a)^2(x-b)^2, & x \in [a; b], \\ 0, & x \notin [a; b]: \end{cases}$$

$$970. y = \begin{cases} x, & x < 0, \\ \ln(1+x), & x \geq 0: \end{cases}$$

$$971. y = \begin{cases} x^2 e^{-x^2}, & |x| \leq 1, \\ \frac{1}{e}, & |x| > 1: \end{cases}$$

972. Գտնել  $x = x(y)$  հակադարձ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը և ածանցյալը.

$$ա) y = x + \ln x;$$

$$բ) y = chx, x \in R_+;$$

$$գ) y = x + e^x;$$

$$դ) y = thx;$$

$$ե) y = shx:$$

Չ-տնել  $y'_x$ -ը (973-981).

973.  $x = \sqrt[3]{1-\sqrt{t}}$ ,  $y = \sqrt{1-\sqrt[3]{t}}$  :      974.  $x = \sqrt{t^2+t}$ ,  $y = \frac{t-1}{\sqrt{t^2+1}}$  :

975.  $x = \sin^2 t$ ,  $y = \cos^2 t$  :      976.  $x = a \cos t$ ,  $y = b \sin t$  :

977.  $x = a \operatorname{ch} t$ ,  $y = b \operatorname{sh} t$  :      978.  $x = a \cos^5 t$ ,  $y = a \sin^5 t$  :

979.  $x = e^t (\cos t + \sin t)$ ,  $y = e^t (\cos t - \sin t)$  :

980.  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  :

981.  $x = \arcsin \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ ,  $y = \arccos \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$  :

Չ-րել տրված կետում կորի շոշափողի և նորմալի հավասարումները (982-988).

982.  $y = (x+1)\sqrt[3]{3-x}$     ա)  $x = -1$ ;    բ)  $x = 2$  :

983.  $y = 2^{-x^2} \sin \pi x$     ա)  $x = 0$ ;    բ)  $x = 1$  :

984.  $y = x^2 \arccos \frac{x}{2}$     ա)  $x = 1$ ;    բ)  $x = \sqrt{3}$  :

985.  $y = x^3 \operatorname{ctg} \pi x$     ա)  $x = \frac{1}{4}$ ;    բ)  $x = \frac{1}{2}$  :

986.  $x = 2t - t^2$ ,  $y = 3t - t^3$     ա)  $t = 0$ ;    բ)  $t = 1$  :

987.  $x = e^{-t} \sin t$ ,  $y = e^{-t} \cos t$     ա)  $t = 0$ ;    բ)  $t = \frac{\pi}{4}$  :

988.  $x = \frac{2t+t^2}{1+t^3}$ ,  $y = \frac{2t-t^2}{1+t^3}$     ա)  $t = 0$ ;    բ)  $t = 1$  :

Չ-տնել կորերի հաստման կետում նրանց կազմած անկյունը (989-992).

989.  $y = x^2$ ,  $x = y^2$  :      990.  $y = \frac{x^2}{2}$ ,  $y = \frac{1}{1+x^2}$  :

991.  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$  :      992.  $y = x^2 \ln x$ ,  $y = 4 - 4x^2$  :

993.  $y = 2 + x + x^2$  կորի  $n^{\circ}$ ր կետերով նրան տարված շոշափողը կլինի գուրգահեռ    ա) արագիսների առանցքին;    բ)  $y = x$  ուղիղին:

994. Ապացուցել, որ  
 $y = a(x-x_1)(x-x_2)$  ( $a \neq 0$ ,  $x_1 \neq x_2$ )

պարաբոլն  $x$ -երի առանցքը երկու անգամ հատում է միևնույն սուր անկյան տակ:

**995.**  $a, b, c$  գործակիցների միջև ի՞նչ կապի դեպքում  $y = ax^2 + bx + c$  պարաբոլը կշոշափի  $x$ -երի առանցքը:

**996.** Ի՞նչ պայմանների դեպքում  $y = x^3 + px + q$  խորանարդ պարաբոլը կշոշափի  $x$ -երի առանցքը:

**997.**  $a$  պարամետրի ի՞նչ արժեքների դեպքում  $y = ax^2$  պարաբոլը կշոշափի  $y = \ln x$  կորը (հատման կետում կորերի կազմած անկյունը կլինի  $0$ ):

Գտնել ֆունկցիայի դիֆերենցիալը (998-1003).

**998.**  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  :

**999.**  $y = \cos x + \sqrt[3]{x}$  :

**1000.**  $y = \sqrt{\arccos x} + 2^{-x}$  :

**1001.**  $y = 3^{\sqrt{\arctg x^2}}$  :

**1002.**  $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$  :

**1003.**  $y = \frac{1}{\sin^3 2x}$  :

**1004.** Դիցուք  $u = u(x)$ ,  $v = v(x)$  և  $w = w(x)$  ֆունկցիաները դիֆերենցելի են: Գտնել  $y$  ֆունկցիայի դիֆերենցիալը, եթե

ա)  $y = uvw$ ; բ)  $y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}}$ ; գ)  $y = \arctg \frac{u}{v}$ ; դ)  $y = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$  :

**1005.** Գտնել ածանցյալը.

ա)  $\frac{d}{d(x^3)}(x^3 - 2x^6 - x^9)$ ; բ)  $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)}$ ; գ)  $\frac{d}{d(x^2)}\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ ; դ)  $\frac{d(\arcsin x)}{d(\arccos x)}$  :

Փոխարինելով ֆունկցիայի աճը դիֆերենցիալի արժեքով, գտնել արտահայտության մոտավոր արժեքը (1006-1010).

**1006.**  $\sqrt[3]{1,02}$  :

**1007.**  $\sin 29^\circ$  :

**1008.**  $\cos 151^\circ$  :

**1009.**  $\arctg 1,05$  :

**1010.**  $\sqrt[5]{\frac{2-x}{2+x}}$ , երբ  $x = 0,15$  :

**1011.** Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում դիֆերենցելի է, ապա այն այդ կետում անընդհատ է:

**1012.** Կարո՞ղ է արդյոք ֆունկցիան իր խզման կետում ունենալ անվերջ ածանցյալ:

**1013.** Կառուցել ֆունկցիա, որը լինի անընդհատ  $R$ -ի վրա, բայց

ա) դիֆերենցելի չլինի միայն մեկ կետում;

բ) դիֆերենցելի չլինի միայն երկու կետում:

1014. Կարո՞ղ է արդյոք  $f(x) + g(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում լինել դիֆերենցելի, եթե

- ա)  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $x_0$  կետում, իսկ  $g(x)$ -ը՝ ոչ;
- բ)  $f(x)$  և  $g(x)$  ֆունկցիաները դիֆերենցելի չեն  $x_0$  կետում:

1015. Կարո՞ղ է արդյոք  $f(x)g(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում լինել դիֆերենցելի, եթե

- ա)  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $x_0$  կետում, իսկ  $g(x)$ -ը՝ ոչ;
- բ)  $f(x)$  և  $g(x)$  ֆունկցիաները  $x_0$  կետում դիֆերենցելի չեն:

1016. Դիֆերենցելի՞ են արդյոք հետևյալ ֆունկցիաները.

- ա)  $y = x|x|$ ; բ)  $y = |x^3|$ ; գ)  $y = x|\sin x|$ :

1017. Ապացուցել, որ  $R$ -ի վրա դիֆերենցելի գույգ ֆունկցիայի ածանցյալը կենս ֆունկցիա է, իսկ կենս ֆունկցիայինը՝ գույգ:

1018. Ապացուցել, որ դիֆերենցելի և պարբերական ֆունկցիայի ածանցյալը պարբերական ֆունկցիա է:

1019. Մոնոտոն՞ է արդյոք մոնոտոն ֆունկցիայի ածանցյալը:

Ցուցում: Գիտարկել  $y = x + \sin x$  ֆունկցիան:

Գտնել  $y''$ -ը (1020-1026).

1020.  $y = x\sqrt{1+x^2}$  :

1021.  $y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$  :

1022.  $y = e^{-x^2}$  :

1023.  $y = tgx$  :

1024.  $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$  :

1025.  $y = (1+x^2) \arctg x$  :

1026.  $y = x^x$  :

1027. Ապացուցել հետևյալ բանաձևերը.

ա)  $(e^x)^{(n)} = e^x$  ;

բ)  $(a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a$  ;

գ)  $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$  ;

դ)  $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$  ;

ե)  $(x^m)^{(n)} = m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}$  ; գ)  $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$  :

1028. Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան ունի  $n$ -րդ կարգի ածանցյալ, ապա  $[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b)$ :



Գտնել  $y = y(x)$  ֆունկցիայի  $n$ -րդ կարգի ածանցյալը (1029-1048).

1029.  $y = \frac{1}{2x+3} :$

1030.  $y = \frac{ax+b}{cx+d} :$

1031.  $y = \frac{1}{x(1-x)} :$

1032.  $y = \frac{1}{x^2+3x+2} :$

1033.  $y = \frac{1}{\sqrt{1-2x}} :$

1034.  $y = \frac{x+2}{\sqrt[3]{1-x}} :$

1035.  $y = \sin^2 x :$

1036.  $y = \sin^3 x :$

1037.  $y = \cos^4 x :$

1038.  $y = \cos ax \cos bx :$

1039.  $y = \sin x \cos^2 2x :$

1040.  $y = x^2 \sin^2 x :$

1041.  $y = x^2 \ln(1+x) :$

1042.  $y = e^{3x} \sin 4x :$

1043.  $y = e^x \cos^2 x :$

1044.  $y = xshx :$

1045.  $y = chaxchbx :$

1046.  $y = x^n e^x :$

1047.  $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n :$

1048.  $y = \ln \frac{1-x}{1+x} :$

1049. Դիցուք՝  $f(x) = x^n, n \in N : \text{Ստուգել, որ } f(1) + \frac{f'(1)}{1!} + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!} = 2^n :$

1050. Դիցուք՝  $f(x) = x^{n-1} e^{\frac{1}{x}}, n \in N : \text{Ստուգել, որ } [f(x)]^{(n)} = (-1)^n \frac{f(x)}{x^{2n}} :$

Գտնել պարամետրական հավասարումներով տրված ֆունկցիայի նշված կարգի ածանցյալը (1051-1056).

1051.  $y''_{xx}$ -ը, եթե  $x = 2t - t^2, y = 3t - t^3 :$

1052.  $y''_{xx}$ -ը, եթե  $x = a \cos t, y = a \sin t :$

1053.  $y'''_{xxx}$ -ը, եթե  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) :$

1054.  $y'''_{xxx}$ -ը, եթե  $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t :$

1055.  $y''_{xx}$ -ը, եթե  $x = \ln\left(t + \sqrt{1+t^2}\right), y = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} :$

1056.  $y'''_{xxx}$ -ը, եթե  $x = t^2, y = \ln \sin t - t \cdot ctgt :$

Հավասարման մեջ կատարել փոփոխականի նշված փոխարինումը (1057-1059).

1057.  $x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0, x = e^t, y = y(t) :$

1058.  $u'' - q(t)u = 0$ ,  $u = \sqrt{t}v$ ,  $s = \frac{1}{2} \ln t$ ,  $v = v(s)$ :

1059.  $(x^2 + y^2)^3 y'' - 2(xy' - y)(yy' + x)^2 = 0$ ,  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ ,  $r = r(\varphi)$ :  
 Գիցուք  $u = \varphi(x)$  և  $v = \psi(x)$  ֆունկցիաները երկու անգամ դիֆերենցելի են: Գտնել  $y''$ -ը (1060-1065).

1060.  $y = u^2$ :                      1061.  $y = u \cdot v$ :                      1062.  $y = \frac{u}{v}$ :

1063.  $y = \ln \frac{u}{v}$ :                      1064.  $y = \sqrt{u^2 + v^2}$ :                      1065.  $y = u^v$ :

Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան երեք անգամ դիֆերենցելի է: Գտնել  $y''$ -ը և  $y'''$ -ը (1066-1068).

1066.  $y = f(x^2)$ :                      1067.  $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$ :                      1068.  $y = f(e^x)$ :

Հետևյալ խնդիրներում, եթե հատուկ նշված չէ, ճանապարհի չափման միավորն է՝ մետր, ժամանակինը՝ վայրկյան, արագությանը՝ մ/վրկ, արագացմանը՝ մ/վրկ<sup>2</sup>:

1069. Մարմինը շարժվում է ուղղաձիգ՝  $S = 1 + 2t + t^2$  օրենքով: Հաշվել նրա արագությունը ժամանակի  $t = 2$  պահին:

1070. Ուղղաձիգ շարժվող մարմնի արագությունը որոշվում է  $V = 3t + t^2 + t^3$  բանաձևով: Ինչպիսի՞ արագացում կունենա մարմինը շարժման սկզբից 4 վրկ անց:

1071. Ուղղաձիգ շարժվող մարմնի անցած  $S$  ճանապարհը որոշվում է  $S = \frac{1}{8}t^3 + 3t^2 + t$  բանաձևով: Գտնել շարժման արագությունը և արագացումը, երբ  $t = 10$ :

1072. Պտտվող թափանիվը, որին պահում է արգելակը,  $t$  վայրկյանի ընթացքում պտտվում է  $\varphi = \alpha + \beta t - \gamma t^2$  անկյունով ( $\alpha, \beta, \gamma$  -ն դրական հաստատուններ են): Գտնել անկյունային արագությունը և պտտման արագացումը: Անիվը ե՞րբ կանգ կառնի:

1073. 100 կգ զանգվածով մարմինը շարժվում է ուղղաձիգ՝  $S = 2t^2 + 3t + 1$  օրենքով: Գտնել մարմնի կինետիկ էներգիան  $\left(\frac{mv^2}{2}\right)$  շարժումն սկսելուց 5 վրկ անց:

1074. Ապացուցել, որ եթե մարմինը շարժվում է  $S = ae^t + be^{-t}$  օրենքով, ապա արագացման թվային արժեքը հավասար է ճանապարհի թվային արժեքին:

1075. Մարմնի շարժման օրենքը տրված է  $S = a + bt + ct^2$  բանաձևով: Ապացուցել, որ մարմնի վրա ազդող ուժը հաստատուն է:

1076. 1,7 մ հասակ ունեցող մարդը 5 կմ/ժ արագությամբ հեռանում է լույսի աղբյուրից, որը գտնվում է  $h > 1,7$  մ բարձրության վրա,։ Գտնել նրա գլխի ստվերի շարժման արագությունը:

1077. Մարմինը շարժվում է  $y = 2x + 3$  ուղիղով այնպես, որ նրա արագիար աճում է  $V_x = 3$  հաստատուն արագությամբ: Ի՞նչ արագությամբ է փոփոխվում օրդինատը:

1078. Մարմինը շարժվում է  $x^2 + y^2 = 100$  ( $x, y > 0$ ) շրջանագծի աղեղով այնպես, որ նրա օրդինատը աճում է  $V = 3$  հաստատուն արագությամբ: Ի՞նչ արագությամբ է փոփոխվում արագիարը: Գտնել արագիսի փոփոխման արագությունն այն պահին, երբ օրդինատը հավասար է 6-ի:

1079. Մարմինը շարժվում է  $12y = x^3$  կորով: Նրա  $n$ -ր կորորդինատն է փոփոխվում ավելի արագ:

## Բ

1080. Գտնել  $f'(0)$ -ն, եթե

$$\text{ա) } f(x) = |x|(1 - \cos x); \quad \text{բ) } f(x) = \prod_{k=0}^n (x+k); \quad \text{գ) } f(x) = \prod_{k=1}^n (x+k);$$

$$\text{դ) } f(x) = \begin{cases} \sin\left(x^4 \sin \frac{5}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases} \quad \text{ե) } f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{4}{3x} + \frac{x}{2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0: \end{cases}$$

Հաշվել ֆունկցիայի ածանցյալը (1081-1084).

1081.  $y = \arccos \frac{1}{|x|}$ :

1082.  $y = [x] \sin^2 \pi x$ :

1083.  $y = \begin{cases} (x+1) \operatorname{arctg}^2 \frac{1}{x+1} + 2x, & x \neq -1, \\ -2, & x = -1: \end{cases}$

$$1084. y = \begin{cases} \arctg x, & |x| \leq 1, \\ \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn} x + \frac{x-1}{2}, & |x| > 1: \end{cases}$$

1085. Ապացուցել արտադրյալի ածանցման հետևյալ կանոնը

$$(f_1(x) \cdots f_n(x))' = \sum_{k=1}^n f_1(x) \cdots f_k'(x) \cdots f_n(x):$$

1086.  $a$ -ի ի՞նչ արժեքների դեպքում  $f(x)$  ֆունկցիան կլինի անընդհատ  $x=0$  կետում: Ստուգել  $f'(0)$  ածանցյալի գոյությունը և հաշվել այն, եթե

$$\text{ա) } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0; \end{cases} \quad \text{բ) } f(x) = \begin{cases} \frac{(e^x - 1)^2}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0; \end{cases}$$

1087. Դիցուք  $g$  և  $\varphi$  ֆունկցիաները որոշված են համապատասխանաբար  $\{x: x \geq a\}$  և  $\{x: x \leq a\}$  բազմությունների վրա և

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x \geq a, \\ \varphi(x), & x < a: \end{cases}$$

Ապացուցել, որ  $f(x)$  ֆունկցիայի դիֆերենցելիության համար հետևյալ պայմանները անհրաժեշտ են և բավարար.

1)  $g(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $\{x: x > a\}$  բազմության վրա, իսկ  $\varphi(x)$ -ը՝  $\{x: x < a\}$  բազմության վրա;

$$2) g(a) = \varphi(a);$$

$$3) g_+'(a) = \varphi_-'(a):$$

$a$  և  $b$  թվերի ինչպիսի՞ ընտրության դեպքում ֆունկցիան կլինի դիֆերենցելի (1088-1091).

$$1088. f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ ax + b, & x > 1: \end{cases}$$

$$1089. f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x^2 + ax + b, & x > 0: \end{cases}$$

$$1090. f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & |x| < 1, \\ \frac{1}{|x|}, & |x| \geq 1: \end{cases}$$

$$1091. f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 0, \\ a \cos x + b \sin x, & x \geq 0: \end{cases}$$

Ընտրել  $a_1, b_1, a_2, b_2$  թվերն այնպես, որ  $f(x)$  ֆունկցիան լինի դիֆերենցելի (1092-1095).

$$1092. f(x) = \begin{cases} a_1x + b_1, & x > \frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right], \\ a_2x + b_2, & x < -\frac{\pi}{2}. \end{cases} \quad 1093. f(x) = \begin{cases} a_1x^2 + b_1, & x > 1, \\ x \sin \pi x, & x \in [-1; 1], \\ a_2x + b_2, & x < -1. \end{cases}$$

$$1094. f(x) = \begin{cases} a_1(x-2)^2 + b_1, & x > 1, \\ x^2 \arctg x, & x \in [-1; 1], \\ a_2(x+2)^2 + b_2, & x < -1. \end{cases}$$

$$1095. f(x) = \begin{cases} a_1x^2 + b_1, & x < \frac{1}{e}, \\ x^2 \ln x, & x \in \left[\frac{1}{e}; e\right], \\ a_2x + b_2, & x > e. \end{cases}$$

Գտնել ածանցյալը (1096-1099).

$$1096. f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n ch \frac{x}{2^k} : \quad 1097. f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n (1 + x^{2^k}), \quad |x| < 1:$$

Հետազոտել ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը (1098-1100).

$$1098. f(x) = |(x-1)(x-2)^2(x-3)^3| : \quad 1099. f(x) = |\cos x| :$$

$$1100. f(x) = |\pi^2 - x^2| \sin^2 x :$$

Գտնել  $x=0$  կետում  $f(x)$  ֆունկցիայի մինչև այն կարգի ածանցյալները, որոնք գոյություն ունեն (1101-1104).

$$1101. f(x) = \begin{cases} x^{10}, & \text{երբ } x \in Q, \\ -x^{10}, & \text{երբ } x \in I : \end{cases} \quad 1102. f(x) = |x|^3 :$$

$$1103. f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & x < 0, \\ \ln(1+x) - x, & x \geq 0 : \end{cases} \quad 1104. f(x) = \begin{cases} shx - x, & x < 0, \\ x - \sin x, & x \geq 0 : \end{cases}$$

1105. Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ֆունկցիան ունի խզվող ածանցյալ:

1106.  $\alpha$  -ի ի<sup>o</sup>նչ արժեքների դեպքում

$$f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Ֆունկցիան  $x=0$  կետում

ա) կլիմի անընդհատ;

բ) կլիմի դիֆերենցելի;

գ) կունենա անընդհատ ածանցյալ:

1107.  $\alpha$  -ի և  $\beta$  -ի ( $\beta > 0$ ) ի<sup>o</sup>նչ արժեքների դեպքում

$$f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{|x|^\beta}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Ֆունկցիան  $x=0$  կետի շրջակայքում ունի

ա) սահմանափակ ածանցյալ;

բ) անսահմանափակ ածանցյալ:

1108. Դիցուք  $f(x), g(x), h(x)$  ֆունկցիաները որոշված են  $x_0$  կետի շրջակայքում և բավարարում են հետևյալ պայմաններին.

1)  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ ,  $f(x_0) = h(x_0)$ ;

2)  $f(x)$  և  $h(x)$  ֆունկցիաները դիֆերենցելի են  $x_0$  կետում;

3)  $f'(x_0) = h'(x_0)$ :

Ապացուցել, որ  $g(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում դիֆերենցելի է և  $g'(x_0) = f'(x_0) = h'(x_0)$ :

1109. Դիցուք  $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx$  ֆունկցիան բավարարում է  $|f(x)| \leq |\sin x|$  անհավասարությանը: Ապացուցել, որ  $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1$ :

1110. Գտնել  $f'(a)$ -ն, եթե  $f(x) = (x-a)\varphi(x)$ , որտեղ  $\varphi(x)$  ֆունկցիան  $x=a$  կետում անընդհատ է:

1111. Ապացուցել, որ եթե  $\varphi(x)$  ֆունկցիան անընդհատ է  $x=a$  կետում և  $\varphi(a) \neq 0$ , ապա  $f(x) = |x-a|\varphi(x)$  ֆունկցիան  $a$  կետում դիֆերենցելի չէ: Հաշվել  $f'_-(a)$  և  $f'_+(a)$  միակողմանի ածանցյալները:

1112. Կառուցել անընդհատ ֆունկցիա, որը տրված  $a_1, a_2, \dots, a_n$  կետերում (և միայն այդտեղ) դիֆերենցելի չէ:

1113. Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{երբ } x - \text{ը ռացիոնալ է,} \\ 0, & \text{երբ } x - \text{ն իռացիոնալ է:} \end{cases}$$

Ֆունկցիան դիֆերենցելի է միայն  $x = 0$  կետում:

1114. Ապացուցել, որ

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Ֆունկցիան  $x = 0$  կետում դիֆերենցելի է, բայց այդ կետի ոչ մի շրջակայքում դիֆերենցելի չէ:

Գտնել  $f(x)$  ֆունկցիայի  $f'_-(x)$  և  $f'_+(x)$  միակողմանի ածանցյալները այն կետերում, որտեղ  $f$  -ը դիֆերենցելի չէ (1115-1125).

1115.  $f(x) = [x] \sin \pi x$ :

1116.  $f(x) = \sqrt{\sin x^2}$ :

1117.  $f(x) = \begin{cases} x \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0: \end{cases}$

1118.  $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0: \end{cases}$

1119.  $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x}, & x \neq 1, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 1: \end{cases}$

1120.  $f(x) = \begin{cases} (x-4) \operatorname{arctg} \frac{1}{x-4}, & x \neq 4, \\ 0, & x = 4: \end{cases}$

1121.  $f(x) = |\ln|x||$ :

1122.  $f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ :

1123.  $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2^{\frac{1}{x}} - 1}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0: \end{cases}$

1124.  $f(x) = \arcsin e^{-x^2}$ :

1125.  $f(x) = \arccos \sqrt{1-x^2}$ :

Գտնել  $f'_-(0)$ -ն և  $f'_+(0)$ -ն (1126-1129).

1126.  $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{1-x^2}}$ :

1127.  $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \sqrt[3]{x^4} \ln x, & x > 0: \end{cases}$

$$1128. f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 0, \\ \ln\left(1 + \sqrt[3]{x^7}\right), & x > 0: \end{cases} \quad 1129. f(x) = \begin{cases} 1 + e^{\frac{1}{x}}, & x < 0, \\ \sqrt{1 + \sqrt[3]{x^4}}, & x \geq 0: \end{cases}$$

1130. Ապացուցել, որ

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Ֆունկցիան անընդհատ է  $x = 0$  կետում, բայց այդ կետում չունի միակողմանի ածանցյալներ:

1131. Դիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $x = x_0$  կետում,  $f(x_0) \neq 0$ , իսկ  $g(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում անընդհատ է, բայց՝ ոչ դիֆերենցելի: Ապացուցել, որ  $f(x)g(x)$  ֆունկցիան այդ կետում դիֆերենցելի չէ:

1132. Ի՞նչ կարելի է ասել  $x = x_0$  կետում  $f(g(x))$  ֆունկցիայի դիֆերենցելի-ություն մասին, եթե

ա)  $f(y)$ -ն  $y_0 = g(x_0)$  կետում դիֆերենցելի է,  $g(x)$ -ն  $x = x_0$  կետում դիֆերենցելի չէ;

բ)  $f(y)$ -ն  $y_0$ -ում դիֆերենցելի չէ,  $g(x)$ -ն  $x_0$ -ում դիֆերենցելի է;

գ)  $f(y)$ -ն  $y_0$ -ում դիֆերենցելի չէ,  $g(x)$ -ն  $x_0$ -ում դիֆերենցելի չէ:

1133. Դիցուք  $f(y)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $y = 0$  կետում և

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0: \end{cases}$$

Ապացուցել, որ  $f(g(x))$  ֆունկցիան  $x = 0$  կետում ունի զրոյի հավասար ածանցյալ:

1134. Կարելի՞ է արդյոք ֆունկցիաների միջև անհավասարությունն ածանցել.  $f(x) \leq g(x)$  անհավասարությունից հետևում է արդյոք  $f'(x) \leq g'(x)$  անհավասարությունը:

Հաշվել գումարը (1135-1138).

1135. ա)  $1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$ ;

բ)  $1^2 + 2^2x + 3^2x^2 + \dots + n^2x^{n-1}$ ;

1136. ա)  $\sin x + 2 \sin 2x + \dots + n \sin nx$ ;

բ)  $\cos x + 2 \cos 2x + \dots + n \cos nx$ ;

1137. ա)  $\cos x + 3 \cos 3x + \dots + (2n-1) \cos(2n-1)x$ ;

բ)  $\sin x + 3 \sin 3x + \dots + (2n-1) \sin(2n-1)x$ ;



$$1138. \frac{1}{2}tg \frac{x}{2} + \frac{1}{4}tg \frac{x}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}tg \frac{x}{2^n} :$$

Ցուցում: Օգտվել  $\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \dots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}}$  նույնություներից:

Ապացուցել, որ տրված հավասարումից որոշվող  $y = y(x)$  ֆունկցիան միակն է և գտնել  $y'_x$ -ը (1139-1140).

$$1139. y^3 + 3y = x :$$

$$1140. y - \varepsilon \sin y = x \quad (0 \leq \varepsilon < 1) :$$

1141. Ստուգել, որ  $x = 2t + |t|$  և  $y = 5t^2 + 4t|t|$  հավասարումներից որոշվող  $y = y(x)$  ֆունկցիան պարամետրի  $t = 0$  արժեքի դեպքում դիֆերենցելի է, բայց նրա ածանցյալը չի կարելի հաշվել  $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$  բանաձևով:

1142. Ապացուցել  $n$ -րդ կարգի որոշիչի ածանցման հետևյալ կանոնը.

$$\begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \dots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_{k1}(x) & f_{k2}(x) & \dots & f_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \dots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}' = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \dots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \dots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \dots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

1143. Հաշվել  $F'(x)$ -ը, եթե

$$\text{ա) } F(x) = \begin{vmatrix} x-1 & 1 & 2 \\ -3 & x & 3 \\ -2 & -3 & x+1 \end{vmatrix}; \quad \text{բ) } F(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} :$$

1144. Գտնել  $y'_x$  ածանցյալը, եթե ա)  $r = a\varphi$ ; բ)  $r = a(1 + \cos \varphi)$ ; գ)  $r = ae^{m\varphi}$ , որտեղ  $r$ -ը և  $\varphi$ -ն  $(x, y)$  կետի բևեռային կոորդինատներն են:

1145. Պարզել, թե  $y = x + \sqrt[3]{\sin x}$  ֆունկցիայի գրաֆիկը  $n^\circ$ ր կետերում ունի ուղղահիգ շոշափող:

1146. Գտնել միևնույն շառավղով երկու շրջանագծերի կազմած անկյունը, եթե այդ շրջանագծերից մեկի կենտրոնը գտնվում է մյուս շրջանագծի վրա:

1147. Ցույց տալ, որ  $y = |x|^\alpha$  կորը շոշափում է

ա)  $y$ -ների առանցքը, երբ  $0 < \alpha < 1$ ;

բ)  $x$ -երի առանցքը, երբ  $1 < \alpha < \infty$ :

**1148.** Ապացուցել, որ  $r = ae^{m\varphi}$  ( $a$  -ն և  $m$  -ը հաստատուններ են) լոգարիթմական գալարագծի շոշափողի և շոշափման կետի շառավիղ-վեկտորի կազմած անկյունը հաստատուն է:

**1149.** Ապացուցել, որ հիպերբոլների հետևյալ ընտանիքները՝

$$x^2 - y^2 = a, \quad xy = b,$$

կազմում են օրթոգոնալ ցանց. այդ ընտանիքներից մեկին պատկանող ցանկացած հիպերբոլ մյուս ընտանիքի ցանկացած հիպերբոլի հետ հատվում է ուղիղ անկյան տակ:

**1150.** Ապացուցել, որ պարաբոլների

$$y^2 = 4a(a - x), \quad y^2 = 4b(b + x) \quad (a > 0, b > 0)$$

ընտանիքները կազմում են օրթոգոնալ ցանց:

**1151.** Գտնել ֆունկցիայի  $n$ -րդ կարգի ածանցյալը.

ա)  $y = \arcsin x$ ;                      բ)  $y = \arctg x$ :

**1152.** Գտնել  $f^{(n)}(a)$ -ն, եթե  $f(x) = (x - a)^n \varphi(x)$ , որտեղ  $\varphi(x)$  ֆունկցիան  $a$  կետի շրջակայքում ունի  $(n - 1)$ -րդ կարգի անընդհատ ածանցյալ:

**1153.** Ապացուցել, որ

$$f(x) = \begin{cases} x^{2n} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad n \in N,$$

ֆունկցիան  $x = 0$  կետում ունի մինչև  $n$ -րդ կարգի ածանցյալները և չունի  $(n + 1)$ -րդ կարգի ածանցյալ:

**1154.** Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ֆունկցիան անվերջ դիֆերենցելի է և հաշվել  $f^{(n)}(0)$ -ն ( $n \in N$ ):

**1155.** Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

ֆունկցիան անվերջ դիֆերենցելի է և հաշվել  $f^{(n)}(0)$ -ն,  $n \in N$ :

**1156.** Դիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան  $(-\infty; x_0]$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի է:  $a, b, c$  թվերի ի՞նչ արժեքների դեպքում

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \leq x_0, \\ a(x - x_0)^2 + b(x - x_0) + c, & x > x_0 \end{cases}$$

Ֆունկցիան կլինի երկու անգամ դիֆերենցելի:

1157. Ստուգել, որ  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \frac{d^2}{dx^2} \sqrt{ax^2 + bx + c} = 0$  ( $a > 0$ ):

1158. Ապացուցել հավասարությունը.

$$\text{ա) } \left[ e^{ax} \sin(bx + c) \right]^{(n)} = e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \sin(bx + c + n\varphi);$$

$$\text{բ) } \left[ e^{ax} \cos(bx + c) \right]^{(n)} = e^{ax} (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \cos(bx + c + n\varphi);$$

$$\text{որտեղ } \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}:$$

1159. Գիցուք  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ : Ապացուցել, որ  $f(x)$ -ը ռացիոնալ

ֆունկցիա չէ. չի կարող ներկայացվել որպես երկու հանրահաշվական բազմանդամների հարաբերություն:

## Գ

1160. Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; b)$  վերջավոր միջակայքում և  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ : Այստեղից հետևում է արդյոք, որ

$$\text{ա) } \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty; \quad \text{բ) } \overline{\lim}_{x \rightarrow a} |f'(x)| = +\infty:$$

1161. Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; b)$  վերջավոր միջակայքում և  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$ : Հետևում է արդյոք այդտեղից, որ  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ :

1162. Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; +\infty)$  բազմության վրա և գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  վերջավոր սահման: Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ  $f'(x)$ -ը  $+\infty$ -ում ունի վերջավոր կամ անվերջ սահման:

1163. Գիցուք  $f(x)$  սահմանափակ ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; +\infty)$  բազմության վրա և գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$  վերջավոր սահման: Հետևում է արդյոք այդտեղից, որ գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  վերջավոր կամ անվերջ սահման:

1164. Կառուցել ֆունկցիա, որը լինի դիֆերենցելի  $0; -1; 1$  կետերում և խզվող  $[-2; 2]$  հատվածի մնացած կետերում:

1165. Ապացուցել, որ

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Ֆունկցիան անվերջ դիֆերենցելի է:

Կառուցել անվերջ դիֆերենցելի ֆունկցիա, որը  $(0; \varepsilon)$  միջակայքում դրական է, իսկ այդ միջակայքից դուրս՝ զրո:

1166.  $f(x)$  ֆունկցիան կանվանենք *ողողկ*  $x_0$  կետում, եթե

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h} = 0 :$$

Ապացուցել, որ

ա) եթե  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $x_0$  կետում, ապա այդ կետում այն ողողկ է;

բ) կառուցել ֆունկցիա, որը տվյալ կետում ողողկ է, բայց դիֆերենցելի չէ:

1167. Գիցուք  $f$ -ը դիֆերենցելի է  $x_0$  կետում,  $\alpha_n < x_0 < \beta_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) և

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = x_0 : \text{ Ապացուցել, որ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0) :$$

1168. Գիցուք  $f$ -ը դիֆերենցելի է  $x_0$  կետում,  $x_0 < \alpha_n < \beta_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) և

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = x_0 :$$

ա) Կառուցել  $x_0$  կետում դիֆերենցելի ֆունկցիա, որի համար հնարավոր լինի խնդրի պայմաններին բավարարող  $\alpha_n$  և  $\beta_n$  հաջորդականություններն ընտրել այնպես, որ

$\frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n}$  հաջորդականությունը չզուգամիտի

$f'(x_0)$ -ի;

բ) ապացուցել, որ եթե  $\frac{\beta_n - x_0}{\beta_n - \alpha_n}$  հաջորդականությունը սահմանափակ է,

$$\text{ապա } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0) :$$

1169. Ապացուցել, որ եթե  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ֆունկցիան բավարարում է

$$f(x+y) = f(x)f(y), \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Ֆունկցիոնալ հավասարմանը և դիֆերենցիալի է  $x=0$  կետում, ապա այն անվերջ դիֆերենցիալի է ցանկացած  $x \in R$  կետում և  $f^{(n)}(x) = [f'(0)]^n f(x)$ :

1170. Տրված է  $y = (1+x)^x$  ֆունկցիան: Ապացուցել, որ

$$y^{(n+1)}(0) = (-1)^{n+1} n! \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{y^{(k)}(0)}{k!} \cdot \frac{n-k+1}{n-k} \quad (n \in N):$$

1171. Գիցուք՝  $a_1 < a_2 < \dots < a_{2n}$ : Ապացուցել, որ

$$\left[ \frac{(x-a_1)(x-a_3)\dots(x-a_{2n-1})}{(x-a_2)(x-a_4)\dots(x-a_{2n})} \right]' < 0:$$

1172. Գիցուք  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  թվերը ցանկացած բնական  $k$ -ի դեպքում բավարարում են  $\lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k > 0$  անհավասարությանը և

$$f(x) = \frac{1}{(1-\lambda_1 x)(1-\lambda_2 x)\dots(1-\lambda_n x)}:$$

Ապացուցել, որ  $f^{(k)}(0) > 0$  ( $k \in N$ ):

1173. Գիցուք  $n$ -րդ աստիճանի,  $n > 1$ ,  $P(x)$  հանրահաշվական բազմանդամի  $x_1, x_2, \dots, x_n$  արմատներն իրական են և միմյանցից տարբեր: Ապացուցել հավասարությունը.

$$\frac{1}{P'(x_1)} + \frac{1}{P'(x_2)} + \dots + \frac{1}{P'(x_n)} = 0:$$

1174. Ապացուցել հավասարությունը.

$$\left( x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right):$$

Ապացուցել բանաձևը (1175-1176).

1175.  $\frac{d^n}{dx^n} (x^n \ln x) = n! \left( \ln x + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)$  ( $x > 0$ ):

1176.  $\frac{d^{2n}}{dx^{2n}} \left( \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{(2n)!}{x^{2n+1}} [C_n(x) \sin x - S_n(x) \cos x]$ ,

որտեղ

$$C_n(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad S_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}:$$

1177. Ապացուցել, որ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^n}{dx^n} \left( \frac{\sin^2 x}{x^2} \right) = \begin{cases} 0, & \text{երբ } n = 2k - 1, \\ (-1)^k \frac{2^{2k}}{(k+1)(2k+1)}, & \text{երբ } n = 2k: \end{cases}$$

1178. Ստուգել, որ

$$T_m(x) = \frac{1}{2^{m-1}} \cos(m \cdot \arccos x) \quad (m \in \mathbb{N})$$

ֆունկցիաները հանրահաշվական բազմանդամներ են (Չերիշևի բազմանդամներ) և բավարարում են

$$(1-x^2)T_m''(x) - xT_m'(x) + m^2T_m(x) = 0 \quad \text{դիֆերենցիալ հավասարմանը:}$$

1179. Ապացուցել, որ Լեժանդրի բազմանդամները՝

$$P_m(x) = \frac{1}{2^m m!} \left[ (x^2 - 1)^m \right]^{(m)} \quad (m = 0, 1, 2, \dots),$$

բավարարում են

$$(1-x^2)P_m''(x) - 2xP_m'(x) + m(m+1)P_m(x) = 0 \quad \text{դիֆերենցիալ հավասարմանը:}$$

Ցուցում:  $(x^2 - 1)u' = 2mxu$  հավասարությունը, որտեղ  $u = (x^2 - 1)^m$ , ածանցել  $m+1$  անգամ:

1180. Լագերի բազմանդամները սահմանվում են հետևյալ բանաձևով.

$$L_m(x) = e^x (x^m e^{-x})^{(m)} \quad (m = 0, 1, 2, \dots):$$

Ապացուցել, որ  $L_m(x)$ -ը բավարարում է հետևյալ հավասարմանը.

$$xL_m''(x) + (1-x)L_m'(x) + mL_m(x) = 0:$$

Ցուցում: Օգտագործել  $xu' = (m-x)u$  հավասարությունը, որտեղ  $u = x^m e^{-x}$ :

1181. Դիցուք  $y = f(u)$  և  $u = \varphi(x)$  ֆունկցիաները  $n$  անգամ դիֆերենցելի են:

Ապացուցել, որ

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \sum_{k=1}^n A_k(x) f^{(k)}(u)$$

ներկայացման մեջ  $A_k(x)$  գործակիցներն  $f$  ֆունկցիայից կախված չեն:

1182. Ապացուցել  $y = f(x^2)$  ֆունկցիայի ածանցման հետևյալ կանոնը.

$$\begin{aligned} \frac{d^n y}{dx^n} &= (2x)^n f^{(n)}(x^2) + \frac{n(n-1)}{1!} (2x)^{n-2} f^{(n-1)}(x^2) + \\ &+ \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2!} (2x)^{n-4} f^{(n-2)}(x^2) + \dots: \end{aligned}$$

**1183.** Հերմիտի բազմանդամները սահմանվում են

$$H_m(x) = (-1)^m e^{x^2} \left( e^{-x^2} \right)^{(m)} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

բանաձևով: Ապացուցել, որ  $H_m(x)$ -ը բավարարում է

$$H_m''(x) - 2xH_m'(x) + 2mH_m(x) = 0 \quad \text{դիֆերենցիալ հավասարմանը:}$$

Ցուցում: Օգտագործել  $u' = -2xu$  հավասարությունը, որտեղ  $u = e^{-x^2}$

**1184.** Ապացուցել, որ եթե  $P_1(x)$  և  $P_2(x)$   $n$ -րդ աստիճանի բազմանդամների արժեքները  $n+1$  կետերում համընկնում են, ապա  $P_1(x) \equiv P_2(x)$ :

**1185.** Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան որոշված է  $R$ -ի վրա և  $x_0, x_1, \dots, x_n$ -ը իրարից տարբեր իրական թվեր են: Ապացուցել, որ Լագրանժի ինտերպոլացիոն բազմանդամը՝

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_i-x_0) \cdots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \cdots (x_i-x_n)} \text{-ը,}$$

միակ  $n$ -րդ աստիճանի բազմանդամն է, որը բավարարում է  $L_n(x_i) = f(x_i)$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ) պայմաններին:

**1186.** Գիցուք  $k_1, k_2, \dots, k_n$ -ը բնական թվեր են,  $x_1, x_2, \dots, x_n$ -ը՝ իրարից տարբեր իրական թվեր, իսկ  $P_1(x)$ -ը և  $P_2(x)$ -ը

$$P_1^{(i)}(x_j) = P_2^{(i)}(x_j) \quad (j = 1, 2, \dots, n, i = 0, \dots, k_j - 1)$$

պայմաններին բավարարող  $(k_1 + k_2 + \dots + k_n - 1)$ -րդ աստիճանի բազմանդամներ են: Ապացուցել, որ  $P_1(x) \equiv P_2(x)$ :

**1187.** Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան  $x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  կետերում  $k_i - 1$  անգամ դիֆերենցելի է: Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $m$ -րդ կարգի ( $m = k_1 + k_2 + \dots + k_n - 1$ ) միակ  $H_m(x)$  բազմանդամ, որը բավարարում է

$$H_m^{(i)}(x_j) = f^{(i)}(x_j) \quad (j = 1, 2, \dots, n, i = 0, 1, \dots, k_j - 1)$$

պայմաններին (Հերմիտի ինտերպոլացիոն բազմանդամ):

**1188.** Ընտրել ամենացածր աստիճանի  $P(x)$  բազմանդամն այնպես, որ  $f(x)$  ֆունկցիան լինի 1) անընդհատ; 2) դիֆերենցելի.

$$\text{ա) } f(x) = \begin{cases} \frac{5x}{4+x^2}, & |x| \geq 1, \\ P(x), & |x| < 1; \end{cases} \quad \text{բ) } f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-2x}, & |x| \leq 1, \\ P(x), & |x| > 1: \end{cases}$$

**1189.** Ապացուցել, որ Ռիմանի ֆունկցիան ոչ մի կետում դիֆերենցելի չէ:

1190. Ապացուցել, որ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q^3}, & \text{երբ } x = \frac{p}{q} \\ 0, & \text{երբ } x \in I \end{cases} \quad (\text{անկրճատելի կոտորակ է, } q \in \mathbb{N})$$

Ֆունկցիան ցանկացած  $k \in \mathbb{N} \setminus \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$  թվի համար  $x = \sqrt{k}$  կետում դիֆերենցելի է:

1191. Կառուցել  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  հակադարձելի ֆունկցիա, որն  $x_0$  կետում դիֆերենցելի է,  $f'(x_0) \neq 0$ , իսկ  $f^{-1}$  հակադարձ ֆունկցիան  $y_0 = f(x_0)$  կետում դիֆերենցելի չէ:



## Գլուխ 6

### Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները, ածանցյալի կիրառությունները

Ռ և լ ի թ ե ն ր ե մ ը : Եթե  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիան  $(a; b)$  միջակայքում դիֆերենցելի է և  $f(a) = f(b)$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որի համար  $f'(\xi) = 0$  :

Լ ա գ ր ա ն ժ ի թ ե ն ր ե մ ը (վերջավոր աճերի բանաձևը): Եթե  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիան  $(a; b)$  միջակայքում դիֆերենցելի է, ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որի համար

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a):$$

Կ ո շ ի ի թ ե ն ր ե մ ը : Եթե  $f, g \in C[a; b]$  ֆունկցիաները  $(a; b)$  միջակայքում դիֆերենցելի են և  $g'(x) \neq 0$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, այնպիսին, որ

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}:$$

Թ ե յ լ ո ր ի բ ա ն ն ա ձ ը : Դիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում  $n$  անգամ դիֆերենցելի

է:

$$P_n(x_0, x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

հանրահաշվական բազմանդամը կոչվում է  $x_0$  կետում  $f$  ֆունկցիայի  $n$ -րդ կարգի *Թեյլորի բազմանդամ*:

Թեյլորի բանաձևը հետևյալն է.

$$f(x) = P_n(x_0, x) + r_n(x_0, x),$$

որտեղ  $r_n(x_0, x) = f(x) - P_n(x_0, x)$ -ը կոչվում է մնացորդային անդամ:

Եթե  $f$ -ն  $x_0$  կետում  $n$  անգամ դիֆերենցելի է, ապա

$$r_n(x_0, x) = o\left((x - x_0)^n\right) \text{ (մնացորդային անդամի Պեանոյի ներկայացում):}$$

Եթե  $f \in C^n[x_0; x]$  և  $(x_0; x)$  միջակայքում  $f$ -ն ունի  $(n + 1)$ -րդ կարգի վերջավոր ածանցյալ, ապա գոյություն ունի  $\xi \in (x_0; x)$  կետ, այնպիսին, որ

$$1) r_n(x_0, x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n(x - x_0) \text{ (մնացորդային անդամի Կոշիի ներկայացում);}$$

$$2) r_n(x_0, x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1} \text{ (մնացորդային անդամի Լագրանժի ներկայացում):}$$

ցում):

Լ ու պիտանալի կանոնը: Դիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները որոշված են և դիֆերենցելի  $(a; b)$  վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում, ընդ որում՝  $g'(x) \neq 0$ : Եթե գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$  վերջավոր կամ անվերջ ( $-\infty$  կամ  $+\infty$ ) սահմանը և

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ կամ } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

ապա

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A:$$

Ֆունկցիա  $y = h(x)$  հետևազոտումը: Դիցուք  $f$  ֆունկցիան որոշված է  $(a; b)$  միջակայքում և դիֆերենցելի է:

Թե նրանում 1:  $f$ -ն  $(a; b)$ -ում կլինի հաստատուն այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f'(x) \equiv 0$ :

Թե նրանում 2:  $f$ -ն  $(a; b)$ -ում չնվազող է (չաճող է) այն և միայն այն դեպքում, երբ միջակայքի բոլոր կետերում  $f'(x) \geq 0$  ( $\leq 0$ ):

Ուռուցիկ ֆունկցիա  $y = h(x)$  և  $x$ : Դիցուք  $X$ -ը կապակցված բազմություն է:  $f: X \rightarrow R$  ֆունկցիան կոշտ է *ուռուցիկ*, եթե ցանկացած  $x_1, x_2 \in X$  կետերի և  $0 \leq \alpha \leq 1$  թվի համար տեղի ունի

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2)$$

անհավասարությունը: Եթե  $x_1 \neq x_2$ ,  $\alpha \neq 0$  և  $\alpha \neq 1$  դեպքում անհավասարությունը խիստ է, ապա  $f$ -ը կոշտ է *խիստ ուռուցիկ ֆունկցիա*:  $f$ -ը կանվանենք *գոգավոր ֆունկցիա*, եթե  $-f$ -ը ուռուցիկ է:

Թե նրանում 3: Որպեսզի  $(a; b)$  միջակայքում դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիան լինի ուռուցիկ (գոգավոր), անհրաժեշտ է և բավարար, որ  $f'(x)$  ֆունկցիան լինի չնվազող (չաճող):

Հետևանք:  $(a; b)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիան կլինի ուռուցիկ (գոգավոր) այն և միայն այն դեպքում, երբ միջակայքի յուրաքանչյուր կետում  $f''(x) \geq 0$  ( $\leq 0$ ):

Շրջան կետ: Դիցուք  $f$ -ն  $x_0$  կետի  $U_{x_0}$  շրջակայքում դիֆերենցելի է: Նշանակենք  $U_{x_0}^- = \{x \in U_{x_0} : x < x_0\}$ ,  $U_{x_0}^+ = \{x \in U_{x_0} : x > x_0\}$ : Եթե  $U_{x_0}^-$  և  $U_{x_0}^+$  կիսաշրջակայքերից մեկում ֆունկցիան խիստ ուռուցիկ է, իսկ մյուսում՝ խիստ գոգավոր, ապա  $x_0$ -ն անվանում են *շրջան կետ*:

Եթե  $x_0$  շրջան կետում  $f$ -ը երկու անգամ դիֆերենցելի է, ապա  $f''(x_0) = 0$ :

Էքստրեմումներ:  $x_0 \in (a; b)$  կետը կոշտ է  $f$  ֆունկցիայի *լոկալ մինիմումի* (մաքսիմումի) կետ, եթե գոյություն ունի  $x_0$ -ի  $U_{x_0}$  շրջակայք այնպիսին, որ

$$x \in U_{x_0} \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \text{ (} f(x) \leq f(x_0) \text{)}:$$

Եթե այս անհավասարությունը խիստ է, երբ  $x \neq x_0$ , ապա  $x_0$ -ն անվանում են խիստ մինիմումի (մաքսիմումի) կետ: Լոկալ մինիմումի և մաքսիմումի կետերը միասին կոշտում են ֆունկցիայի լոկալ էքստրեմումի կետեր:

Ֆ երմայիթ երեմը (էքստրեմումի անհրաժեշտ պայմանը): Եթե  $x_0$ -ն  $f$  ֆունկցիայի լոկալ էքստրեմումի կետ է և այդ կետում  $f$ -ը դիֆերենցելի է, ապա  $f'(x_0) = 0$ :

Թ երեմ 4 (էքստրեմումի բավարար պայմանը): Դիցուք  $f$ -ն  $x_0$  կետի  $U_{x_0}$  շրջակայքում անընդհատ է և ամենուրեք (բացի գուցե  $x_0$  կետից) ունի վերջավոր ածանցյալ:

Շճարիտ են հետևյալ պնդումները.

ա)  $\forall x \in U_{x_0}^- (f'(x) > 0)$  և  $\forall x \in U_{x_0}^+ (f'(x) < 0) \Rightarrow x_0$ -ն խիստ մաքսիմումի կետ է;

բ)  $\forall x \in U_{x_0}^- (f'(x) < 0)$  և  $\forall x \in U_{x_0}^+ (f'(x) > 0) \Rightarrow x_0$ -ն խիստ մինիմումի կետ է:

Թ երեմ 5: Դիցուք  $f$ -ն  $x_0$  կետի  $U_{x_0}$  շրջակայքում  $n$  անգամ դիֆերենցելի է, ընդ որում՝  $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$  և  $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ : Եթե  $n$ -ը կենտ է, ապա  $f$ -ն  $x_0$  կետում էքստրեմում չունի: Եթե  $n$ -ը գույգ է, ապա  $f^{(n)}(x_0) > 0$  դեպքում  $x_0$ -ն խիստ մինիմումի կետ է, իսկ  $f^{(n)}(x_0) < 0$  դեպքում խիստ մաքսիմումի:

Դիցուք՝  $f \in C[a; b]$ :  $x_0 \in [a; b]$  կետը կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի կրիտիկական կետ, եթե  $f'(x_0) = 0$  կամ  $f$ -ն  $x_0$  կետում դիֆերենցելի չէ: Ֆունկցիայի փոքրագույն (մեծագույն) արժեքը ստանալու համար բավական է հաշվել նրա արժեքները կրիտիկական կետերում, ինչպես նաև  $a$  և  $b$  կետերում, և ընտրել այդ արժեքներից փոքրագույնը (մեծագույնը):

Ա սիմպտոսիս :  $y = c_0 + c_1 x$  ուղիղը կոչվում է  $y = f(x)$  ֆունկցիայի *ասիմպտոտ* (թեք *ասիմպտոտ*)  $x$ -ը  $-\infty$ -ի ( $+\infty$ -ի) ձգտելիս, եթե  $f(x) = c_0 + c_1 x + o(1)$ , երբ  $x \rightarrow -\infty$  ( $+\infty$ ): Այս դեպքում

$$c_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty(+\infty)} \frac{f(x)}{x}, \quad c_0 = \lim_{x \rightarrow -\infty(+\infty)} [f(x) - c_1 x]:$$

Եթե  $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \infty$  ( $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty$ ), ապա  $x = a$  ուղիղն անվանում են  $f$  ֆունկցիայի *ուղղաձիգ ասիմպտոտ*:

## Ա

**1192.** Ստուգել, որ  $f(x) = |x|$  ֆունկցիան անընդհատ է  $[-1; 1]$  հատվածի վրա, ծայրակետերում ընդունում է հավասար արժեքներ, սակայն գոյություն չունի  $\xi \in [-1; 1]$  կետ, որի համար  $f'(\xi) = 0$ : Չի<sup>օ</sup> հակասում արդյոք այս փաստը Ռոլլի թեորեմին:

**1193.** Տրված է

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{երբ } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{երբ } x = 0 \end{cases}$$

ֆունկցիան: Համոզվել, որ այն  $[0;1]$  հատվածի ծայրակետերում ունի հավասար արժեքներ,  $(0;1)$  միջակայքում դիֆերենցելի է, սակայն  $f'(x)$ -ը ոչ մի կետում զրո չի դառնում: Պարզել Ռոլլի թեորեմի հետ թվացյալ հակասության պատճառը:

1194. Շնչարի՞տ է արդյոք վերջավոր աճերի բանաձևը  $y = \frac{1}{x}$  ( $x \in [a;b]$ )

ֆունկցիայի համար, եթե ա)  $a \cdot b > 0$ ; բ)  $a \cdot b < 0$ : Պատասխանը հիմնավորել:

1195. Ստուգել, որ  $[-1;1]$  միջակայքում  $f(x) = x^2$  և  $g(x) = x^3$  ֆունկցիաների համար Կոշիի թեորեմի կիրառումը բերում է սխալ արդյունքի և պարզել պատճառը:

1196. Գիցուք  $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ : Ապացուցել, որ  $f'(x) = 0$  հավասարման բոլոր արմատներն իրական են և ընկած են  $(0;4)$  միջակայքում:

1197. Ապացուցել, որ եթե  $P(x)$  հանրահաշվական բազմանդամի համար  $x_0$  -ն բազմապատիկ արմատ է, ապա այն արմատ է նաև  $P'(x)$ -ի համար:

1198. Ապացուցել, որ եթե  $P(x)$  հանրահաշվական բազմանդամի բոլոր արմատներն իրական են, ապա  $P'(x)$ -ի բոլոր արմատները նույնպես իրական են:

1199. Տրված է  $y = x^2$  ֆունկցիան: Համոզվել, որ ցանկացած  $[a;b]$  հատվածի համար վերջավոր աճերի բանաձևում առկա  $\xi$  կետը միակն է և գտնել այն:

1200. Գիցուք  $f(x)$  ֆունկցիայի համար վերջավոր աճերի բանաձևը ներկայացված է

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1)$$

տեսքով: Գտնել  $\theta$  -ի կախումն  $x$  -ից և  $\Delta x$  -ից, եթե

ա)  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ );      բ)  $f(x) = \frac{1}{x}$ ;      գ)  $f(x) = e^x$  :

1201.  $y = x^3$  ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա նշել այն  $(\xi; \xi^3)$  կետը, որով տարված շոշափողը զուգահեռ է  $A(-1;-1)$  և  $B(2;8)$  կետերը միացնող լարին:

1202. Կառուցել (գրաֆիկորեն)  $[a;b]$  հատվածի վրա որոշված ֆունկցիա, որի համար գոյություն ունի Լագրանժի վերջավոր աճերի բանաձևում առկա ա) ճիշտ երկու  $\xi$  կետ;    բ) ճիշտ երեք  $\xi$  կետ:

1203. Ապացուցել անհավասարությունը.

ա)  $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ ;      բ)  $|\arctg x - \arctg y| \leq |x - y|$ ;

գ)  $py^{p-1}(x - y) \leq x^p - y^p \leq px^{p-1}(x - y)$  ( $p > 1, 0 < y < x$ );

$$\eta) \frac{x-y}{x} < \ln \frac{x}{y} < \frac{x-y}{y} \quad (0 < y < x):$$

1204. Ապացուցել, որ եթե  $(a; b)$  միջակայքում  $f'(x) \equiv 0$ , ապա  $f$ -ն այդ միջակայքում հաստատուն է:

1205. Ապացուցել, որ եթե  $(a; b)$  միջակայքում  $f'(x) \equiv g'(x)$ , ապա այդ միջակայքում  $f$  և  $g$  ֆունկցիաների տարբերությունը հաստատուն է:

1206. Ապացուցել նույնությունը.

$$\text{ա) } \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}; \quad \text{բ) } \arctg x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} x \quad (x \neq 0);$$

$$\text{գ) } 2 \operatorname{arctg} x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi \operatorname{sgn} x \quad (|x| \geq 1);$$

$$\text{դ) } 3 \arccos x - \arccos(3x - 4x^3) = \pi \quad \left( |x| \leq \frac{1}{2} \right):$$

1207. Ստուգել, որ  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x}$  և  $g(x) = \operatorname{arctg} x$  ֆունկցիաները  $(-\infty; 1)$

և  $(1; +\infty)$  միջակայքերից յուրաքանչյուրի վրա տարբերվում են համապատասխան հաստատուն գումարելիով: Գտնել այդ հաստատունները:

1208. Ապացուցել, որ  $R$ -ի վրա դիֆերենցելի միակ ֆունկցիան, որի ածանցյալը հաստատուն է՝  $f'(x) \equiv k$ ,  $f(x) = kx + b$  զծային ֆունկցիան է:

1209. Ստուգել, որ  $x_0 = 0$  կետի շրջակայքում ցանկացած  $n$  բնական թվի համար ճշմարիտ են Թեյլորի հետևյալ վերլուծությունները.

$$\text{ա) } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n);$$

$$\text{բ) } \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n});$$

$$\text{գ) } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1});$$

$$\text{դ) } \operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n});$$

$$\text{ե) } \operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1});$$

$$\text{զ) } (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n);$$

$$t) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n):$$

1210. Ապացուցել, որ եթե  $f$  ֆունկցիան գույզ է, ապա  $x_0 = 0$  կետի շրջակայքում նրա Թեյլորի բազմանդամը բաղկացած է  $x$ -ի միայն գույզ աստիճաններից, իսկ եթե  $f$  -ը կենտ է՝  $x$ -ի միայն կենտ աստիճաններից:

1211. Վերլուծել  $P(x) = 1 - 3x + x^3$  բազմանդամն ըստ  $(x+1)$ -ի աստիճանների.  
 $P(x) = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2 + a_3(x+1)^3$ :

Գտնել  $f(x)$  ֆունկցիայի Թեյլորի բազմանդամն  $x_0$  կետի շրջակայքում (1212-1223).

1212.  $f(x) = e^{2x}, x_0 = 0$ :

1213.  $f(x) = xe^{-x}, x_0 = 0$ :

1214.  $f(x) = e^{x^2}, x_0 = 0$ :

1215.  $f(x) = 2\sin^2 2x, x_0 = 0$ :

1216.  $f(x) = \ln \sqrt{x}, x_0 = 1$ :

1217.  $f(x) = (1-x)\ln x, x_0 = 1$ :

1218.  $f(x) = x^3 \operatorname{ch} 3x, x_0 = 0$ :

1219.  $f(x) = e^x - shx, x_0 = 0$ :

1220.  $f(x) = \frac{1}{1-x^2}, x_0 = 0$ :

1221.  $f(x) = \ln(1-x^3), x_0 = 0$ :

1222.  $f(x) = a^x, x_0 = 0$ :

1223.  $f(x) = \log_a |x|, x_0 = 1$ :

1224. Հետևյալ մոտավոր բանաձևերում գնահատել բացարձակ սխալանքը.

ա)  $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, 0 \leq x \leq 1$ ;

բ)  $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, |x| \leq \frac{1}{2}$ ;      գ)  $\operatorname{tg} x \approx x + \frac{x^3}{3}, |x| \leq 0,1$ ;

դ)  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, 0 \leq x \leq 1$ :

1225. Պարզել, թե  $x$ -ի ինչ արժեքների դեպքում  $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$  բանաձևում բացարձակ սխալանքը չի գերազանցի 0,0001-ը:

1226. Ապացուցել հետևյալ բանաձևը.

$$\sqrt[n]{a^n + x} = a + \frac{x}{na^{n-1}} - r, a > 0, x > 0,$$

որտեղ  $0 < r < \frac{n-1}{2n^2} \cdot \frac{x^2}{a^{2n-1}}$ :

1227. Թեյլորի բանաձևի միջոցով գտնել հետևյալ արտահայտություններից յուրաքանչյուրի մոտավոր արժեքը: Միսալանքը գնահատելու համար օգտագործել մնացորդային անդամի Լագրանժի ներկայացումը.

ա)  $\sqrt[3]{30}$ ; բ)  $\sqrt[5]{250}$ ; գ)  $\sqrt[7]{e}$ ; դ)  $\sin 18^\circ$ ; ե)  $\ln 1,01$ ; զ)  $1,1^{1,2}$ :

1228. Հաշվել՝

ա)  $e$ -ն  $10^{-6}$ -ի ճշտությամբ; բ)  $sh 0,5$ -ը  $10^{-3}$ -ի ճշտությամբ;

գ)  $\sin 1^\circ$ -ը  $10^{-5}$ -ի ճշտությամբ; դ)  $\sqrt{5}$ -ը  $10^{-4}$ -ի ճշտությամբ:

Օգտվելով վարժություն 1209-ում ստացված վերլուծություններից՝ հաշվել սահմանը (1229-1240).

1229.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$  :

1230.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$  :

1231.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln^2(1+x) - sh^2 x}{1 - e^{-x^2}}$  :

1232.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x + 3^{-x} - 2}{x^2}$  :

1233.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5} \right)$  :

1234.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right)$  :

1235.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \left( x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$  :

1236.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \left( \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \right)$  :

1237.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$  :

1238.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} - ctgx \right)$  :

1239.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos x)^{\sin x}}{x^3}$  :

1240.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{sh(tgx) - x}{x^3}$  :

Գտնել ֆունկցիայի նշված  $n$ -րդ կարգի Թեյլորի բազմանդամն  $x_0 = 0$  կետի շրջակայքում (1241-1248).

1241.  $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ ,  $n = 4$  :

1242.  $f(x) = e^{2x-x^2}$ ,  $n = 5$  :

1243.  $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ ,  $n = 4$  :

1244.  $f(x) = \ln \cos x$ ,  $n = 6$  :

1245.  $f(x) = \sin \sin x$ ,  $n = 3$  :

1246.  $f(x) = tgx$ ,  $n = 5$  :

1247.  $f(x) = arctgx$ ,  $n = 10$  :

1248.  $f(x) = \arcsin x$ ,  $n = 10$  :

1249. Գտնել  $f(x) = \sqrt{x}$  ֆունկցիայի  $x_0 = 1$  կետում Թեյլորի վերլուծության առաջին երեք անդամները:

Օգտվելով Լոպիտալի կանոնից՝ հաշվել սահմանը (1250-1291).

$$1250. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}; \quad 1251. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x}{x^2}; \quad 1252. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{tgx - x}{x - \sin x};$$

$$1253. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{tg 4x - 4tgx}{\sin 4x - 4 \sin x}; \quad 1254. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctg x}{\ln(1+x^3)};$$

$$1255. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{tgx} - \frac{1}{e^x - 1} \right); \quad 1256. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( tgx + \frac{2}{2x - \pi} \right);$$

$$1257. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xctgx - 1}{x^2}; \quad 1258. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{tgx} - 1}{2 \sin^2 x - 1};$$

$$1259. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3}; \quad 1260. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{\sin x}}{x^3};$$

$$1261. \lim_{x \rightarrow 0} x^{-x}; \quad 1262. \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right);$$

$$1263. \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}; \quad 1264. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$1265. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x - 2 \arcsin x}{x^3}; \quad 1266. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sin x - \cos x}{x^4};$$

$$1267. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}; \quad 1268. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)};$$

$$1269. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (tgx)^{tg 2x}; \quad 1270. \lim_{x \rightarrow 0} (ctgx)^{\sin x};$$

$$1271. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x}; \quad 1272. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} \quad (\alpha > 0);$$

$$1273. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}}; \quad 1274. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( tg \frac{\pi x}{2x+1} \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$1275. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - ctg^2 x \right); \quad 1276. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{\ln x - x + 1};$$

$$1277. \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}; \quad 1278. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2};$$



$$1279. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} :$$

$$1280. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} x \right)^x :$$

$$1281. \lim_{x \rightarrow +\infty} (thx)^x :$$

$$1282. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} :$$

$$1283. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\operatorname{arctg} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} :$$

$$1284. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{x} \right) :$$

$$1285. \lim_{x \rightarrow +0} x \ln \ln \frac{1}{x} :$$

$$1286. \lim_{x \rightarrow +0} \sin x \cdot \ln x :$$

$$1287. \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} :$$

$$1288. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{chx} \right)^{\frac{1}{x^2}} :$$

$$1289. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln chx}{\sqrt[m]{chx} - \sqrt[n]{chx}} :$$

$$1290. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+e^x}{2} \right)^{cthx} :$$

$$1291. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{thx} - \frac{1}{tgx} \right) :$$

1292. Թույլատրելի՞ է արդյոք Լոպիտալի կանոնի կիրառումը հետևյալ օրինակներում.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} ;$$

$$բ) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \cos x} ;$$

$$գ) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{chx}{1 + e^{-x}} ;$$

$$դ) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x + \sin x} :$$

Օգտնել ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը (1293-1304).

$$1293. y = x^2 e^{-x} :$$

$$1294. y = \sqrt[3]{x^2} (x-2)^3 :$$

$$1295. y = \frac{3x-7}{(x^2-1)^2} :$$

$$1296. y = \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}} :$$

$$1297. y = \operatorname{arctg} x - \ln x :$$

$$1298. y = x - \sin 2x :$$

$$1299. y = x^x :$$

$$1300. y = x^{\frac{1}{x}} :$$

1301.  $y = x^2 - \ln x^2 :$

1302.  $y = \frac{\pi x}{2} - x \operatorname{arctg} x :$

1303.  $y = \frac{x^2}{2^x} :$

1304.  $y = \frac{\ln x}{x^2} :$

1305. Գիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները  $(a; b)$  միջակայքում դիֆերենցելի են:  
Ճշմարիտ է արդյոք, որ

ա)  $\forall x \in (a; b) (f(x) > g(x)) \Rightarrow \forall x \in (a; b) (f'(x) > g'(x));$

բ)  $\forall x \in (a; b) (f'(x) > g'(x)) \Rightarrow \forall x \in (a; b) (f(x) > g(x)):$

Բերել համապատասխան օրինակներ:

1306. Ապացուցել հետևյալ պնդումը. եթե  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները  $[x_0; b)$  ( $b \leq +\infty$ ) միջակայքում դիֆերենցելի են,  $f(x_0) = g(x_0)$  և ցանկացած  $x \in (x_0; b)$  կետում  $f'(x) > g'(x)$ , ապա  $(x_0; b)$  միջակայքում ամենուրեք  $f(x) > g(x)$ :

1307. Օգտվելով նախորդ խնդրից՝ ապացուցել անհավասարությունը.

ա)  $e^x > 1 + x \quad (x \neq 0);$

բ)  $e^x > e \cdot x \quad (x > 1);$

գ)  $\sin x < x \quad (x > 0);$

դ)  $\operatorname{tg} x > x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right);$

ե)  $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2} \quad (x > 0);$

զ)  $\ln x < x - 1 \quad (x > 1):$

Գտնել ֆունկցիայի ուռուցիկության և գոգավորության միջակայքերը:  
Նշել շրջման կետերը (1308-1316).

1308.  $y = 3x^2 - x^3 :$

1309.  $y = \frac{a^3}{a^2 + x^2} \quad (a > 0):$

1310.  $y = x + \sqrt[3]{x^5} :$

1311.  $y = \sqrt{1 + x^2} :$

1312.  $y = x + \sin x :$

1313.  $y = e^{-x^2} :$

1314.  $y = \ln(1 + x^2):$       1315.  $y = x \cdot \sin(\ln x):$       1316.  $y = x^x :$

1317. Ցույց տալ, որ  $x^\alpha$  ( $\alpha > 1$ ),  $e^x$ ,  $x \ln x$  ֆունկցիաները  $(0; +\infty)$  միջակայքում ուռուցիկ են, իսկ  $x^\alpha$  ( $0 < \alpha < 1$ ) և  $\ln x$  ֆունկցիաները՝ գոգավոր:

1318. Ապացուցել հետևյալ անհավասարությունները և մեկնաբանել դրանք երկրաչափորեն.

ա)  $\frac{1}{2}(x^\alpha + y^\alpha) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^\alpha \quad (x, y > 0, x \neq y, \alpha > 1);$

$$p) \frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}} \quad (x \neq y);$$

$$q) x \ln x + y \ln y > (x+y) \ln \frac{x+y}{2} \quad (x, y > 0, x \neq y):$$

Գտնել ֆունկցիայի կրիտիկական կետերը և պարզել՝ էքստրեմումի կետեր են դրանք, թե ոչ (1319-1328).

$$1319. y = 2 + x - x^2:$$

$$1320. y = (x-1)^3:$$

$$1321. y = (x-1)^4:$$

$$1322. y = x^m(1-x)^n \quad (m, n \in N):$$

$$1323. y = \cos x:$$

$$1324. y = chx:$$

$$1325. y = \cos x + chx:$$

$$1326. y = (x+1)^{10} \cdot e^{-x}:$$

$$1327. y = |x|:$$

$$1328. y = \sqrt[3]{x(1-x)^2}:$$

Գտնել ֆունկցիայի էքստրեմումի կետերը և հաշվել էքստրեմալ արժեքները (1329-1342).

$$1329. y = x^3 - 6x^2 + 9x - 4:$$

$$1330. y = 2x^2 - x^4:$$

$$1331. y = x(x-1)^2(x-2)^3:$$

$$1332. y = x + \frac{1}{x}:$$

$$1333. y = \frac{2x}{1+x^2}:$$

$$1334. y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 2x + 1}:$$

$$1335. y = x \cdot \sqrt[3]{x-1}:$$

$$1336. y = xe^{-x}:$$

$$1337. y = \frac{\ln^2 x}{x}:$$

$$1338. y = \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x:$$

$$1339. y = \frac{10}{1 + \sin^2 x}:$$

$$1340. y = \arctg x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2):$$

$$1341. y = e^x \sin x:$$

$$1342. y = (x^2 - 3)e^{-x}:$$

Գտնել նշված միջակայքում ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները (1343-1352).

$$1343. y = 2^x, \quad x \in [-1;5]:$$

$$1344. y = \log_2 x, \quad x \in [1;16]:$$

$$1345. y = x^4 + 32x + 1, \quad \text{ա) } x \in [-2;0]; \quad \text{բ) } x \in [-5;0]:$$

$$1346. y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1, \quad \text{ա) } x \in [4;5]; \quad \text{բ) } x \in [-1;4]:$$

$$1347. y = x^3 - 3x^2 + 6x - 2, \quad x \in [-4;3]:$$

$$1348. y = |x^2 - 3x + 2|, \quad x \in [-10;10]:$$

$$1349. y = \sqrt{2x - x^2} :$$

$$1350. y = \sqrt{x} \ln x, x \in (0;1]:$$

$$1351. y = \sqrt{5-4x}, x \in [-1;1]:$$

$$1352. y = |x| + \frac{x^3}{3}, x \in [-1;1]:$$

Գտնել ֆունկցիայի ճշգրիտ ստորին և վերին եզրերը (1353-1357).

$$1353. y = xe^{-2x}, x \in (0;+\infty):$$

$$1354. y = \frac{1+x^2}{1+x^4}, x \in (0;+\infty):$$

$$1355. y = e^{-x^2} \cos x^2, x \in R:$$

$$1356. y = \frac{(x+2)^2}{x^2+10}, x \in R:$$

$$1357. y = \frac{x^2 + x\sqrt{3+x^2}}{3+x^2}, \text{ ա) } x \in (0;+\infty); \text{ բ) } x \in R; \text{ գ) } x \in [-1;1]:$$

Գտնել  $x_n$  հաջորդականության մեծագույն անդամը և համոզվել, որ այդ անդամից սկսած  $x_n$ -ը նվազում է (1358-1359).

$$1358. x_n = \frac{n^{10}}{e^n} (n \in N):$$

$$1359. x_n = \sqrt[n]{n} (n \in N):$$

Գտնել ֆունկցիայի ասիմպտոտները (1360-1365).

$$1360. y = \frac{x^2+1}{2x-1} :$$

$$1361. y = \frac{1}{2} \sqrt{x^2-1} :$$

$$1362. y = x - \frac{1}{x} :$$

$$1363. y = 2x - xe^x :$$

$$1364. y = \frac{\sin x}{x^2} :$$

$$1365. y = x \arctg x :$$

\*\*\*

Կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը (1366-1409).

Ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելիս անհրաժեշտ է.

- 1) գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը;
- 2) պարզել ֆունկցիայի վարքը որոշման տիրույթի եզրային կետերում;
- 3) հետազոտել ֆունկցիան գույգության, կենտության և պարբերականության առումով;
- 4) հնարավորության դեպքում գտնել ֆունկցիայի գրոները;
- 5) գտնել էքստրեմումի կետերը և հաշվել ֆունկցիայի էքստրեմալ արժեքները (այդ թվում մեծագույն և փոքրագույն արժեքները, եթե դրանք գոյություն ունեն);
- 6) գտնել մոնոտոնության և ուռուցիկության միջակայքերը;
- 7) գտնել ասիմպտոտները, եթե այդպիսիք գոյություն ունեն:

$$1366. y = 3x - x^3 :$$

$$1367. y = 1 + x^2 - \frac{x^4}{2} :$$

$$1368. y = (x+1)(x-2)^2 :$$

$$1370. y = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^4 :$$

$$1372. y = \frac{x}{(1-x^2)^2} :$$

$$1374. y = (x-3)\sqrt{x} :$$

$$1376. y = \sqrt{8x^2 - x^4} :$$

$$1378. y = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 + 1} :$$

$$1380. y = \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2} :$$

$$1382. y = \frac{x^2\sqrt{x^2-1}}{2x^2-1} :$$

$$1384. y = \sqrt[3]{\frac{x^2}{x+1}} :$$

$$1386. y = \sin x + \cos^2 x :$$

$$1388. y = \sin x + \frac{1}{3}\sin 3x :$$

$$1390. y = \sin^4 x + \cos^4 x :$$

$$1392. y = \frac{\sin x}{\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)} :$$

$$1394. y = \frac{\sin x}{2 + \cos x} :$$

$$1396. y = e^{2x-x^2} :$$

$$1398. y = x + e^{-x} :$$

$$1400. y = e^{-2x} \sin^2 x :$$

$$1369. y = \frac{x^4}{(1+x)^3} :$$

$$1371. y = \frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2} :$$

$$1373. y = \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2} :$$

$$1375. y = \frac{1}{1+x} - \frac{10}{3x^2} - \frac{1}{x-1} :$$

$$1377. y = \sqrt{(x-1)(x-2)(x-3)} :$$

$$1379. y = \sqrt[3]{(x+2)^2} - \sqrt[3]{(x-2)^2} :$$

$$1381. y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2-1}} :$$

$$1383. y = \frac{|1+x|^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} :$$

$$1385. y = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x+1} :$$

$$1387. y = (7 + 2 \cos x) \sin x :$$

$$1389. y = \cos x - \frac{1}{2} \cos 2x :$$

$$1391. y = \sin x \cdot \sin 3x :$$

$$1393. y = \frac{\cos x}{\cos 2x} :$$

$$1395. y = 2x - \operatorname{tg} x :$$

$$1397. y = (1+x^2)e^{-x^2} :$$

$$1399. y = x^{\frac{2}{3}}e^{-x} :$$

$$1401. y = \frac{e^x}{1+x} :$$

$$1402. y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} :$$

$$1403. y = x^x :$$

$$1404. y = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) :$$

$$1405. y = x + \arctg x :$$

$$1406. y = \frac{x}{2} + \arctg x :$$

$$1407. y = \arcsin \frac{2x}{1+x^2} :$$

$$1408. y = \arccos \frac{1-x}{1-2x} :$$

$$1409. y = (1+x)^{\frac{1}{x}} :$$

\*\*\*

1410. Ապացուցել, որ եթե  $f(x) \geq 0$ , ապա  $F(x) = c \cdot f^2(x)$ ,  $c \neq 0$ , ֆունկցիայի էքստրեմումի կետերը համընկնում են  $f$  -ի էքստրեմումի կետերի հետ:

1411. Ապացուցել, որ եթե  $\varphi(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիան ածող է, ապա  $f$  և  $\varphi \circ f$  ֆունկցիաներն ունեն միևնույն էքստրեմումի կետերը:

1412. Տրված են  $m$  և  $n$  դրական թվերը: Գտնել  $x^m + y^n$  արտահայտության փոքրագույն արժեքը, եթե հայտնի է, որ  $x > 0, y > 0$  և  $xy = a$  ( $a = \text{const}$ ):

1413. Տրված են  $m$  և  $n$  դրական թվերը: Գտնել  $x^m y^n$  ( $x > 0, y > 0$ ) արտահայտության մեծագույն արժեքը, եթե  $x + y = a$ :

1414. Տրված  $S$  մակերեսն ունեցող ուղղանկյուններից գտնել այն, որի պարագիծը փոքրագույնն է:

1415. Տրված  $P$  պարագիծն ունեցող ուղղանկյուններից գտնել այն, որի մակերեսն ամենամեծն է:

1416. Ուղղանկյուն եռանկյան էջի և ներքնաձիգի գումարը հաստատուն է: Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն այդպիսի եռանկյան սուր անկյունները, որպեսզի այն ունենա մեծագույն մակերես:

1417. Գերանի լայնակի կտրվածքը  $d$  տրամագծով շրջան է: Գերանը տաշելով պատրաստում են չորսու, որի լայնակի կտրվածքը  $b$  հիմքով և  $h$  բարձրությամբ ուղղանկյուն է: Հայտնի է, որ չորսուի ամրությունը գնահատվում է  $bh^2$  մեծությամբ: Ի՞նչ համամասնությամբ պետք է տաշել գերանը, որպեսզի նրանից ստացվող չորսուն լինի մաքսիմալ ամրության:

1418.  $b$  հիմք և  $h$  բարձրություն ունեցող սուրանկյուն եռանկյանը ներգծված է ուղղանկյուն, որի երկու զագաթը գտնվում են եռանկյան հիմքի վրա: Գտնել այդպիսի ուղղանկյան առավելագույն մակերեսը:

1419. Տրված  $l$  ծնիչն ունեցող կոներինգ գտնել այն, որի ծավալը մեծագույնն է:

1420.  $R$  շառավղով գնդին ներգծել գլան, որի լրիվ մակերևույթի մակերեսը լինի մեծագույնը:

1421.  $R$  շառավղով գնդին ներգծել գլան, որի ծավալը մեծագույնն է:

1422. Գտնել  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $0 < b < a$ ) էլիպսի մեծազույն լարը, որի մի ծայրակետը  $B(0; -b)$ -ն է:

1423.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  էլիպսին տանել այնպիսի շոշափող, որ կոորդինատների առանցքների հետ նրա հատումից առաջացած եռանկյունն ունենա փոքրագույն մակերես:

1424.  $a$  երկարությամբ հատվածի  $A$  և  $B$  ծայրակետերում տեղավորված են համապատասխանաբար  $S_A$  և  $S_B$  մոմանոց լուսաղբյուրներ: Գտնել հատվածի առավել քիչ լուսավորված կետի հեռավորությունը  $A$ -ից, եթե հայտնի է, որ կետի լուսավորվածությունը հակադարձ համեմատական է լուսաղբյուրից ունեցած հեռավորության քառակուսուն:

1425. Կլոր սեղանի կենտրոնից  $h^\circ$ նչ բարձրության վրա պետք է կախել էլեկտրական լամպը, որպեսզի սեղանի եզրը լինի մաքսիմալ լուսավորված:

Հայտնի է, որ կետի լուսավորվածությունը արտահայտվում է  $I = k \frac{\sin \varphi}{r^2}$

բանաձևով, որտեղ  $\varphi$ -ն սեղանի հարթության վրա ճառագայթի անկման անկյունն է,  $r$ -ը լուսաղբյուրից եղած հեռավորությունը, իսկ  $k$ -ն՝ լուսաղբյուրի լույսի ուժը:

1426. Բեռը դրված է հորիզոնական հարթության վրա, որի հետ շփման գործակիցը  $k$  է: Հարթության նկատմամբ  $h^\circ$ նչ անկյան տակ պետք է քաշել այդ բեռը, որպեսզի այն տեղաշարժելու համար պահանջվի մինիմալ մեծության ուժ:

1427.  $a$  շառավիղ ունեցող կիսագնդաձև գավաթի մեջ դրված է  $l$  երկարության ձող ( $2a < l < 4a$ ): Գտնել ձողի հավասարակշռության դիրքը, եթե հայտնի է, որ այդ դիրքում նրա ծանրության կենտրոնը (ձողի միջնակետը) զբաղեցնում է հնարավոր ամենացածր մակարդակը:

## Բ

1428. Գիցուք՝  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; b)$  վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում և  $f(a+0) = f(b-0) = A$  ( $-\infty \leq A \leq +\infty$ ): Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, այնպիսին, որ  $f'(\xi) = 0$ :

1429. Գիցուք  $f \in C^{n-1}[x_0; x_n], (x_0; x_n)$  միջակայքի բոլոր կետերում  $f$ -ն ունի  $n$ -րդ կարգի վերջավոր ածանցյալ և բացի այդ՝  $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n)$

$(x_0 < x_1 < \dots < x_n)$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\xi \in (x_0; x_n)$  կետ, որի համար  $f^{(n)}(\xi) = 0$ :

**1430.** Դիցուք՝  $f \in C^{p+q}[a; b]$  և  $(a; b)$  միջակայքում  $f$ -ն ունի  $(p+q+1)$ -րդ կարգի վերջավոր ածանցյալ: Ապացուցել, որ եթե

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(p)}(a) = 0,$$

$$f(b) = f'(b) = \dots = f^{(q)}(b) = 0,$$

ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որի համար  $f^{(p+q+1)}(\xi) = 0$ :

**1431.** Ապացուցել, որ Լեժանդրի բազմանդամի՝

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[ (x^2 - 1)^n \right] \text{-ի,}$$

բոլոր արմատներն իրական են և ընկած են  $(-1; 1)$  միջակայքում:

**1432.** Ապացուցել, որ Լագերի բազմանդամի՝

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \text{-ի,}$$

բոլոր արմատները դրական են:

**1433.** Ապացուցել, որ Հերմիտի բազմանդամի՝

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}) \text{-ի,}$$

բոլոր արմատներն իրական են:

**1434.** Ապացուցել, որ եթե  $P(x)$ -ը  $(n-1)$ -րդ աստիճանի հանրահաշվական բազմանդամ է, ապա  $P^{(n)}(x) \equiv 0$ :

**1435.** Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան  $R$ -ի վրա  $n$  անգամ դիֆերենցելի է և  $f^{(n)}(x) \equiv 0$ , ապա  $f$ -ը ոչ ավելի, քան  $(n-1)$ -րդ աստիճանի հանրահաշվական բազմանդամ է:

**1436.** Դիցուք՝  $f$ -ը  $R$ -ի վրա դիֆերենցելի է և ցանկացած  $x$ -ի ու  $h$ -ի համար

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x):$$

Ապացուցել, որ  $f$ -ը գծային է.  $f(x) = ax + b$ :

**1437.** Դիցուք  $f$ -ը  $R$ -ի վրա երկու անգամ դիֆերենցելի է և ցանկացած  $x$ -ի ու  $h$ -ի համար

$$f(x+h) - f(x) = hf' \left( x + \frac{h}{2} \right):$$

Ապացուցել, որ  $f$ -ը բառակուսային ֆունկցիա է.  $f(x) = ax^2 + bx + c$ :



1438. Համաձայն վերջավոր աճերի բանաձևի, ցանկացած  $x \geq 0$  արժեքի համար

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}},$$

որտեղ  $0 < \theta(x) < 1$ : Ապացուցել, որ այս դեպքում՝

ա)  $\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2}$ ;

բ)  $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$  :

1439. Ստուգել, որ հետևյալ ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրը  $[0;2]$  հատվածում բավարարում է Լագրանժի թեորեմի բոլոր պայմաններին և գտնել համապատասխան  $\xi$  կետը, որի համար ճշմարիտ է վերջավոր աճերի բանաձևը.

ա)  $f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{x}, & 1 < x \leq 2; \end{cases}$

բ)  $f(x) = \begin{cases} \arctg x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\pi-1}{2}x - \frac{\pi-2}{4}x^2, & 1 < x \leq 2: \end{cases}$

1440. Համոզվել, որ հետևյալ ֆունկցիաները  $[-1;1]$  հատվածի ոչ բոլոր կետերում են դիֆերենցելի, սակայն ցանկացած  $[a;b] \subset [-1;1]$  հատվածի վրա դրանցից յուրաքանչյուրի համար ճշմարիտ է վերջավոր աճերի բանաձևը.

ա)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  ; բ)  $f(x) = \sqrt{|x|} \operatorname{sgn} x$  :

1441. Գիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները  $[a;b]$  հատվածում անընդհատ են, իսկ  $(a;b)$ -ում՝ դիֆերենցելի: Ապացուցել, որ եթե  $g(a) \neq g(b)$ , ապա Կոշու թեորեմում  $g'(x) \neq 0$  պայմանը կարելի է փոխարինել  $f'(x) \neq 0$  պայմանով:

1442. Գիցուք  $f$  -ը դիֆերենցելի է  $(a;b)$  միջակայքում: Ճշմարիտ է արդյոք, որ ցանկացած  $\xi \in (a;b)$  կետի համար գոյություն ունի կետերի  $x_1, x_2 \in (a;b)$  գույգ, այնպիսին, որ

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\xi) \quad (x_1 < \xi < x_2):$$

Բերել համապատասխան օրինակ:

1443.  $f$  ֆունկցիան անվանենք  $[a;b]$  հատվածում հավասարաչափ դիֆերենցելի, եթե այն  $[a;b]$ -ում դիֆերենցելի է և, բացի այդ,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in [a; b] \left( 0 < |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} - f'(x_1) \right| < \varepsilon \right):$$

Ապացուցել, որ  $f$ -ն  $[a; b]$ -ում հավասարաչափ դիֆերենցելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $f \in C^1[a; b]$ :

**1444.** Ապացուցել, որ եթե  $n$  անգամ դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիայի արժեքները  $n+1$  կետում համընկնում են  $(n-1)$ -րդ աստիճանի որևէ հանրահաշվական բազմանդամի արժեքներին, ապա գոյություն ունի միջանկյալ կետ, որում  $f^{(n)}(x)$ -ը զրո է:

**1445.** Հայտնի է, որ  $P(x)$  հանրահաշվական բազմանդամի բոլոր արմատներն իրական են: Ցույց տալ, որ եթե  $a$ -ն  $P'(x)$  բազմանդամի համար բազմապատիկ արմատ է, ապա այն արմատ է նաև  $P(x)$ -ի համար:

**1446.** Դիցուք  $f$ -ը դիֆերենցելի է  $[x_1; x_2]$  հատվածում, ընդ որում՝  $x_1 \cdot x_2 > 0$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\xi \in (x_1; x_2)$  կետ, որի համար

$$\frac{1}{x_1 - x_2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi):$$

**1447.** Դիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները դիֆերենցելի են  $[x_1; x_2]$  հատվածում, ընդ որում՝  $g(x)g'(x) \neq 0$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\xi \in (x_1; x_2)$  կետ, որի համար՝

$$\frac{1}{g(x_1) - g(x_2)} \begin{vmatrix} g(x_1) & g(x_2) \\ f(x_1) & f(x_2) \end{vmatrix} = \frac{1}{g'(\xi)} \begin{vmatrix} f(\xi) & g(\xi) \\ f'(\xi) & g'(\xi) \end{vmatrix}:$$

**1448.** Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; b)$  վերջավոր միջակայքում և սահմանափակ չէ, ապա  $f'(x)$ -ը նույնպես սահմանափակ չէ: Օրինակով համոզվել, որ հակադարձ պնդումը ճշմարիտ չէ:

**1449.** Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ն  $(a; b)$  վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում ունի սահմանափակ ածանցյալ ( $|f'(x)| \leq K$ ), ապա՝

ա)  $f$ -ը բավարարում է Լիպշիցի պայմանին.

$$\forall x, y \in (a; b) (|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|);$$

բ)  $f$ -ն  $(a; b)$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ է:

1450. Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ն  $(a; +\infty)$ -ում դիֆերենցելի է և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ ,

ապա՝ ա)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ :

1451. Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ը դիֆերենցելի է  $(a; +\infty)$  միջակայքում և  $f(x) = o(x)$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = 0$ : Բերել մոնոտոն և դիֆերենցելի ֆունկցիայի օրինակ, որի համար  $f(x) = o(1)$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$ , բայց  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f'(x)| = +\infty$ :

1452. Գիցուք  $f$ -ն  $[a; b]$  հատվածում անընդհատ է, իսկ  $(a; b)$  միջակայքում՝ դիֆերենցելի: Ապացուցել, որ եթե գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) = f'(a+0)$  վերջավոր կամ անվերջ սահմանը, ապա գոյություն կունենա նաև  $f'_+(a)$  համապատասխանաբար վերջավոր կամ անվերջ միակողմանի ածանցյալը, ընդ որում՝  $f'_+(a) = f'(a+0)$ :

1453. Ստուգել, որ

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x} \quad (x \neq 1), \quad f(1) = 0$$

ֆունկցիայի համար գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x)$  վերջավոր սահմանը, սակայն  $f$ -ը  $x=1$  կետում չունի վերջավոր միակողմանի ածանցյալներ: Պարզել նախորդ խնդրի հետ թվացյալ հակասության պատճառը:

1454. Ապացուցել, որ  $y(x)$  ( $x \in R$ ) ֆունկցիան բավարարում է  $y' = \lambda y$  ( $\lambda = \text{const}$ ) դիֆերենցիալ հավասարմանը, այն և միայն այն դեպքում, երբ  $y = C \cdot e^{\lambda x}$ , որտեղ  $C$ -ն կամայական հաստատուն է:

1455. Ապացուցել, որ  $y(x)$   $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$  ֆունկցիան բավարարում է  $y'tgx - y = a$  ( $a = \text{const}$ ) դիֆերենցիալ հավասարմանը, այն և միայն այն դեպքում, երբ  $y = C \sin x - a$ , որտեղ  $C$ -ն կամայական հաստատուն է:

1456. Գիցուք  $f(x) = \cos \chi(x)$ , որտեղ  $\chi(x)$ -ը Գիրիխլեի ֆունկցիան է: Ստուգել, որ  $f$ -ը  $x_0 = 0$  կետի շրջակայքում նույնիսկ մեկ անգամ դիֆերենցելի չէ և, այնուամենայնիվ, պարզել՝ ճշմարիտ է արդյոք ֆունկցիայի հետևյալ վերլուծությունը.

$$f(x) = 1 - \frac{x^2(x)}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}(x)}{(2n)!} + r_{2n}(x),$$

որտեղ  $|r_{2n}(x)| \leq \frac{1}{(2n+2)!}$ :

1457. Ստուգել, որ

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{երբ } x \neq 0, \\ 0, & \text{երբ } x = 0 \end{cases}$$

ֆունկցիան  $x_0 = 0$  կետում անվերջ դիֆերենցելի է, ընդ որում՝  $f^{(n)}(0) = 0$  ( $n \in N$ ):

ա) Ճշմարիտ է արդյոք հետևյալ վերլուծությունը.

$$e^{-\frac{1}{x^2}} = 1 - \frac{1}{x^2} + \dots + \frac{(-1)^n}{n! x^{2n}} + o\left(\frac{1}{x^{2n}}\right) \quad (x \rightarrow \infty):$$

բ) Գտնել ֆունկցիայի  $x_0 = 0$  կետի շրջակայքում Թեյլորի վերլուծության  $n$ -րդ մնացորդային անդամը ( $r_n(x_0, x)$ -ը):

1458. Ստուգել, որ  $y = e^{|x|}$  ֆունկցիան  $x_0 = 0$  կետում դիֆերենցելի չէ և պարզել՝ ճշմարիտ է արդյոք հետևյալ վերլուծությունը.

$$e^{|x|} = 1 + |x| + \dots + \frac{|x|^n}{n!} + o(x^n):$$

Գտնել անվերջ փոքր ֆունկցիայի գլխավոր մասը՝  $C \cdot x^n$  ( $x \rightarrow 0$ ) տեսքով (1459-1462).

1459.  $f(x) = tg \sin x - \sin tgx$  :                      1460.  $f(x) = (1+x)^x - 1$  :

1461.  $f(x) = 1 - \frac{1}{e}(1+x)^{\frac{1}{x}}$  :                      1462.  $f(x) = \ln \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$  :

1463. Ընտրել  $a$  և  $b$  գործակիցներն այնպես, որ ճշմարիտ լինի հետևյալ ասիմպտոտիկ բանաձևը.

$$ctgx = \frac{1+ax^2}{x+bx^3} + O(x^5) \quad (x \rightarrow 0):$$

1464. Ընտրել  $a, b, c, d$  թվերն այնպես, որ ճշմարիտ լինի հետևյալ ասիմպտոտիկ բանաձևը.

$$e^x = \frac{1+ax+bx^2}{1+cx+dx^2} + O(x^5) \quad (x \rightarrow 0):$$

1465. Ընտրել  $a, b, c$  բվերն այնպես, որ հետևյալ ասիմպտոտիկ բանաձևերը լինեն ճշմարիտ  $n$ -ի հնարավոր ամենամեծ արժեքի համար ( $x \rightarrow 0$ ).

$$\text{ա) } \ln(1+x) = \frac{ax^2+x}{bx+1} + O(x^n);$$

$$\text{բ) } \operatorname{arctg} x = \frac{ax^3+x}{bx^2+1} + O(x^n);$$

$$\text{գ) } \arcsin x = \frac{ax^3+x}{bx^2+1} + O(x^n);$$

$$\text{դ) } (1+x)^x = \frac{ax^2+bx+1}{cx+1} + O(x^n);$$

$$\text{ե) } \sqrt[k]{1+x} = \frac{ax+1}{bx+1} + O(x^n);$$

1466. Հետազոտել  $f(x)$  ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունն  $x_0 = 0$  կետում.

$$\text{ա) } f(x) = \sqrt[3]{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}; \quad \text{բ) } f(x) = \sqrt[4]{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}};$$

$$\text{գ) } f(x) = (x - \ln(1+x)) \cdot \operatorname{sgn} x; \quad \text{դ) } f(x) = (\operatorname{sh} x - \operatorname{tg} x) \chi(x),$$

որտեղ  $\chi(x)$ -ը Գիբրիխի ֆունկցիան է:

1467. Գտնել  $f(h) = \ln(x+h)$  ( $x > 0$ ) ֆունկցիայի վերլուծությունն ըստ  $h$ -ի աստիճանների:

1468. Գիցուք  $f$ -ն  $x_0$  կետում  $n+1$  անգամ դիֆերենցելի է, ընդ որում՝

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x_0) \neq 0:$$

Ապացուցել, որ Թեյլորի վերլուծության մեջ՝

$$f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}h + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}:$$

1469. Ապացուցել, որ ցանկացած

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad (n \geq 1, a_n \neq 0),$$

հանրահաշվական բազմանդամի համար գոյություն ունի այնպիսի  $x_0$ , որ  $(-\infty; -x_0)$  և  $(x_0; +\infty)$  միջակայքերից յուրաքանչյուրի վրա  $P(x)$ -ը խիստ մոնոտոն է:

1470. Ապացուցել, որ ցանկացած ռացիոնալ ֆունկցիա՝

$$Q(x) = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m} \quad (m+n > 0, a_nb_m \neq 0),$$

$(-\infty; -x_0)$  և  $(x_0; +\infty)$  միջակայքերից յուրաքանչյուրի վրա, որտեղ  $x_0$ -ն բավականաչափ մեծ դրական թիվ է, խիստ մոնոտոն է:

**1471.** Ապացուցել, որ եթե  $f$  և  $\varphi$  ֆունկցիաներն  $[x_0; +\infty)$  միջակայքում դիֆերենցելի են,  $\varphi$ -ն աճող է և  $|f'(x)| \leq \varphi'(x)$  ( $x \geq x_0$ ), ապա

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \varphi(x) - \varphi(x_0) \quad (x \geq x_0):$$

**1472.**  $f(x)$  ֆունկցիան կոչվում է  $x_0$  կետում աճող, եթե  $x_0$ -ի որևէ շրջակայքում արգումենտի  $\Delta x = x - x_0$  աճը և ֆունկցիայի  $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$  աճը միևնույն նշանի են:

Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ն  $[a; b]$  միջակայքի յուրաքանչյուր կետում աճող է, ապա այն այդ միջակայքում աճող է:

**1473.** Ստուգել, որ  $f(x) = x + x^2 \sin \frac{2}{x}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 0$  ֆունկցիան  $x_0 = 0$

կետում աճող է (տես նախորդ խնդիրը), սակայն այդ կետի ոչ մի շրջակայքում աճող չէ:

**1474.** Դիցուք  $\varphi$  և  $\psi$  ֆունկցիաներն  $[x_0; +\infty)$  միջակայքում  $n$  անգամ դիֆերենցելի են, ընդ որում՝  $\varphi^{(k)}(x_0) = \psi^{(k)}(x_0)$  ( $k = 0, 1, \dots, n-1$ ): Ապացուցել, որ եթե  $\varphi^{(n)}(x) > \psi^{(n)}(x)$  ( $x > x_0$ ), ապա  $\varphi(x) > \psi(x)$  ( $x > x_0$ ):

**1475.** Օգտվելով նախորդ խնդրում ձևակերպված պնդումից՝ ապացուցել հետևյալ անհավասարությունները.

$$\text{ա) } x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \quad (x > 0);$$

$$\text{բ) } \ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2} \quad (x > 0); \quad \text{գ) } \operatorname{tg} x > x + \frac{x^3}{3} \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right):$$

**1476.** Դիցուք  $P(x)$ -ն  $n$ -րդ աստիճանի հանրահաշվական բազմանդամ է և  $a \in \mathbb{R}$ : Ապացուցել, որ եթե  $P(a) \geq 0$ ,  $P'(a) \geq 0$ , ...,  $P^{(n-1)}(a) \geq 0$  և  $P^{(n)}(a) > 0$ , ապա  $P(x)$  բազմանդամի իրական արմատները չեն գերազանցում  $a$ -ն:

Ապացուցել անհավասարությունը (1477-1485).

$$\text{1477. } \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} \quad (x > 0):$$

$$1478. 1 + 2 \ln x \leq x^2 \quad (x > 0): \quad 1479. \frac{2}{\pi} x < \sin x < x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right):$$

$$1480. \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{x-a} \quad (x > a > 0): \quad 1481. \cos x < \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \quad \left(0 < |x| < \frac{\pi}{2}\right):$$

$$1482. \sin x + \operatorname{tg} x > 2x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right): \quad 1483. \sin x \leq \frac{4x}{\pi^2}(\pi - x) \quad (0 \leq x \leq \pi):$$

$$1484. \cos x \leq 1 - \frac{4x^2}{\pi^2} \quad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right):$$

$$1485. \text{ա) } \operatorname{tg} x \geq \frac{2x}{\pi - 2x} \quad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right); \quad \text{բ) } \operatorname{tg} x \leq \frac{2x}{\pi - 2x} \quad \left(\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2}\right):$$

Գտնել պարամետրական հավասարումներով տրված  $y = y(x)$  ֆունկցիայի ածանցյալը և նվազման միջակայքերը (1486-1491).

Այս վարժարանները կատարելիս անհրաժեշտ է նախ գտնել  $t$  պարամետրի փոփոխման այն միջակայքերը, որոնցում  $y$ -ը որոշվում է որպես  $x$ -ից կախված միարժեք ֆունկցիա և, այնուհետև, հետագոտել ստացված ֆունկցիան մոնոտոնության առումով:

$$1486. x = 2t - t^2, \quad y = 3t - t^3: \quad 1487. x = \frac{(t+1)^2}{4}, \quad y = \frac{(t-1)^2}{4}:$$

$$1488. x = t + e^{-t}, \quad y = 2t + e^{-2t}: \quad 1489. x = t \ln t, \quad y = \frac{\ln t}{t}:$$

$$1490. x = \cos^4 t, \quad y = \sin^4 t:$$

$$1491. x = \operatorname{sh} t - t, \quad y = \operatorname{ch} t - 1:$$

1492. Կառուցել  $R$ -ի վրա դիֆերենցելի և խիստ մոնոտոն ֆունկցիա, որի ածանցյալն անվերջ թվով կետերում գրո է:

1493. Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; b)$  վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում,  $f'(x) \geq 0$  և  $f'(x)$ -ի գրոները միմյանցից մեկուսացված կետեր են, ապա  $f(x)$ -ն աճող է:

1494. Ապացուցել, որ եթե  $f(x)$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $(a; b)$  միջակայքում և  $f'(x)$  ֆունկցիան սահմանափակ է, ապա  $f$ -ը կարելի է ներկայացնել որպես երկու աճող ֆունկցիաների տարբերություն:

1495. Յույց տալ, որ  $y = \frac{x+1}{x^2+1}$  ֆունկցիան ունի երեք շրջման կետ: Ստուգել, որ գրաֆիկի համապատասխան կետերը գտնվում են մի ուղղի վրա:

1496. Ընտրել  $h$  պարամետրի արժեքն այնպես, որ  $y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$  ( $h > 0$ )

կորն  $x = \pm\sigma$  կետերում ունենա շրջում:

1497. Ապացուցել հետևյալ անհավասարությունները.

ա)  $x^\alpha - 1 \leq \alpha(x-1)$  ( $x > 0, 0 < \alpha < 1$ );

բ)  $x^\alpha - 1 \geq \alpha(x-1)$  ( $x > 0, \alpha < 0$  կամ  $\alpha > 1$ ):

1498. Դիցուք՝  $a > 0, b > 0$ , իսկ  $p$  և  $q$  թվերն այնպիսին են, որ  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ :

Ապացուցել Յունգի անհավասարությունները.

ա)  $a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$  ( $p > 1$ );      բ)  $a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}$  ( $p < 1$ ):

Ցուցում: Նախորդ խնդրում տեղադրել  $x = \frac{a}{b}$  և  $\alpha = \frac{1}{p}$ :

1499. Դիցուք՝  $x_i, y_i \in R_+$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) և  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ : Ապացուցել Հյուլերի անհավասարությունները.

ա)  $\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^p \right\}^{\frac{1}{p}} \left\{ \sum_{i=1}^n y_i^q \right\}^{\frac{1}{q}}$  ( $p > 1$ );

բ)  $\sum_{i=1}^n x_i y_i \geq \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^p \right\}^{\frac{1}{p}} \left\{ \sum_{i=1}^n y_i^q \right\}^{\frac{1}{q}}$  ( $p < 1, p \neq 0$ )

(երբ  $p < 0$ ՝ ընդունել  $x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ ):

Ցույց տալ, որ հավասարությունը տեղի ունի միայն այն դեպքում, երբ  $x_i = \lambda y_i, i = 1, 2, \dots, n$  ( $\lambda = const$ ):

Ցուցում: Յունգի անհավասարության մեջ տեղադրել  $a = \frac{x_i^p}{\sum_{i=1}^n x_i^p}, b = \frac{y_i^q}{\sum_{i=1}^n y_i^q}$ :

1500. Դիցուք՝  $x_i, y_i \in R_+$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ): Ապացուցել Մինկովսկու անհավասարությունները.

ա)  $\left\{ \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \right\}^{\frac{1}{p}} \leq \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^p \right\}^{\frac{1}{p}} + \left\{ \sum_{i=1}^n y_i^p \right\}^{\frac{1}{p}}$  ( $p > 1$ );



$$p) \left\{ \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \right\}^{\frac{1}{p}} \geq \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^p \right\}^{\frac{1}{p}} + \left\{ \sum_{i=1}^n y_i^p \right\}^{\frac{1}{p}} \quad (p < 1, p \neq 0)$$

( $p < 0$  դեպքում ընդունել  $x_i, y_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ ):

Ստուգել, որ հավասարությունը տեղի ունի միայն այն դեպքում, երբ  $x_i = \lambda y_i, i = 1, 2, \dots, n$  ( $\lambda = const$ ):

Ցուցում:  $\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^p \equiv \sum_{i=1}^n x_i(x_i + y_i)^{p-1} + \sum_{i=1}^n y_i(x_i + y_i)^{p-1}$  նույնության աջ կողմի նկատմամբ կիրառել Հյուդերի անհավասարությունը:

**1501.** Դիցուք  $f$  -ն  $(a; b)$  միջակայքում ուռուցիկ ֆունկցիա է: Ապացուցել, որ այդ միջակայքի ցանկացած  $x_1, x_2, \dots, x_n$  կետերի և ցանկացած  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  ( $\alpha_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ ) թվերի համար ճշմարիտ է Յենսենի անհավասարությունը.

$$f\left(\frac{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}\right) \leq \frac{\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)}{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}.$$

**1502.** Օգտագործելով լոգարիթմական ֆունկցիայի ուռուցիկությունը՝ ապացուցել հետևյալ անհավասարությունը. ցանկացած  $x_i > 0, p_i \geq 0, i = 1, \dots, n,$

$\sum_{i=1}^n p_i = 1,$  թվերի համար  $\prod_{i=1}^n x_i^{p_i} \leq \sum_{i=1}^n p_i x_i$ : Այստեղից ստանալ Յունգի անհավասարության նոր ապացույց:

**1503.** Համոզվել, որ  $\ln(1 + e^x)$  ֆունկցիան ուռուցիկ է և դա օգտագործելով՝ ապացուցել հետևյալ անհավասարությունը. ցանկացած  $a_i, b_i, \alpha_i, i = 1, 2, \dots, n,$  դրական թվերի համար ( $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$ )

$$a_1^{\alpha_1} \dots a_n^{\alpha_n} + b_1^{\alpha_1} \dots b_n^{\alpha_n} \leq (a_1 + b_1)^{\alpha_1} \dots (a_n + b_n)^{\alpha_n}:$$

**1504.** Դիցուք  $f(x)$  ֆունկցիան որոշված է  $x_0$  կետի շրջակայքում և  $x_0$ -ն նրա համար մաքսիմումի կետ է: Կարելի՞ քան արդյոք պնդել, որ գոյություն ունի  $U_{x_0}$  շրջակայք, այնպիսին, որ  $U_{x_0}^-$ -ի վրա  $f$ -ն աճող է, իսկ  $U_{x_0}^+$ -ի վրա՝ նվազող: Բերել համապատասխան օրինակ:

**1505.** Ստուգել, որ  $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 0$  և  $g(x) = xf(x)$  ֆունկցիաներն  $x = 0$  կետում բավարարում են միևնույն՝  $f^{(n)}(0) = g^{(n)}(0) = 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), պայմանին, բայց  $f$ -ն այդ կետում ունի մաքսիմում, իսկ  $g$ -ի համար այն էքստրեմումի կետ չէ:

1506. Ապացուցել անհավասարությունը.

ա)  $|3x - x^3| \leq 2$ , երբ  $|x| \leq 2$ ;

բ)  $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$ , երբ  $0 \leq x \leq 1$ ,  $p > 1$ ;

գ)  $x^\alpha (c-x)^\beta \leq \frac{\alpha^\alpha \beta^\beta}{(\alpha+\beta)^{\alpha+\beta}} c^{\alpha+\beta}$ , երբ  $\alpha > 0$ ,  $\beta > 0$  և  $0 \leq x \leq c$ :

1507. Ապացուցել, որ երկու անգամ դիֆերենցելի ցանկացած ֆունկցիայի էքստրեմումի երկու կետերի միջև գոյություն ունի կետ, որտեղ ֆունկցիայի երկրորդ կարգի ածանցյալը զրո է:

1508. Կառուցել ֆունկցիա, որի երկու շրջման կետերի միջև գոյություն չունենա էքստրեմումի կետ:

1509. Համոզվել, որ ֆունկցիայի շրջման կետը չի կարող միաժամանակ լինել խիստ էքստրեմումի կետ:

Գիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները որոշված են  $[a; b]$  հատվածի վրա:

$$\Delta = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

արտահայտությունը կոչվում է  $[a; b]$  հատվածի վրա  $f$  և  $g$  ֆունկցիաների շեղում:

1510. Գտնել  $f(x) = x^2$  և  $g(x) = x^3$  ֆունկցիաների շեղումը  $[0; 1]$  հատվածի վրա:

1511. Գտնել  $[-2; 1]$  հատվածի վրա  $P(x) = x(x-1)^2(x+2)$  բազմանդամի շեղումը զրոյից:

1512.  $q$  պարամետրի  $h^\circ$ նչ արժեքի դեպքում  $[-1; 1]$  հատվածի վրա  $P(x) = x^2 + q$  ֆունկցիայի շեղումը զրոյից կլինի նվազագույնը:

1513.  $f(x) = ax + b$  գծային ֆունկցիան ընտրել այնպես, որ  $[-1; 2]$  հատվածի վրա նրա շեղումը  $g(x) = |x|$  ֆունկցիայից լինի նվազագույնը:

1514.  $f(x) = ax + b$  գծային ֆունկցիան ընտրել այնպես, որ  $[0; 1]$  հատվածի վրա նրա շեղումը  $g(x) = x^2$  ֆունկցիայից լինի նվազագույնը:

\*\*\*

1515. Ապացուցել, որ եթե  $y = y(x)$  ֆունկցիան տրված է  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$  հավասարումներով և նրա գրաֆիկն ունի կոորդինատների առանցքներին ոչ զուգահեռ ասիմպտոտ, ապա գոյություն ունի  $t_0$  ( $-\infty \leq t_0 \leq +\infty$ ), այնպիսին, որ միաժամանակ

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = \infty \quad \text{և} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \psi(t) = \infty :$$

Ընդամին, եթե ասիմպտոտի հավասարումն է՝  $y = ax + b$ , ապա

$$a = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\psi(t)}{\varphi(t)}, \quad b = \lim_{t \rightarrow t_0} [\psi(t) - a\varphi(t)]:$$

Ինչպե՞ս գտնել առանցքներին զուգահեռ ասիմպտոտները:

**1516.** Գտնել հետևյալ կորերի ասիմպտոտները.

$$\text{ա) } x = \frac{1}{t}, \quad y = \frac{t}{t+1}; \quad \text{բ) } x = \frac{2t}{1-t^2}, \quad y = \frac{t^2}{1-t^2}:$$

Կառուցել հետևյալ պարամետրական հավասարումներով որոշվող կորերը (1517-1520).

**1517.**  $x = t^3 + 3t + 1, \quad y = t^3 - 3t + 1:$

**1518.**  $x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}:$

**1519.**  $x = a(2 \cos t - \cos 2t), \quad y = a(2 \sin t - \sin 2t):$

**1520.**  $x = te^t, \quad y = te^{-t}:$

Կառուցել հետևյալ հավասարումներով որոշվող կորերը (1521-1524).

Ցուցում:  $x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$  բանաձևերով անցնել բևեռային կոորդինատների, կամ դրանց միջոցով պարամետրական հավասարումների:

**1521.**  $x^2 + y^2 = x^4 + y^4:$

**1522.**  $y^2(a-x) = x^2(a+x) \quad (a > 0):$

**1523.**  $y^2(2a-x) = x^3:$

**1524.**  $x^2 y^2 = a(x^3 + y^3) \quad (a > 0):$

\*\*\*

**1525.** Ցույց տալ, որ  $xe^x = 2$  հավասարումն ունի միայն մեկ իրական արմատ և այն էլ  $(0;1)$  միջակայքում:

**1526.** Գիցուք  $f$ -ն անընդհատ է  $[x_0; +\infty)$  միջակայքում,  $f'(x) > k > 0$ , երբ  $x > x_0$  ( $k = \text{const}$ ): Ապացուցել, որ եթե  $f(x_0) < 0$ , ապա  $f(x) = 0$  հավասարումն

ունի  $\left(x_0; x_0 - \frac{f(x_0)}{k}\right)$  միջակայքում ունի ճիշտ մեկ իրական արմատ:

**1527.** Գիցուք  $[x_0; +\infty)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի  $f(x)$  ֆունկցիան բավարարում է  $f(x_0) > 0, f'(x_0) < 0$  և  $f''(x) \leq 0$  ( $x > x_0$ ) պայմաններին: Ապացուցել, որ  $f(x) = 0$  հավասարումն  $[x_0; +\infty)$  միջակայքում ունի ճիշտ մեկ իրական արմատ:

Գտնել հավասարման արմատների թիվը և սահմանագատել դրանք շրջակայքերով (1528-1533).

**1528.**  $x^3 - 6x^2 + 9x - 10 = 0:$

**1529.**  $x^5 - 5x = a:$

1530.  $\ln x = kx :$

1531.  $e^x = ax^2 :$

1532.  $\sin^3 x \cdot \cos x = a \quad (0 \leq x \leq \pi) :$  1533.  $chx = kx :$

1534. Պարզել, թե  $p$  և  $q$  պարամետրերի ի՞նչ արժեքների համար  $x^3 + px + q = 0$  հավասարումը կունենա

ա) ճիշտ մեկ իրական արմատ;

բ) ճիշտ երեք իրական արմատ:

## Պ.

1535. Դիցուք  $f$  -ը դիֆերենցելի է  $[a; +\infty)$  միջակայքում և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 :$

Ապացուցել, որ  $f'(x) = 0$  հավասարման արմատների քանակը ավելի քիչ չէ, քան  $f(x) = 0$  հավասարմանը:

1536. Ապացուցել, որ եթե  $(0; +\infty)$ -ում դիֆերենցելի  $f(x)$  ֆունկցիայի զրոների քանակն  $n$  է, ապա ցանկացած  $\alpha \in R$  թվի համար  $g(x) = f'(x) + \alpha f(x)$  ֆունկցիայի զրոների քանակը  $(n-1)$ -ից պակաս չէ: Ավելին, եթե  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\alpha x} f(x) = 0$ , ապա  $g(x)$ -ը  $(0; +\infty)$ -ում ունի առնվազն  $n$  զրո:

1537. Դիցուք  $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$  հավասարման բոլոր արմատներն իրական են: Ապացուցել, որ եթե  $P(x)$  հանրահաշվական բազմանդամի բոլոր արմատներն իրական են, ապա  $a_0P(x) + a_1P'(x) + \dots + a_nP^{(n)}(x) = 0$  հավասարման բոլոր արմատները նույնպես իրական են:

1538. Դիցուք  $f$  -ն  $n$  անգամ դիֆերենցելի է  $(a; b)$  միջակայքում  $(0 < a < b)$  և այդ միջակայքի  $n+1$  կետերում դառնում է զրո: Ապացուցել, որ եթե  $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  բազմանդամի բոլոր արմատներն իրական են, ապա  $(a; b)$  միջակայքում գոյություն ունի  $\xi$  կետ, այնպիսին, որ

$$a_0f(\xi) + a_1f'(\xi) + \dots + a_n f^{(n)}(\xi) = 0 :$$

1539. Ապացուցել, որ եթե  $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$  հավասարման բոլոր արմատներն իրական են, ապա իրական են նաև

$$a_0 + \frac{a_1}{1!}x + \dots + \frac{a_n}{n!}x^n = 0$$

հավասարման բոլոր արմատները:

1540. Տրված է  $[0; +\infty)$  միջակայքում անընդհատ և  $(0; +\infty)$ -ում դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիա: Դիցուք  $\xi = \xi(x)$  ֆունկցիան ընտրված է այնպես, որ ցանկացած  $x > 0$  արժեքի համար ճշմարիտ է վերջավոր աճերի բանաձևը.

$$f(x) - f(0) = x f'(\xi(x)), \quad 0 < \xi(x) < x:$$

Ապացուցել, որ եթե  $f(x) = x \sin(\ln x)$  ( $x > 0$ ),  $f(0) = 0$ , ապա ցանկացած  $(0; \varepsilon)$  միջակայքում  $\xi(x)$  ֆունկցիան խզվող է:

1541. Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ը  $(0; +\infty)$ -ում անընդհատ դիֆերենցելի է, իսկ  $f'(x)$ -ը՝ խիստ մոնոտոն (աճող կամ նվազող), ապա նախորդ խնդրում սահմանված  $\xi(x)$  ֆունկցիան միակն է և անընդհատ է:

1542. Ցույց տալ, որ ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի համար  $(-1; +\infty)$  միջակայքում

$$(1+x)^\alpha - \left( 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n \right) \quad (\alpha \notin \mathbb{N} \cup \{0\})$$

տարբերության միակ 0-կետը  $x = 0$ -ն է:

1543. Ստուգել, որ

$$e^x - \left( 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \right) = 0$$

հավասարման միակ արմատը  $x = 0$ -ն է:

1544. Ապացուցել, որ

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} = 0$$

հավասարումը կամ իրական արմատ չունի ( $n$ -ը գույգ է), կամ ունի միայն մեկ իրական արմատ ( $n$ -ը կենտ է): Համոզվել, որ երկրորդ դեպքում արմատը բազմապատիկ չէ:

1545. Դիցուք  $P(x)$ -ն  $(n-1)$ -րդ աստիճանի դրական գործակիցներով բազմանդամ է: Ապացուցել, որ  $x^n = P(x)$  հավասարումն ունի միայն մեկ դրական արմատ:

1546. Տրված է՝  $c_0 + \frac{c_1}{2} + \dots + \frac{c_n}{n+1} = 0$ : Ապացուցել, որ  $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = 0$

հավասարումն ունի առնվազն մեկ իրական արմատ:

1547. Ապացուցել, որ

$$P(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(2x - x^2)^k - 2x^k}{k}$$

բազմանդամի համար  $x = 0$ -ն  $(n+1)$ -պատիկ արմատ է:

1548. Դիցուք՝  $f \in C^\infty(R)$  և  $M = \{0; 1; \dots; n\}$ : Ապացուցել, որ եթե

$$\forall x \in R \quad \exists n_x \in M \quad (f^{(n_x)}(x) = 0),$$

ապա  $f$  -ը ոչ ավելի, քան  $(n-1)$ -րդ աստիճանի հանրահաշվական բազմանդամ է:

1549. Դիցուք  $f$  -ը դիֆերենցելի է  $(0; +\infty)$  միջակայքում և

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A:$$

Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ : Կմնա՞րք արդյոք պնդումը ճշմարիտ, եթե խնդրի

պայմանում  $f(x) + f'(x)$ -ը փոխարինենք  $f(x) - f'(x)$ -ով:

1550. Դիցուք  $f$  -ը  $(0; +\infty)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի է և

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = A:$$

Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ :

1551. Տրված է՝  $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  ֆունկցիան անընդհատ է,  $(0; 1)$  միջակայքում՝ դիֆերենցելի,  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի միմյանցից տարբեր կետերի  $a, b \in (0; 1)$  զույգ, այնպիսին, որ  $f'(a) \cdot f'(b) = 1$ :

1552. Ապացուցել Դարբուի թեորեմը. եթե  $f$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $[a; b]$  հատվածում և  $f'(a) \cdot f'(b) < 0$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որի համար  $f'(\xi) = 0$ :

1553. Տրված է  $[0; 1]$  հատվածում դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիա, որը բավարարում է  $f'(0) = 1$  և  $f'(1) = 0$  պայմաններին: Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\xi \in (0; 1)$  կետ, որի համար  $f'(\xi) = \xi$ :

1554. Դիցուք  $f$  -ը դիֆերենցելի է  $(a; b)$  միջակայքում: Ապացուցել, որ  $f'(x)$  ֆունկցիայի խզումները կարող են լինել միմիայն երկրորդ ստեղ:

Նկատենք, որ  $y = |x|$  ֆունկցիայի ամացյալն  $x$ -ը գրոյի ձգտելիս ունի վերջավոր միակողմանի ասիմաններ: Չի՞ հակասում արդյոք այս փաստը խնդրում ձևակերպված պնդմանը:

1555. Դիցուք  $f$  -ը դիֆերենցելի է  $(a; b)$  միջակայքում և ամենուրեք, բացի գուցե վերջավոր թվով կետերից,  $f'(x) = 0$ : Ապացուցել, որ  $f = const$ :

1556. Տրված է  $f: R \rightarrow R$  դիֆերենցելի ֆունկցիան: Ապացուցել, որ եթե ցանկացած  $a \in R$  թվի համար  $f'(x)$  ֆունկցիայի  $a$ -կետերի (տես խնդիր 803) բազմությունը փակ է, ապա  $f'(x)$ -ը անընդհատ է:

1557. Գիցուք  $f$  -ը դիֆերենցելի է  $x=0$  կետի շրջակայքում և  $f(0)=0$  : Համաձայն Լագրանժի թեորեմի՝ բավականաչափ փոքր  $h > 0$  թվի համար

$$\frac{f(-h)}{-h} = f'(\zeta), \quad \frac{f(h)}{h} = f'(\xi),$$

որտեղ  $-h < \zeta < 0 < \xi < h$  : Ապացուցել, որ եթե  $x=0$  կետում գոյություն ունի

$$f \text{ -ի երկրորդ կարգի ածանցյալը և } f''(0) \neq 0, \text{ ապա } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\xi - \zeta}{h} = 1 :$$

1558. Գիցուք  $f$  -ն  $(a; b)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի է և  $\xi \in (a; b)$  : Ապացուցել, որ եթե  $f''(\xi) \neq 0$ , ապա  $(a; b)$ -ում գոյություն ունեն  $x_1, x_2$  կետեր ( $x_1 < \xi < x_2$ ), որոնց համար

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\xi):$$

1559. Գիցուք  $f$  ֆունկցիան անընդհատ է  $[a; b]$  հատվածում, իսկ  $(a; b)$ -ում՝ դիֆերենցելի: Ապացուցել, որ եթե  $f$  -ը գծային չէ, ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որի համար

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|:$$

1560. Ապացուցել, որ եթե  $f$  -ն  $[a; b]$ -ում երկու անգամ դիֆերենցելի է և  $f'(a) = f'(b) = 0$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, այնպիսին, որ

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|:$$

1561. Գիցուք  $f$  -ն  $[a; b]$  հատվածում  $n$  անգամ դիֆերենցելի է և

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0,$$

$$f'(b) = f''(b) = \dots = f^{(n-1)}(b) = 0:$$

Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որի համար

$$|f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1} \cdot n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|:$$

1562. Գիցուք  $f \in C^2[0; 1]$  և  $f(0) = f(1) = 0$  : Ապացուցել, որ

$$\forall x \in (0; 1) (|f''(x)| \leq A) \Rightarrow \forall x \in [0; 1] \left( |f'(x)| \leq \frac{A}{2} \right):$$

**1563.** Տրված է  $[-1;1]$  հատվածում անընդհատ և  $(-1;1)$ -ում երկու անգամ դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիա: Հայտնի է նաև, որ  $f(-1)=f(1)=0$ : Ապացուցել, որ

$$\forall x \in [-1;1] \left( |f''(x)| \leq A \right) \Rightarrow \forall x \in [-1;1] \left( |f(x)| \leq \frac{A}{2} (1-x^2) \right):$$

**1564.** Գիցուք  $f$  -ն  $R$  -ի վրա երկու անգամ դիֆերենցելի է և

$$M_k = \sup_{x \in R} |f^{(k)}(x)| < +\infty \quad (k = 0,1,2):$$

Ապացուցել անհավասարությունը.  $M_1^2 \leq 2M_0M_2$ :

**1565.** Գիցուք  $f$  -ը երկու անգամ դիֆերենցելի է  $[-a;a]$  հատվածում և

$$M_k = \sup_{-a \leq x \leq a} |f^{(k)}(x)| < +\infty \quad (k = 0,1,2):$$

Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } |f'(x)| \leq \frac{M_0}{a} + \frac{x^2 + a^2}{2a} M_2;$$

$$\text{բ) եթե } a \geq \sqrt{\frac{M_0}{M_2}}, \text{ ապա } M_1^2 \leq 4M_0M_2:$$

Օրինակով համոզվել, որ այս վերջին անհավասարության մեջ գործակիցը չի կարելի փոխարինել ավելի փոքրով:

**1566.** Գիցուք  $f$  ֆունկցիան  $p$  անգամ դիֆերենցելի է և

$$M_k = \sup_{x \in R} |f^{(k)}(x)| \quad (k = 0,1,\dots,p):$$

Ապացուցել, որ եթե  $M_0$  -ն և  $M_p$  -ն վերջավոր են, ապա վերջավոր են նաև  $M_1$  -ը,  $M_2$  -ը, ...,  $M_{p-1}$  -ը, ընդ որում՝

$$M_k \leq 2^{\frac{k(p-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{p}} \cdot M_p^{\frac{k}{p}} \quad (k = 1,\dots,p-1):$$

**1567.** Տրված է  $[0;1]$  հատվածում երկու անգամ դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիա, որը բավարարում է  $f(0)=f(1)=0$  և  $\min_{x \in [0;1]} f(x) = -1$  պայմաններին: Ապացուցել,

որ  $\max_{x \in [0;1]} f''(x) \geq 8$ :

**1568.** Գիցուք  $f \in C^2[0;+\infty)$  և ամենուրեք՝  $|f''(x)| \leq 1$ : Ապացուցել, որ եթե  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ :



**1569.** Գիցուք  $f$  ֆունկցիան դիֆերենցելի է  $[0;1]$  հաստվածի վրա,  $f(0)=0$  և գոյություն ունի  $k$  հաստատուն, այնպիսին, որ ցանկացած  $x \in [0;1]$  կետում  $|f'(x)| \leq k|f(x)|$ : Ապացուցել, որ  $f(x) \equiv 0$ :

**1570.** Գիցուք  $f \in C^\infty(R)$  և գոյություն ունի  $L$  հաստատուն, այնպիսին, որ բոլոր  $n \in N$  և  $x \in R$  թվերի համար  $|f^{(n)}(x)| \leq L$ : Ապացուցել, որ եթե ցանկացած բնական թվի համար  $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ , ապա  $f(x) \equiv 0$ :

**1571.** Տրված է  $f \in C^\infty(R)$  ֆունկցիան: Հայտնի է, որ ցանկացած  $n \in Z_+$  և  $x \in R$  թվերի համար  $f^{(n)}(0) = 0$  և  $f^{(n)}(x) \geq 0$ : Ապացուցել, որ  $f(x) \equiv 0$ :

**1572.** Գիցուք  $f \in C^\infty[-1;1]$ , ցանկացած  $n \in Z_+$  թվի համար  $f^{(n)}(0) = 0$  և գոյություն ունի  $\alpha \in (0;1)$  թիվ, այնպիսին, որ

$$\sup_{x \in [-1;1]} |f^{(n)}(x)| \leq \alpha^n n! \quad (n = 0, 1, 2, \dots):$$

Ապացուցել, որ  $f(x) \equiv 0$ :

**1573.** Գիցուք  $f$  -ը որոշված է  $x_0$  կետի շրջակայքում: Եթե գոյություն ունի

$$f'_s(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) - f\left(x_0 - \frac{h}{2}\right)}{h}$$

վերջավոր սահմանը, ապա այն կոչվում է  $x_0$  կետում  $f$  ֆունկցիայի առաջին կարգի սիմետրիկ ածանցյալ կամ ածանցյալ ըստ Շվարցի:

Ապացուցել, որ եթե  $f$  -ն անընդհատ է  $[a; b]$  հաստվածում,  $(a; b)$  միջակայքի բոլոր կետերում ունի  $f'_s(x)$  սիմետրիկ ածանցյալ և  $f(a) < f(b)$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in (a; b)$  կետ, որում  $f'_s(\xi) \geq 0$ :

**1574.** Ապացուցել, որ եթե  $f \in C[a; b]$ ,  $f(a) = f(b)$  և  $(a; b)$ -ում  $f$  -ն ունի  $f'_s(x)$  սիմետրիկ ածանցյալ, ապա գոյություն ունեն  $x_1, x_2 \in (a; b)$  կետեր, այնպիսիք, որ  $f'_s(x_1) \leq 0$  և  $f'_s(x_2) \geq 0$ :

Կառուցել խնդրի բոլոր պայմաններին բավարարող  $f(x)$  ֆունկցիա, որի սիմետրիկ ածանցյալը ոչ մի կետում գրո չէ:

**1575.** Գիցուք  $f \in C[a; b]$  և  $(a; b)$  միջակայքի բոլոր կետերում գոյություն ունի  $f'_s(x)$  սիմետրիկ ածանցյալ: Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $x_1, x_2 \in (a; b)$  կետերի գույգ, այնպիսին, որ

$$f'_s(x_1) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_s(x_2):$$

1576. Ապացուցել, որ եթե  $(a; b)$  միջակայքում  $f$  ֆունկցիան անընդհատ է և ամենուրեք  $f'_s(x) = 0$ , ապա  $f = \text{const}$ :

1577. Երկրորդ կարգի սիմետրիկ ածանցյալը, կամ Շվարցի երկրորդ ածանցյալը, սահմանվում է հետևյալ կերպ.

$$f''_s(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}:$$

Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ը  $x$  կետում երկու անգամ դիֆերենցելի է, ապա գոյություն ունի  $f''_s(x)$ -ը և  $f''_s(x) = f''(x)$ :

1578. Դիցուք  $x_0$  կետի շրջակայքում  $f$  ֆունկցիան ունի հետևյալ վերլուծությունը.  $f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + \frac{Bh^2}{2!} + o(h^2)$ : Ճշմարիտ է արդյոք, որ ա)  $B = f''(x_0)$ ; բ)  $B = f''_s(x_0)$ : Պատասխանը հիմնավորել:

1579. Նշանակելով  $\Delta_s f(x) = f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f\left(x - \frac{h}{2}\right)$ ,  $\Delta_s^2 f(x) = \Delta_s(\Delta_s f(x)) = f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)$ ՝ սահմանենք  $x$  կետում  $f$  ֆունկցիայի  $n$ -րդ կարգի սիմետրիկ աճը՝  $\Delta_s^n f(x) = \Delta_s(\Delta_s^{n-1} f(x))$  անդրադարձ բանաձևով:

Ապացուցել, որ

ա)  $\Delta_s^k(f + g) = \Delta_s^k(f) + \Delta_s^k(g)$ ;

բ)  $\Delta_s^k(cf) = c\Delta_s^k f$ ;

գ)  $\Delta_s^n f(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f\left(x + \frac{n-2k}{2}h\right)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ :

1580. Եթե  $x_0$  կետում գոյություն ունի

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_s^k f(x_0)}{h^k} = f_s^{(k)}(x_0)$$

սահմանը, ապա այն անվանում են  $f$  ֆունկցիայի  $x_0$  կետում  $k$ -րդ կարգի սիմետրիկ ածանցյալ կամ Շվարցի ածանցյալ: Ապացուցել, որ եթե  $f$ -ն  $x_0$  կետում  $k$  անգամ դիֆերենցելի է, ապա  $f_s^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ :

1581. Դիցուք  $x_0$  կետի շրջակայքում  $f$  ֆունկցիան ունի

$$f(x_0 + h) = c_0 + c_1 h + \dots + c_n h^n + o(h^n)$$

վերլուծություն: Ապացուցել, որ  $x_0$  կետում գոյություն ունեն  $f$  ֆունկցիայի ընդհուպ մինչև  $n$ -րդ կարգի Շվարցի ածանցյալները, ընդ որում՝

$$c_0 = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h), c_k = \frac{f_s^{(k)}(x_0)}{k!} \quad (k = 1, 2, \dots, n):$$

Ստուգել, որ եթե  $f$ -ն  $x_0$  կետում անընդհատ է, ապա այն նաև դիֆերենցելի է: Այս պայմաններում երաշխավորված է արդյոք  $f$ -ի երկրորդ ածանցյալի գոյությունը:

**1582.** Ապացուցել, որ եթե  $f \in C[a; b]$  և  $(a; b)$  միջակայքում ամենուրեք  $f_s''(x) = 0$ , ապա  $f$ -ը գծային է.  $f(x) = c_0 + c_1x$ :

**1583.** Ապացուցել, որ եթե  $[a; b]$  հատվածի վրա անընդհատ  $f$  ֆունկցիայի  $f_s'(x)$  սիմետրիկ ածանցյալը ամենուրեք դրական է, ապա  $f$ -ը աճող է:

**1584.** Ճշմարիտ է արդյոք, որ եթե դիֆերենցելի ֆունկցիայի ածանցյալը որևէ կետում դրական է, ապա այդ կետի շրջակայքում ֆունկցիան աճող է: Բերել համապատասխան օրինակ:

Ապացուցել անհավասարությունը (1585-1593).

**1585.**  $\frac{\ln x}{x-1} < \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (x > 0, x \neq 1):$

**1586.**  $\frac{2}{2x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{2x+1}{2x(x+1)} \quad (x > 0):$

**1587.**  $|x-y| \leq |x^2 \ln x - y^2 \ln y| \leq 3e|x-y| \quad (1 \leq x, y \leq e):$

**1588.**  $\left| \frac{\ln x - \ln y}{x-y} - \frac{1}{y} \right| \leq \frac{1}{2}|x-y| \quad (x, y \geq 1, x \neq y):$

**1589.**  $|x^2 \arctg x - y^2 \arctg y| \leq \frac{\pi+1}{2}|x-y| \quad (0 \leq x, y \leq 1):$

**1590.**  $\left| \frac{\sin x - \sin y}{x-y} - \cos y \right| \leq \frac{1}{2}|x-y|:$

**1591.**  $(x^\alpha + y^\alpha)^\frac{1}{\alpha} > (x^\beta + y^\beta)^\frac{1}{\beta} \quad (x, y > 0, \beta > \alpha > 0):$

**1592.**  $x^y + y^x > 1 \quad (x, y > 0):$

**1593.**  $x + y + \cos(xy) \geq 1 \quad (x, y \geq 0):$

**1594.** Տրված են  $x_i > 0, \alpha_i > 0 \quad (i = 1, \dots, n)$  թվերը, ընդ որում՝  $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$ : Դի-

տարկենք

$$M_t(x; \alpha) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^t \right\}^{\frac{1}{t}} \quad (t \neq 0)$$

Ֆունկցիան: Այն անվանում են  $x_i$  թվերի  $\alpha$  կշռով  $t$ -րդ կարգի միջին:

ա) Հաշվել  $M_0(x; \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0} M_t(x; \alpha)$  սահմանը:

բ) Յույց տալ, որ երբ  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$ , ապա  $t = -1, 0, 1$  և  $2$  արժեք-

ների դեպքում ստացվում են  $x_i$  թվերի համապատասխանաբար հարմոնիկ, երկրաչափական, թվաբանական և քառակուսային միջինները:

գ) Ստուգել, որ  $M_t(x; \alpha)$ -ն որպես  $t$ -ի ֆունկցիա  $R$ -ի վրա չնվազող է, ընդ որում աճող է, եթե  $n > 1$  և  $x_i$  թվերից ոչ բոլորն են միմյանց հավասար:

**1595.** Գիցուք  $(a; b)$  միջակայքում որոշված  $f(x)$  ֆունկցիան այդ միջակայքի ցանկացած  $x_1, x_2$  կետերի համար բավարարում է

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

անհավասարությանը: Ապացուցել, որ

ա) ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի և  $x_1, \dots, x_n \in (a; b)$  կետերի համար

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n};$$

բ) ցանկացած  $r \in Q \cap [0; 1]$  թվի և  $x_1, x_2 \in (a; b)$  կետերի համար

$$f(rx_1 + (1-r)x_2) \leq rf(x_1) + (1-r)f(x_2);$$

գ) եթե  $f$  -ն անընդհատ է, ապա այն ուռուցիկ է:

**1596.** Գիցուք  $f$  -ը որոշված է  $[a; b]$  հատվածում և սահմանափակ է  $(\alpha; \beta) \subset [a; b]$  միջակայքում: Ապացուցել, որ եթե կետերի կամայական  $x_1, x_2 \in [a; b]$  զույգի համար

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

ապա

ա)  $f$  -ը սահմանափակ է  $[a; b]$  հատվածում;

բ)  $f$  -ն անընդհատ է (հետևաբար նաև ուռուցիկ է)  $(\alpha; \beta)$  միջակայքում:

**1597.** Գիցուք  $f \in C[a; b]$  և ցանկացած  $(\alpha; \beta) \subset [a; b]$  հատվածում գոյություն ունի  $x = p\alpha + (1-p)\beta \in (\alpha; \beta)$  ( $0 < p < 1$ ) կետ, այնպիսին, որ

$$f(p\alpha + (1-p)\beta) \leq pf(\alpha) + (1-p)f(\beta):$$

Ապացուցել, որ  $f$ -ն ուռուցիկ է:

**1598.** Ապացուցել, որ եթե  $f: (a; b) \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է, ապա այն անընդհատ է: Ճշմարիտ է արդյոք պնդումն  $[a; b]$  հատվածի համար:

**1599.** Ապացուցել, որ եթե  $f: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է և որևէ  $x_0 = pa + (1-p)b$  ( $0 < p < 1$ ) կետում  $f(x_0) = pf(a) + (1-p)f(b)$ , ապա  $f$ -ը գծային է:

**1600.** Դիցուք  $f: (a; b) \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ դիֆերենցելի է և ցանկացած  $x_1, x_2 \in (a; b)$  կետերի համար գոյություն ունի միայն մեկ  $\xi$  կետ, որի համար

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\xi):$$

Ապացուցել, որ  $f$ -ն ուռուցիկ է կամ գոգավոր:

**1601.** Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է և վերևից սահմանափակ, ապա այն հաստատուն է:

**1602.** Դիցուք  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է: Ապացուցել, որ եթե

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

ապա  $f$ -ը հաստատուն է:

**1603.** Ապացուցել, որ եթե  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է և գոյություն ունեն  $a$  և  $b$  հաստատուններ, այնպիսիք, որ  $|f(x)| \leq a|x| + b$  ( $x \in R$ ), ապա  $f$ -ը  $R$ -ի վրա հավասարաչափ անընդհատ է (տես խնդիր 836):

**1604.** Դիցուք  $f: (a; b) \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է: Ապացուցել, որ

ա)  $(a; b)$  միջակայքի յուրաքանչյուր կետում գոյություն ունեն  $f'_-(x)$  և  $f'_+(x)$  միակողմանի ածանցյալներ, ընդ որում՝  $f'_-(x) \leq f'_+(x)$ ;

բ) ցանկացած  $x_1 < x_2$  կետերի համար՝  $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2)$ :

**1605.** Ապացուցել, որ եթե նույնաբար գրոյից տարբեր  $f$  ֆունկցիան  $(x_0; +\infty)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի է և

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,$$

ապա այդ միջակայքում գոյություն ունի կետ, որտեղ ֆունկցիայի երկրորդ կարգի ածանցյալը զրո է:

**1606.** Գիցուք  $f$ -ը  $(x_0; +\infty)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի է և  $f''(x) \neq 0$ ,  $x \in (x_0; +\infty)$ : Ապացուցել, որ եթե  $y = kx + b$  ուղիղն  $f$  ֆունկցիայի ասիմպտոտն է, երբ  $x \rightarrow +\infty$ , ընդ որում՝  $f(x) \geq kx + b$  ( $x > x_0$ ), ապա  $f$ -ը ուռուցիկ է և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = k$ :

**1607.** Գիցուք  $f$ -ը  $(x_0; +\infty)$  միջակայքում երկու անգամ դիֆերենցելի է և  $f''(x) \neq 0$ ,  $x \in (x_0; +\infty)$ : Ապացուցել, որ եթե  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  սահմանը վերջավոր է, ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ :

**1608.** Ապացուցել, որ եթե  $[x_0; +\infty)$  միջակայքում սահմանափակ ֆունկցիան ունի մոնոտոն ածանցյալ, ապա  $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf''(x) = 0$ :

**1609.** Գիցուք թվային առանցքի վրա երկու անգամ դիֆերենցելի  $f$  ֆունկցիան բավարարում է  $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - |x|] = 0$  պայմանին: Ապացուցել, որ եթե առնվազն մեկ կետում  $f(x) \leq 0$ , ապա գոյություն ունի  $\xi$  կետ, որում  $f''(\xi) = 0$ :

**1610.** Ապացուցել, որ երկուսից մեծ ցանկացած կենտ աստիճանի ցանկացած հանրահաշվական բազմանդամ ունի առնվազն մեկ շրջման կետ:

**1611.** Ապացուցել, որ եթե հաստատունից տարբեր, դրական գործակիցներով հանրահաշվական բազմանդամը գույգ ֆունկցիա է, ապա այն նաև ուռուցիկ է: Ստուգել, որ այդպիսի բազմանդամի միակ էքստրեմումի կետը մինիմումի կետ է:

**1612.** Գտնել ամենացածր աստիճանի հանրահաշվական բազմանդամ, որը  $x = 1$  կետում ընդունում է  $y = 6$  մաքսիմալ արժեք, իսկ  $x = 3$  կետում՝  $y = 2$  մինիմալ արժեք:

**1613.** Գտնել մեծագույն  $\alpha$  և փոքրագույն  $\beta$  թվերը, որոնց համար ճշմարիտ է

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta} \quad (n \in \mathbb{N})$$

անհավասարությունը:

## Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ

Ս ա հ մ ա ն ու մ :  $F(x)$ -ը կոչվում է  $f(x)$  ֆունկցիայի *նախնական* ( $a; b$ ) վերջավոր կամ անվերջ միջակայքում, եթե  $F$ -ն ( $a; b$ )-ում դիֆերենցելի է և  $F'(x) = f(x)$ ,  $x \in (a; b)$ :

Եթե  $F$ -ն ( $a; b$ ) միջակայքում  $f$  ֆունկցիայի նախնականն է, ապա  $f$ -ի նախնականներ են  $F(x) + C$  ( $C = const$ ) տեսքի բոլոր ֆունկցիաները և միայն դրանք:

Դիցուք  $F$ -ը ստրված միջակայքում  $f$ -ի որևէ նախնականն է:

Սահմանում :  $f$  ֆունկցիայի բոլոր նախնականների բազմությունը՝  $\{F(x) + C : C \in R\}$ -ը, կոչվում է  $f$ -ի *անորոշ ինտեգրալ* և նշանակվում՝

$$\int f \text{ կամ } \int f(x) dx :$$

Այս նշանակման մեջ  $f$ -ը կոչվում է *ընդհնտեգրալ ֆունկցիա*, իսկ  $f(x)dx$ -ը՝ *ընդհնտեգրալ արտահայտություն*:

Տարրական ֆունկցիաների նախնականների աղյուսակ.

1.  $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$
2.  $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$
3.  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1), \quad \int e^x dx = e^x + C;$
4.  $\int \sin x dx = -\cos x + C;$
5.  $\int \cos x dx = \sin x + C;$
6.  $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$
7.  $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$
8.  $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C;$
9.  $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C;$
10.  $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C;$
11.  $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C;$
12.  $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C_1 = -\frac{1}{a} \operatorname{arcctg} \frac{x}{a} + C_2 \quad (a \neq 0);$
13.  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} + C_1 = -\operatorname{arccos} \frac{x}{a} + C_2 \quad (a > 0);$
14.  $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad (a \neq 0);$
15.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right| + C \quad (a \neq 0):$

Անորոշ ինտեգրալի հաշվման (ինտեգրման) հիմնական եղանակները:

1. Ինտեգրալի գծային ունեցումը: Գիցուք  $u$  և  $v$  ֆունկցիաներից յուրաքանչյուրը տրված միջակայքում ունի նախնական: Յանկացած  $\alpha$  և  $\beta$  հաստատունների համար  $\alpha u + \beta v$  ֆունկցիան այդ միջակայքում նույնպես կունենա նախնական, ընդ որում՝

$$\int (\alpha u + \beta v) = \alpha \int u + \beta \int v :$$

2. Մասերով ինտեգրում: Եթե  $u(x)$  և  $v(x)$  ֆունկցիաները տրված միջակայքում դիֆերենցելի են,  $u'(x)v(x)$  և  $v'(x)u(x)$  ֆունկցիաներից որևէ մեկն ունի նախնական, ապա մյուսը նույնպես ունի նախնական և

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx :$$

3. Փոփոխականի փոխարինում կամ տեղադրում: Եթե  $(a; b)$  միջակայքում որոշված  $f(x)$  ֆունկցիայի նախնականը  $F(x)$ -ն է և  $x = \varphi(t)$  ( $t \in (\alpha; \beta)$ ) անընդհատ դիֆերենցելի ֆունկցիայի արժեքներն ընկած են  $(a; b)$ -ում, ապա ճշմարիտ է ինտեգրման հետևյալ բանաձևը.

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + C, \quad t \in (\alpha; \beta) :$$

4. Ռացիոնալ ֆունկցիայի ինտեգրումը: Տրված է  $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$  ռացիոնալ ֆունկցիան: Եթե  $Q(x)$  հանրահաշվական բազմանդամը ներկայացված է

$$Q(x) = (x - x_1)^{k_1} \cdots (x - x_l)^{k_l} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{m_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{m_s}$$

տեսքով, որտեղ  $x_1, \dots, x_l$ -ը  $Q(x)$ -ի իրարից տարբեր իրական արմատներն են և  $(p_i, q_i) \neq (p_j, q_j)$ , երբ  $i \neq j$ , ապա հնարավոր է ստանալ  $R(x)$ -ի հետևյալ վերլուծությունը.

$$R(x) = p(x) + \sum_{i=1}^l \sum_{k=1}^{k_i} \frac{a_{ik}}{(x - x_i)^k} + \sum_{i=1}^s \sum_{k=1}^{m_i} \frac{b_{ik}x + c_{ik}}{(x^2 + p_ix + q_i)^k} :$$

Այստեղ  $p(x)$ -ը  $P(x)$  բազմանդամը  $Q(x)$ -ի վրա բաժանելիս ստացված քանորդն է և հետևաբար հայտնվում է միայն այն դեպքում, երբ  $P(x)$ -ի կարգը փոքր չէ  $Q(x)$ -ի կարգից: Իսկ  $a_{ik}$ ,  $b_{ik}$  և  $c_{ik}$  հաստատունները միարժեքորեն որոշվում են որպես գծային հավասարումների համակարգի լուծումներ, որը ստացվում է «անորոշ գործակիցների մեթոդ» կիրառելիս.  $R(x)$ -ի վերլուծության աջ կողմը բերվում է ընդհանուր հայտարարի (այն համընկնում է  $Q(x)$ -ին) և, այնուհետև, համարիչում ստացվող անհայտ գործակիցներով բազմանդամը նույնացվում է  $P(x)$ -ի հետ: Օգտագործելով ինտեգրալի գծայնությունը՝  $R(x)$ -ի ինտեգրման խնդիրը հանգեցվում է աստիճանային ֆունկցիաների և պարզագույն ռացիոնալ կոտորակների ինտեգրմանը:

Սահմանում:  $F \in C(a; b)$  ֆունկցիան կոչվում է  $f: (a; b) \rightarrow R$  ֆունկցիայի ընդհանրացված նախնական, եթե  $(a; b)$  միջակայքում ամենուրեք, բացի գուցե վերջավոր թվով կետերից,  $F$ -ը դիֆերենցելի է և  $F'(x) = f(x)$ :



## Ա

Կատարելով փոփոխականի պարզագույն փոխարինում և օգտվելով նախնականների աղյուսակից՝ գտնել ինտեգրալը (1614-1697).

$$1614. \int \sqrt[3]{2x} dx :$$

$$1615. \int \frac{dx}{\sqrt[5]{5x}} :$$

$$1616. \int x^2(x^2 - 3) dx :$$

$$1617. \int (\sqrt{x} + 1)(x + \sqrt{x} - 2) dx :$$

$$1618. \int \frac{(1 + \sqrt[3]{x})^3}{\sqrt[3]{x}} dx :$$

$$1619. \int \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} dx :$$

$$1620. \int e^{-x-3} dx :$$

$$1621. \int a^{x+1} e^{x+1} dx :$$

$$1622. \int \frac{dx}{x \ln x} :$$

$$1623. \int \cos(x+1) dx :$$

$$1624. \int \frac{dx}{\cos^2 3x} :$$

$$1625. \int ctg^2 x dx :$$

$$1626. \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx :$$

$$1627. \int \frac{dx}{\cos 2x + \sin^2 x} :$$

$$1628. \int \frac{3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^x}{2^x} dx :$$

$$1629. \int \frac{\cos x dx}{\sqrt[3]{\sin^2 x}} :$$

$$1630. \int \frac{dx}{\cos^2 x \sqrt{1 - tgx}} :$$

$$1631. \int \frac{dx}{x \cos^2(1 + \ln x)} :$$

$$1632. \int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx :$$

$$1633. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + 1}} :$$

$$1634. \int \frac{dx}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1 - x^2}} :$$

$$1635. \int e^x \sin(e^x) dx :$$

$$1636. \int e^{\cos x} \sin x dx :$$

$$1637. \int x e^{x^2} dx :$$

$$1638. \int \frac{\sqrt{x^4 + x^{-4} + 2}}{x^3} dx :$$

$$1639. \int \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}} dx :$$

$$1640. \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-x^{10}}} :$$

$$1641. \int \frac{x^3 dx}{\sqrt[5]{2x^4 + 1}} :$$

$$1642. \int \frac{e^{2x} dx}{e^{2x} + a^2} :$$

$$1644. \int 2^{-2x-7} dx :$$

$$1646. \int \frac{x(1-x^2)}{1+x^4} dx :$$

$$1648. \int \frac{3+x}{3-x} dx :$$

$$1650. \int \frac{x^2 dx}{1-3x^2} :$$

$$1652. \int \frac{e^{2x} + 1}{e^x + 1} dx :$$

$$1654. \int th^2 x dx :$$

$$1656. \int \frac{dx}{x(x-1)} :$$

$$1658. \int \frac{dx}{(x+1)(2x-3)} :$$

$$1660. \int \frac{dx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} \quad (a^2 \neq b^2) :$$

$$1662. \int \sin^2 x dx :$$

$$1664. \int \cos^3 x dx :$$

$$1666. \int tg^3 x dx :$$

$$1668. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} :$$

$$1670. \int \frac{dx}{\cos^4 x} :$$

$$1672. \int e^x \sqrt{e^x + 1} dx :$$

$$1643. \int \sqrt[4]{1-3x} dx :$$

$$1645. \int (e^{2x} - 1)^3 dx :$$

$$1647. \int \frac{x dx}{x+4} :$$

$$1649. \int \frac{x^2 dx}{2+x^2} :$$

$$1651. \int \frac{x^2 + 3}{x^2 - 1} dx :$$

$$1653. \int (a \cdot sh 3x + b \cdot ch 4x) dx :$$

$$1655. \int \frac{sh x dx}{a^2 + ch^2 x} :$$

$$1657. \int \frac{dx}{x^2 + 3x - 10} :$$

$$1659. \int \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} :$$

$$1661. \int \frac{dx}{(x+a)^2(x+b)^2} \quad (a \neq b) :$$

$$1663. \int \sin 3x \cdot \sin 5x dx :$$

$$1665. \int \sin^4 x dx :$$

$$1667. \int \sin^2 3x \cdot \sin^2 2x dx :$$

$$1669. \int \frac{\cos^2 x dx}{\sin x} :$$

$$1671. \int \frac{e^x dx}{x^2} :$$

$$1673. \int \frac{(1+e^x)^2}{e^{2x}} dx :$$

$$1674. \int \frac{(2x - \sqrt{\arcsin x})}{\sqrt{1-x^2}} dx :$$

$$1676. \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} dx :$$

$$1678. \int \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} :$$

$$1680. \int \frac{xdx}{(1+x^2)^{3/2}} :$$

$$1682. \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx :$$

$$1684. \int \frac{dx}{\sin^2 x \sqrt[4]{\operatorname{ctg} x}} :$$

$$1686. \int \frac{dx}{\cos x} :$$

$$1688. \int \frac{x^4 dx}{x^{10} + 3} :$$

$$1690. \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}} :$$

$$1692. \int \frac{x^2 dx}{(1-x)^{100}} :$$

$$1694. \int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} :$$

$$1696. \int \frac{x^3 dx}{x^8 - 2} :$$

$$1675. \int \frac{x + (\arccos 3x)^2}{\sqrt{1-9x^2}} dx :$$

$$1677. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} :$$

$$1679. \int \frac{x^2 dx}{(8x^3 + 27)^{2/3}} :$$

$$1681. \int \frac{dx}{x \ln x \ln \ln x} :$$

$$1683. \int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos 2x}} dx :$$

$$1685. \int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} :$$

$$1687. \int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1+x^{n+2}}} dx \quad (n \neq -2):$$

$$1689. \int \frac{2^x 3^x}{9^x - 4^x} dx :$$

$$1691. \int \frac{dx}{2 + e^x + e^{-x}} :$$

$$1693. \int \frac{x^5 dx}{x+1} :$$

$$1695. \int x\sqrt{2-5x} dx :$$

$$1697. \int \frac{xdx}{\sqrt[3]{1-3x}} :$$

Կատարելով փոփոխականի փոխարինում՝ գտնել նախնականը (1698-1706).

$$1698. \int x^2 \sqrt[3]{1-x} dx :$$

$$1699. \int x^3 (1-5x^2)^{10} dx :$$

$$1700. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{2-x}} :$$

$$1701. \int \frac{x^5 dx}{\sqrt{1-x^2}} :$$

$$1702. \int \frac{\sin x \cos^2 x}{1 + \cos^2 x} dx :$$

$$1703. \int \frac{\ln x dx}{x\sqrt{1 + \ln x}} :$$

$$1704. \int \frac{dx}{e^{x/2} + e^x} :$$

$$1705. \int \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x}} :$$

$$1706. \int \frac{\arctg \sqrt{x} dx}{\sqrt{x}(1+x)} :$$

Կատարելով փոփոխականի  $x = a \sin t$ ,  $x = atgt$ ,  $x = a \sin^2 t$  ( $a > 0$ ) փոխարինում՝ գտնել նախնականը (1707- 1712).

$$1707. \int \frac{dx}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} :$$

$$1708. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx :$$

$$1709. \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx :$$

$$1710. \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} :$$

$$1711. \int x \sqrt{\frac{x}{2a-x}} dx :$$

$$1712. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} :$$

Կատարելով փոփոխականի  $x = asht$ ,  $x = acht$ ,  $x = atht$  ( $a > 0$ ) փոխարինում՝ գտնել նախնականը (1713-1715).

$$1713. \int \sqrt{a^2 + x^2} dx :$$

$$1714. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} :$$

$$1715. \int \sqrt{\frac{x-a}{x+a}} dx :$$

Կիրառելով մասերով ինտեգրման մեթոդը՝ գտնել նախնականը (1716-1746).

$$1716. \int \ln x dx :$$

$$1717. \int x^n \ln x dx \quad (n \neq -1) :$$

$$1718. \int \sqrt{x} \ln^2 x dx :$$

$$1719. \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx :$$

$$1720. \int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx :$$

$$1721. \int x e^{-x} dx :$$

$$1722. \int x^3 e^{-x^2} dx :$$

$$1723. \int x \cos x dx :$$

$$1724. \int x^2 \sin 2x dx :$$

$$1725. \int \frac{x dx}{\cos^2 x} :$$

$$1726. \int x \sin^2 x dx :$$

$$1727. \int \sin x \ln tg x dx :$$

$$1728. \int x^2 \operatorname{ch} x dx :$$

$$1730. \int x \operatorname{arctg} x dx :$$

$$1732. \int x^2 \arcsin 2x dx :$$

$$1734. \int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx :$$

$$1736. \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx :$$

$$1738. \int x \sin \sqrt{x} dx :$$

$$1740. \int e^{ax} \cos b x dx :$$

$$1742. \int e^{2x} \sin^2 x dx :$$

$$1744. \int (e^x - \cos x)^2 dx :$$

$$1746. \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx :$$

Քառակուսի եռանդամից լրիվ քառակուսի անջատելով՝ գտնել նախնակամը (1747-1761).

$$1747. \int \frac{dx}{x^2 - x + 2} :$$

$$1749. \int \frac{x dx}{x^4 - 2x^2 - 1} :$$

$$1751. \int \frac{x^5 dx}{x^6 - x^3 - 2} :$$

$$1753. \int \frac{dx}{\sqrt{x+x^2}} :$$

$$1755. \int \frac{x dx}{x^2 - 2x \cos a + 1}, \sin a \neq 0 :$$

$$1729. \int \operatorname{arctg} x dx :$$

$$1731. \int \arccos(5x-2) dx :$$

$$1733. \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx :$$

$$1735. \int (\arcsin x)^2 dx :$$

$$1737. \int e^{\sqrt{x}} dx :$$

$$1739. \int \sin \ln x dx :$$

$$1741. \int e^{ax} \sin b x dx :$$

$$1743. \int \frac{e^{\operatorname{arctg} x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx :$$

$$1745. \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx :$$

$$1748. \int \frac{dx}{3x^2 - 2x - 1} :$$

$$1750. \int \frac{(x+1)}{x^2 + x + 1} dx :$$

$$1752. \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}} :$$

$$1754. \int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 - x + 2}} :$$

$$1756. \int \frac{(4-3x) dx}{5x^2 + 6x + 18} :$$

$$1757. \int \frac{(3x-1)dx}{\sqrt{x^2+2x+2}} :$$

$$1758. \int \frac{(x+3)dx}{\sqrt{3+4x-4x^2}} :$$

$$1759. \int \sqrt{x-x^2} dx :$$

$$1760. \int \frac{xdx}{x^4+6x^2+5} :$$

$$1761. \int \sqrt{x^2+2x+5} dx :$$

Գ-տնել ռացիոնալ ֆունկցիայի նախնականը (1762-1776).

$$1762. \int \frac{(2x+3)dx}{(x-2)(x+5)} :$$

$$1763. \int \frac{xdx}{(x+1)(x+2)(x+3)} :$$

$$1764. \int \frac{x^3 dx}{x^2+x-2} :$$

$$1765. \int \frac{x^4 dx}{x^4+5x^2+4} :$$

$$1766. \int \frac{(x^2+1)dx}{(x+1)^2(x-1)} :$$

$$1767. \int \frac{dx}{6x^3-7x^2-3x} :$$

$$1768. \int \frac{(x^2+1)dx}{(x^2-1)(x^2-4)} :$$

$$1769. \int \frac{dx}{(x^2-4x+4)(x^2-4x+5)} :$$

$$1770. \int \frac{xdx}{x^3-1} :$$

$$1771. \int \frac{(5x-14)dx}{x^3-x^2-4x+4} :$$

$$1772. \int \frac{x^5-2x^2+3}{x^2-4x+4} dx :$$

$$1773. \int \frac{x^3+x+1}{x^4-1} dx :$$

$$1774. \int \frac{(x^4+1)dx}{(x-1)(x^4-1)} :$$

$$1775. \int \frac{(x^3-6)dx}{x^4+6x^2+8} :$$

$$1776. \int \frac{x^6+x-1}{(x^6-x^5)(x+1)} dx :$$

Գ-տնել իռացիոնալ ֆունկցիայի նախնականը (1777-1785).

$R\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$  արտահայտության ինտեգրումը, որտեղ  $R(u, v)$ -ն ռացիոնալ ֆունկցիա է, իսկ

$a, b, c, d$  թվերը հաստատուններ են,  $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$  տեղադրումով բերվում է ռացիոնալ ֆունկցիայի ինտեգրմանը:

$$1777. \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} :$$

$$1778. \int \frac{x \sqrt[3]{2+x}}{x + \sqrt[3]{2+x}} dx :$$

$$1779. \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})^3} :$$

$$1780. \int \frac{\sqrt[6]{x} dx}{1+\sqrt[3]{x}} :$$

$$1781. \int \frac{dx}{2\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}-\sqrt[4]{x}} :$$

$$1782. \int \sqrt[5]{\frac{x}{x+1}} \frac{dx}{x^3} :$$

$$1783. \int \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}} dx :$$

$$1784. \int \frac{dx}{3x+\sqrt[3]{x^2}} :$$

$$1785. \int x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx :$$

Ինտեգրել եռանկյունաչափական արտահայտությունը (1786-1803).

$\int R(\sin x, \cos x) dx$  տեսքի ինտեգրալը, որտեղ  $R(u, v)$ -ն ռացիոնալ ֆունկցիա է,

ընդհանուր դեպքում բերվում է ռացիոնալ ֆունկցիայի ինտեգրալի՝ փոփոխականի  $t = tg \frac{x}{2}$  փոխարինման միջոցով: Եթե հայտնի է նաև, որ  $R(-u, v) = -R(u, v)$  կամ  $R(u, -v) = -R(u, v)$  կամ  $R(-u, -v) = R(u, v)$ , ապա ավելի հարմար է կատարել համապատասխանաբար  $t = \cos x$ ,  $t = \sin x$ ,  $t = tg x$  փոխարինումը:

$$1786. \int \cos^5 x dx :$$

$$1787. \int \sin^6 x dx :$$

$$1788. \int \sin^4 x \cos^5 x dx :$$

$$1789. \int \sin x \sin 2x \sin 3x dx :$$

$$1790. \int \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} dx :$$

$$1791. \int \frac{\sin 3x dx}{\cos x} :$$

$$1792. \int \frac{\cos^3 x}{\sin^5 x} dx :$$

$$1793. \int \frac{dx}{\sin x \cos^3 x} :$$

$$1794. \int \frac{dx}{\sin^4 x} :$$

$$1795. \int \frac{dx}{\sin x(1+\cos x)} :$$

$$1796. \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x - 6 \sin x + 5} :$$

$$1797. \int \frac{dx}{\cos x + \cos a}, \sin a \neq 0 :$$

$$1798. \int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5} :$$

$$1799. \int \frac{\sin^2 x dx}{1 + \sin^2 x} :$$

$$1800. \int \frac{dx}{1 + \varepsilon \cos x} \quad \text{ա) } 0 < \varepsilon < 1; \quad \text{բ) } \varepsilon > 1 :$$

$$1801. \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx :$$

$$1802. \int \frac{dx}{(2 + \cos x) \sin x} :$$

$$1803. \int \operatorname{tgxtg}(x+a)dx :$$

Գտնել ինտեգրալը (1804-1829).

$$1804. \int x \sqrt[3]{a+x} dx :$$

$$1805. \int \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+1}} dx :$$

$$1806. \int x e^{\sqrt[3]{x}} dx :$$

$$1807. \int \operatorname{arctg}(1+\sqrt{x}) dx :$$

$$1808. \int \frac{dx}{x - \sqrt{x^2 - 1}} :$$

$$1809. \int \frac{\sqrt{2x+1}}{x^2} dx :$$

$$1810. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x-1}} :$$

$$1811. \int \frac{x^2 dx}{x^2 + 12x + 35} :$$

$$1812. \int \frac{x dx}{2x^2 - x + 1} :$$

$$1813. \int \frac{x^4 dx}{x^2 + 4} :$$

$$1814. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} :$$

$$1815. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + x^4 \sqrt{x}} :$$

$$1816. \int \frac{dx}{\sqrt{2x-1} - \sqrt[4]{2x-1}} :$$

$$1817. \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1+x^2}} :$$

$$1818. \int \sqrt{4x^2 - 4x + 3} dx :$$

$$1819. \int \frac{\sin x dx}{1 + \sin x} :$$

$$1820. \int (\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^4 x) dx :$$

$$1821. \int sh^3 x ch^4 x dx :$$

$$1822. \int \frac{dx}{\sqrt{1 + \cos x}} :$$

$$1823. \int \frac{\operatorname{tg} x dx}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} :$$

$$1824. \int \frac{dx}{\sqrt{1 + e^x} + \sqrt{1 - e^x}} :$$

$$1825. \int x^3 \sin x^2 dx :$$

$$1826. \int \frac{x e^x}{(1 + e^x)^2} dx :$$

$$1827. \int e^{x+e^x} dx :$$

$$1828. \int \frac{\ln x \cos \ln x}{x} dx :$$

$$1829. \int \arccos \sqrt{\frac{x}{x+1}} dx :$$



1830. Գիցուք  $F'(x) = f(x)$  ( $x \in R$ ) : ճշմարիտ է արդյոք, որ

ա) եթե  $f(x)$ -ը պարբերական ֆունկցիա է, ապա  $F(x)$ -ը ևս պարբերական է;

բ) եթե  $f(x)$ -ը կենտ ֆունկցիա է, ապա  $F(x)$ -ը գույզ ֆունկցիա է;

գ) եթե  $f(x)$ -ը գույզ ֆունկցիա է, ապա  $F(x)$ -ը կենտ ֆունկցիա է:

1831. Ապացուցել, որ  $f(x) = \operatorname{sgn} x$  ֆունկցիան  $R$ -ի վրա նախնական չունի:

1832. Բերել խզվող ֆունկցիայի օրինակ, որն  $R$ -ի վրա ունի նախնական:

Գտնել ինտեգրալը (1833-1839).

1833.  $\int |x| dx$  :                      1834.  $\int x|x| dx$  :                      1835.  $\int e^{-|x|} dx$  :

1836.  $\int (|x+1| - |1-x|) dx$  :                      1837.  $\int |shx| dx$  :

1838.  $\int f'(2x) dx$  :                      1839.  $\int x f''(x) dx$  :

1840. Գտնել  $f(x)$ -ը, եթե  $f(0) = 0$  և

ա)  $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$ ;                      բ)  $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1, \\ x, & 1 < x < +\infty \end{cases}$

1841. Գիցուք  $p^2 - 4q < 0$  : Կատարելով համապատասխան ձևափոխություններ՝

$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n} dx$  ( $n \in N$ ) ինտեգրալի հաշվումը բերել

$I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$  ինտեգրալի հաշվմանը և վերջինիս համար ստանալ

աստիճանի իջեցման հետևյալ բանաձևը

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)a^2} \left( \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}} + (2n-3)I_{n-1} \right) :$$

1842. Օգտվելով նախորդ խնդրում ստացված բանաձևից՝ գտնել նախնականը.

ա)  $\int \frac{x^2 dx}{(1+x^2)^2}$ ;                      բ)  $\int \frac{dx}{(4+x^2)^3}$  :

Գտնել ռացիոնալ ֆունկցիայի ինտեգրալը (1843-1851).

$$1843. \int \frac{dx}{x^4 + 1} : \quad 1844. \int \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1} : \quad 1845. \int \frac{dx}{x^6 + 1} :$$

$$1846. \int \frac{dx}{x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1} : \quad 1847. \int \frac{x^4 + 2x^2 + 4}{(x^2 + 1)^3} dx :$$

$$1848. \int \frac{x^4 - 2x^2 + 2}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx : \quad 1849. \int \frac{dx}{x^6 + 2x^4 + x^2} :$$

$$1850. \int \frac{dx}{x^4(x^3 + 1)^2} : \quad 1851. \int \frac{dx}{x^8 + x^4 + 1} :$$

1852. Ապացուցել, որ եթե  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ), ապա

$$\text{ա) } \int \frac{dx}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{y'}{2} + \sqrt{ay} \right| + C, \text{ երբ } a > 0 ;$$

$$\text{բ) } \int \frac{dx}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \left( -\frac{y'}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \right) + C, \text{ երբ } a < 0 :$$

1853. Գիցուք  $P_n(x)$ -ն  $n$ -րդ աստիճանի բազմանդամ է և  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ): Ապացուցել, որ գոյություն ունեն  $(n-1)$ -րդ աստիճանի  $Q_{n-1}(x)$  բազմանդամ և  $\lambda$  թիվ, այնպիսիք, որ

$$\int \frac{P_n(x) dx}{\sqrt{y}} = Q_{n-1}(x) \sqrt{y} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{y}} :$$

Գտնել ինտեգրալը (1854-1860).

$$1854. \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1+x+x^2}} : \quad 1855. \int \frac{1-x+x^2}{\sqrt{1+x-x^2}} dx :$$

$$1856. \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+1}} : \quad 1857. \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2}} :$$

$$1858. \int \frac{dx}{(1-x)^2 \sqrt{1-x^2}} : \quad 1859. \int \frac{dx}{(x+2)^2 \sqrt{x^2+2x-5}} :$$

$$1860. \int \frac{\sqrt{x^2+2x+2}}{x} dx :$$

Կատարելով էլլերյան տեղադրությունները՝

$$1) \sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{ax} + z, \quad a > 0,$$

$$2) \sqrt{ax^2 + bx + c} = xz \pm \sqrt{c}, \quad c > 0,$$

$$3) \sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)} = z(x-x_1),$$

գտնել ինտեգրալը (1861-1866).

$$1861. \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}} :$$

$$1862. \int x\sqrt{x^2 - 2x + 2} dx :$$

$$1863. \int \frac{x + \sqrt{1+x+x^2}}{1+x+\sqrt{1+x+x^2}} dx :$$

$$1864. \int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2+2} dx :$$

$$1865. \int \frac{x^2+x+1}{x\sqrt{x^2-x+1}} dx :$$

$$1866. \int \frac{x^3 dx}{(1+x)\sqrt{1+2x-x^2}} :$$

Գտնել բինոմական դիֆերենցիալի ինտեգրալը (1867-1872).

$\int x^m(a+bx^n)^p dx$  ինտեգրալի հաշվումը, որտեղ  $m, n, p \in \mathcal{Q}$ , բերվում է ուսցիոնալ ֆունկցիայի ինտեգրման միայն հետևյալ երեք դեպքերում (Չեբիշևի թեորեմ). ա) երբ  $p$  -ն ամբողջ է, տեղադրում են  $x = z^k$ , որտեղ  $k$  -ն  $m$  և  $n$  կոտորակների ընդհանուր հայտարարն է; բ) երբ  $\frac{m+1}{n}$  -ն ամբողջ է, տեղադրում են  $a+bx^n = z^k$ , որտեղ  $k$  -ն  $p$  -ի հայտարարն է; գ) երբ  $\frac{m+1}{n} + p$  -ն ամբողջ է, տեղադրում են  $ax^{-n} + b = z^k$ , որտեղ  $k$  -ն  $p$  -ի հայտարարն է:

$$1867. \int \frac{\sqrt{x}}{(1+\sqrt[3]{x})^2} dx :$$

$$1868. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x^3}} :$$

$$1869. \int \frac{x^5 dx}{\sqrt{1-x^2}} :$$

$$1870. \int \sqrt[3]{3x-x^3} dx :$$

$$1871. \int \frac{xdx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}} :$$

$$1872. \int \frac{dx}{x^3 \sqrt[5]{1+\frac{1}{x}}} :$$

Ինտեգրել եռանկյունաչափական արտահայտությունը (1873-1884).

$$1873. \int \frac{dx}{2 \cos^2 x + \frac{1}{2} \sin 2x + \sin^2 x} :$$

$$1874. \int \frac{dx}{\cos 2x - \sin 2x} :$$

$$1875. \int \frac{dx}{2 + 3 \sin 2x - 4 \cos^2 x} :$$

$$1876. \int \frac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} :$$

$$1877. \int \frac{\cos x dx}{\sin^3 x + \cos^3 x} :$$

$$1879. \int \frac{dx}{(1 + \varepsilon \cos x)^2}, 0 < \varepsilon < 1 :$$

$$1881. \int \frac{\sin 2x dx}{\sqrt{1 + \cos^4 x}} :$$

$$1883. \int \frac{3 \sin x + \cos x + 1}{\sin x + 3 \sin^2 x} dx :$$

$$1878. \int \frac{dx}{\sin^6 x + \cos^6 x} :$$

$$1880. \int \frac{\sin 4x dx}{\sin^8 x + \cos^8 x} :$$

$$1882. \int \frac{1 - 2 \sin 2x + 2 \cos^2 x}{\sin x + \cos x} dx :$$

$$1884. \int \frac{ctg^3 x + ctgx}{4 + tg^2 x} dx :$$

Ինտեգրել հիպերբոլական արտահայտությունը (1885-1893).

$$1885. \int \frac{dx}{1 - thx} :$$

$$1886. \int \frac{dx}{4 + 3sh^2 x} :$$

$$1887. \int \frac{ch 2x dx}{sh^4 x + ch^4 x} :$$

$$1888. \int \frac{dx}{2shx - chx} :$$

$$1889. \int \frac{dx}{achx + bshx}, a > 0, a^2 \neq b^2 : 1890. \int \frac{sh 2x dx}{5shx + 3chx} :$$

$$1891. \int \frac{chx + 2shx + 3}{4chx + 5shx + 6} dx :$$

$$1892. \int \sqrt{thx} dx :$$

$$1893. \int \frac{\sqrt[3]{th^2 x}}{ch^4 x} dx :$$

Գտնել ինտեգրալը (1894-1948).

$$1894. \int \frac{dx}{1 + e^x + e^{2x} + e^{3x}} :$$

$$1895. \int \frac{dx}{(e^x - 1)^4} :$$

$$1896. \int \frac{dx}{(e^{x-1} + 1)^2 - (e^{x+1} + 1)^2} :$$

$$1897. \int (x^3 + x)e^{-x^2} dx :$$

$$1898. \int \frac{\sin x dx}{\sqrt{2 + \sin 2x}} :$$

$$1899. \int e^x \ln(1 + e^{-x}) dx :$$

$$1900. \int \frac{\ln(1 - x + x^2)}{x^2} dx :$$

$$1901. \int \frac{(x \ln x)^2}{\sqrt{x}} dx :$$

$$1902. \int \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) dx :$$

$$1903. \int \operatorname{arctg} \frac{1}{x-1} dx :$$

$$1904. \int x^7 \operatorname{arctg} x dx :$$

$$1905. \int x \sqrt{1-x^2} \arccos x dx :$$

$$1906. \int e^{-x} \arcsin e^x dx :$$

$$1908. \int \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} dx :$$

$$1910. \int \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{\sqrt{x^2 + 1}(x^2 + 1)} dx :$$

$$1912. \int \frac{\ln x}{\sqrt{x-1}} dx :$$

$$1914. \int \frac{x \ln|x|}{(1-x^2)\sqrt{x^2-1}} dx :$$

$$1916. \int \frac{dx}{(2 + \sin x)^2} :$$

$$1918. \int \sqrt{th^2 x + 1} dx :$$

$$1920. \int \frac{dx}{\cos^3 x \sqrt{\sin 2x}} :$$

$$1922. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{\sin^5 x \cos x}} :$$

$$1924. \int \frac{5x^7 - 5x^2 - 18x}{x^5 + 3x^2 - 1} dx :$$

$$1926. \int \frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx :$$

$$1928. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(1-x)}} :$$

$$1930. \int \frac{dx}{(1 + \sqrt{x^2 + x})^2} :$$

$$1907. \int e^{\arcsin x} dx :$$

$$1909. \int \frac{\ln x dx}{(\ln x + 1)^2} :$$

$$1911. \int \frac{\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}|}{x^2} dx :$$

$$1913. \int \frac{\ln|x|}{(x+2)^2} dx :$$

$$1915. \int \frac{ax^2 + b}{x^2 - 1} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| dx :$$

$$1917. \int \frac{\sqrt{\sin^3 2x}}{\sin^5 x} dx :$$

$$1919. \int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} e^x dx :$$

$$1921. \int \frac{x \sin x dx}{(1 + \cos x)^2} :$$

$$1923. \int \frac{2x^4 - 2x^3 - x^2 + 2}{2x^3 - 4x^2 + 3x - 1} dx :$$

$$1925. \int \frac{dx}{(x-1)^3 \sqrt{x^2 - 2x - 1}} :$$

$$1927. \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}} :$$

$$1929. \int \frac{dx}{(3 + 5x^3)\sqrt[3]{3 + 4x^3}} :$$

$$1931. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{(2 + x^3)^5}} :$$

1932.  $\int \frac{x \ln|x|}{(1+x^2)^2} dx :$
1933.  $\int \frac{\operatorname{arctge}^{\frac{x}{2}}}{e^{x/2}(1+e^x)} dx :$
1934.  $\int \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}} dx :$
1935.  $\int \frac{x^2 \arccos(x\sqrt{x})}{(1-x^3)^2} dx :$
1936.  $\int \frac{3x^2-1}{x\sqrt{x}} \operatorname{arctg} x dx :$
1937.  $\int \frac{x \sin x}{\sqrt{(4-\sin^2 x)^3}} dx :$
1938.  $\int x^{a-1} \ln^{b-1} x (a \ln x + b) dx :$
1939.  $\int \frac{thx dx}{\sqrt{1-thx}} :$
1940.  $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(1+\sqrt[3]{x})^3}} :$
1941.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[4]{x})^{10}} :$
1942.  $\int \frac{dx}{x^6 \sqrt{x^6+1}} :$
1943.  $\int \frac{xdx}{(x-1)^2 \sqrt{1+2x-x^2}} :$
1944.  $\int \frac{dx}{(1-x^4)\sqrt{1+x^2}} :$
1945.  $\int \frac{11x-13}{(x^2-x+1)\sqrt{x^2+1}} dx :$
1946.  $\int \frac{dx}{(x^2+x+1)\sqrt{x^2+x-1}} :$
1947.  $\int \frac{x^2 dx}{(4-2x+x^2)\sqrt{2+2x-x^2}} :$
1948.  $\int \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{(x+1)^2} dx :$

## Գ

Գ-տնելի ինտեգրալը (1949-1952).

1949.  $\int \max(1, x^2) dx :$
1950.  $\int [x] \sin \pi x dx \quad (x \geq 0) :$
1951.  $\int f(x) dx$ , որտեղ  $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & |x| \leq 1, \\ 1-|x|, & |x| > 1: \end{cases}$

$$1952. \int f(x)dx, \text{ որտեղ } f(x) = \begin{cases} 1, & -\infty < x < 0, \\ x+1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x, & 1 < x < +\infty: \end{cases}$$

1953. Գիցուք  $\varphi(x)$ -ը  $x$  բլի հեռավորությունն է  $x$ -ին ամենամոտ ամբողջ բլից: Գտնել  $\int \varphi(x)dx$ -ը:

1954. Գիցուք  $f(x)$ -ը մոնոտոն և անընդհատ ֆունկցիա է, իսկ  $f^{-1}(x)$ -ը՝ նրա հակադարձ ֆունկցիան: Ապացուցել, որ եթե

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

ապա

$$\int f^{-1}(x)dx = xf^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C:$$

Գիտարկել՝ ա)  $f(x) = x^\alpha$ ,  $\alpha > 0$ ; բ)  $f(x) = e^x$ ; գ)  $f(x) = \arcsin x$  ֆունկցիաները:

1955. Գիցուք  $P(x)$ -ը  $n$ -րդ աստիճանի բազմանդամ է,  $a \neq 0$ : Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \int P(x)e^{ax} dx = \left( P(x) - \frac{P'(x)}{a} + \dots + (-1)^n \frac{P^{(n)}(x)}{a^n} \right) \frac{e^{ax}}{a} + C;$$

$$\text{բ) } \int P(x)\sin ax dx = - \left( P(x) - \frac{P''(x)}{a^2} + \frac{P^{(4)}(x)}{a^4} - \dots \right) \frac{\cos ax}{a} + \left( \frac{P'(x)}{a} - \frac{P^{(3)}(x)}{a^3} + \frac{P^{(5)}(x)}{a^5} - \dots \right) \frac{\sin ax}{a} + C;$$

$$\text{գ) } \int P(x)\cos ax dx = \left( P(x) - \frac{P''(x)}{a^2} + \frac{P^{(4)}(x)}{a^4} - \dots \right) \frac{\sin ax}{a} + \left( \frac{P'(x)}{a} - \frac{P^{(3)}(x)}{a^3} + \frac{P^{(5)}(x)}{a^5} - \dots \right) \frac{\cos ax}{a} + C:$$

Ինտեգրալի համար ստանալ աստիճանի իջեցման բանաձև ( $n \in \mathbb{N}$ ) (1956-1963).

$$1956. I_n = \int x^n e^{ax} dx \quad (a \neq 0):$$

$$1957. I_n = \int x^\alpha \ln^n x dx \quad (\alpha \neq -1):$$

$$1958. I_n = \int \frac{x^n dx}{\sqrt{x^2 + a}}:$$

$$1959. I_n = \int \sin^n x dx:$$

$$1960. I_n = \int ch^n x dx :$$

$$1961. I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x} :$$

$$1962. I_n = \int \frac{dx}{ch^n x} :$$

$$1963. I_n = \int tg^n x dx :$$

Ապացուցել անդրադարձ բանաձևը ( $m, n \in N, m > 1, n > 1$ ) (1964-1967).

1964.  $a \neq 0$  դեպքում

$$I_n = \int \frac{x^n dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{1}{na} \left( x^{n-1} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{b}{2} (2n-1) I_{n-1} - c(n-1) I_{n-2} \right) :$$

$$1965. I_{n,m} = \int \sin^n x \cos^m x dx :$$

$$\text{ա) } I_{n,m} = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{n+m} + \frac{n-1}{n+m} I_{n-2,m} ;$$

$$\text{բ) } I_{n,m} = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{n+m} + \frac{m-1}{n+m} I_{n,m-2} :$$

$$1966. I_n = \int \frac{dx}{(a \cos x + b \sin x)^n}, \quad a^2 + b^2 \neq 0 :$$

$$I_n = \frac{1}{(n-1)(a^2 + b^2)} \left[ \frac{a \sin x - b \cos x}{(a \cos x + b \sin x)^{n-1}} + (n-2) I_{n-2} \right] :$$

$$\text{Գտնել } \int \frac{dx}{(2 \cos x + \sin x)^3} - \text{ը} :$$

$$1967. I_n = \int \left( \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} \right)^n dx, \quad n \in N :$$

$$I_n = \frac{2 \sin a}{n-1} \left( \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} \right)^{n-1} + 2 I_{n-1} \cos a - I_{n-2} :$$

$$1968. \text{Գտնել } \int \frac{\left( \cos \frac{x+a}{2} \right)^{n-1}}{\left( \sin \frac{x-a}{2} \right)^{n+1}} dx - \text{ը} \quad (\cos a \neq 0) :$$

1969. Ապացուցել, որ

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c} dx = Ax + B \ln |a \sin x + b \cos x + c| +$$



$$+ C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x + c} \quad (a^2 + b^2 \neq 0):$$

Գտնել  $A, B, C$  գործակիցները:

Գտնել ինտեգրալը (1970-1971).

$$1970. \int \frac{2 \sin x + \cos x}{3 \sin x + 4 \cos x - 2} dx : \quad 1971. \int \frac{\sin x}{\sqrt{2} + \sin x + \cos x} dx :$$

1972. Ապացուցել, որ

$$\int \frac{a_1 \sin^2 x + 2b_1 \sin x \cos x + c_1 \cos^2 x}{a \sin x + b \cos x} dx = A \sin x + B \cos x +$$

$$+ C \int \frac{dx}{a \sin x + b \cos x}, \quad a^2 + b^2 \neq 0:$$

Գտնել  $A, B, C$  գործակիցները:

Գտնել ինտեգրալը (1973-1974).

$$1973. \int \frac{\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x}{\sin x + \cos x} dx :$$

$$1974. \int \frac{\sin^2 x - \sin x \cos x + 2 \cos^2 x}{\sin x + 2 \cos x} dx :$$

1975. Դիցուք  $(a-c)^2 + b^2 \neq 0$ : Ընտրել  $A$  և  $B$  հաստատուններն այնպես, որ տեղի ունենա

$$\int \frac{a_1 \cos x + b_1 \sin x}{a \cos^2 x + 2b \sin x \cos x + c \sin^2 x} dx = A \int \frac{du_1}{k_1 u_1^2 + \lambda_1} + B \int \frac{du_2}{k_2 u_2^2 + \lambda_2}$$

հավասարությունը, որտեղ  $\lambda_1, \lambda_2$ -ը  $(\lambda - a)(\lambda - c) = b^2$  հավասարման արմատներն են ( $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ),  $u_i = (a - \lambda_i) \sin x + b \cos x$  և  $k_i = \frac{1}{c - \lambda_i}$ ,  $i = 1, 2$ :

Գտնել ինտեգրալը (1976-1977).

$$1976. \int \frac{(\sin x + \cos x) dx}{2 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x} :$$

$$1977. \int \frac{\sin x - 2 \cos x}{1 + 4 \sin x \cos x} dx :$$

1978. Դիցուք

$$I_n = \int \frac{dx}{(a \cos x + c)^n}, \quad (|a| \neq |c|, n \in \mathbb{N}):$$

Ստանալ հետևյալ անդրադարձ բանաձևը.

$$I_n = \frac{1}{(n-1)(a^2 - c^2)} \left[ \frac{a \sin x}{(a \cos x + c)^{n-1}} - (2n-3)cI_{n-1} + (n-2)I_{n-2} \right]:$$

1979. Գտնել ինտեգրալը՝  $\int \frac{dx}{(1 + \varepsilon \cos x)^3}$ ,  $\varepsilon > 1$ :

1980. Տրված է՝  $I_m = \int x^m (ax^n + b)^p dx$  ( $m, n \in N, m > n$ ): Ապացուցել, որ  $I_m$ -ը բավարարում է հետևյալ անդրադարձ հավասարմանը.

$$a(m+1+np)I_m = x^{m+1-n}(ax^n + b)^{p+1} - b(m+1-n)I_{m-n}:$$

Գտնել ինտեգրալը (1981-2007).

1981.  $\int \frac{dx}{x^7 \sqrt{1+x^4}}$ :

1982.  $\int \frac{(a + \cos x)dx}{1 + 2a \cos x + a^2}$ :

1983.  $\int \frac{dx}{a + tg^2 x}$ :

1984.  $\int \frac{dx}{(a \cos x + b \sin x)^2}$  ( $a^2 + b^2 \neq 0$ ):

1985.  $\int \frac{dx}{[a \cos x + (ax+b) \sin x]^2}$  ( $ab \neq 0$ ):

1986.  $\int \left( \frac{\sin 2x}{\sin^3 x + \cos^3 x} \right)^2 dx$ :

1987.  $\int \frac{\operatorname{arctg} x dx}{(ax^2 + b)\sqrt{ax^2 + b}}$  ( $a \neq 0$ ):

1988.  $\int \frac{dx}{[x^2 + (a+b)x + ab]^2}$  ( $a \neq b$ ):

1989.  $\int \frac{dx}{x^4 + (a^2 + b^2)x^2 + a^2 b^2}$  ( $ab \neq 0$ ):

1990.  $\int \left( \frac{x+a}{x+b} \right)^n dx$  ( $n \in N$ ):

1991.  $\int \frac{a_1 chx + b_1 shx}{achx + bshx} dx$  ( $a^2 + b^2 \neq 0$ ):

1992.  $\int \frac{dx}{3chx + 5shx + 3}$ :

1993.  $\int \frac{2shx + chx}{(3shx + 4chx)^2} dx$ :

$$1994. \int \frac{sh2x - 2shx}{sh^6 \frac{x}{2} - sh^3 x} dx : \quad 1995. \int \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx :$$

$$1996. \int \frac{a_1 \cos x + b_1 \sin x}{(a \cos x + b \sin x)^2} dx \quad (a^2 + b^2 \neq 0):$$

$$1997. \int \frac{\cos^2 x}{(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)^2} dx, \quad a^2 + b^2 \neq 0:$$

$$1998. \int \frac{dx}{\sqrt[4]{\sin^3 x \cos^5 x}} : \quad 1999. \int \frac{dx}{x^{2n} - a^{2n}} \quad (n \in N, a > 0):$$

$$2000. \int \frac{dx}{(x^2 - a^2) \sqrt{b^2 - x^2}} \quad (ab \neq 0): \quad 2001. \int \frac{dx}{x \sqrt{x^n + a}} \quad (a \neq 0, n \in N):$$

$$2002. \int \frac{dx}{\sqrt[n]{(x-a)^{n+1}(x-b)^{n-1}}} \quad (n \in N):$$

$$2003. \int \frac{\ln x}{\sqrt{x+a}} dx : \quad 2004. \int \frac{\ln|x + \sqrt{x^2 + a}|}{x^2} dx :$$

$$2005. \int \left( \frac{x}{(ax-b)\sin x + (a+bx)\cos x} \right)^2 dx \quad (a^2 + b^2 \neq 0):$$

$$2006. \int \frac{x \arcsin x}{(1+ax^2)^2} dx : \quad 2007. \int \frac{2 \sin x - \sin 2x}{\sin^3 x + (1 - \cos x)^3} dx :$$

Գտնել ֆունկցիայի ընդհանրացված նախնականը (2008-2011).

$$2008. y = \operatorname{sgn}(x-a): \quad 2009. y = [x]:$$

$$2010. y = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0: \end{cases} \quad 2011. y = \begin{cases} \ln x, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0: \end{cases}$$

2012. Ապացուցել, որ Ռ-իմանի ֆունկցիան ոչ մի միջակայքում նախնական չունի:

## Գլուխ 8

### Ռ-իմանի ինտեգրալ, անհսկական ինտեգրալներ

Տրված  $[a; b]$  ( $a < b$ ) հատվածի համար կետերի  $P = (x_0, x_1, \dots, x_n)$  շարվածքը կոչվում է այդ հատվածի տրոհում, եթե  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ : Գրան համապատասխան  $\Delta_i = [x_i, x_{i+1}]$  հատվածները կոչվում են տրոհման հատվածներ, իսկ  $\lambda(P) = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta x_i$ -ն, որտեղ

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i, \text{ տրոհման տրամագիծ:}$$

Գիցուք  $f$ -ն  $[a; b]$  հատվածի վրա որոշված ֆունկցիա է: Այդ հատվածի ցանկացած  $P$  տրոհման և ցանկացած  $\xi_i \in \Delta_i$  ( $i = 0, 1, \dots, n-1$ ) կետերի համար կազմենք

$$\sigma_f(P, \xi) = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i) \Delta x_i$$

գումարը: Այն կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի  $[a; b]$  հատվածի  $P$  տրոհմանը և  $\xi_i$  կետերին համապատասխանող ինտեգրալային գումար:

Ս ա հ մ ն ու մ :  $I$  թիվը կոչվում է  $f$  ֆունկցիայի որոշյալ ինտեգրալ (Ռ-իմանի ինտեգրալ)  $[a; b]$  հատվածում, եթե ցանկացած  $\varepsilon > 0$  թվի համար գոյություն ունի  $\delta > 0$  թիվ, այնպիսին, որ  $[a; b]$  հատվածի ցանկացած  $P$  տրոհման և դրան համապատասխան  $\xi_i$  կետերի կամայական ընտրության դեպքում՝

$$\lambda(P) < \delta \Rightarrow |\sigma_f(P, \xi) - I| < \varepsilon:$$

Եթե այդպիսի  $I$  թիվը գոյություն ունի, ապա  $f$ -ը կոչվում է  $[a; b]$  հատվածում ինտեգրելի (Ռ-իմանի իմաստով ինտեգրելի) և նշանակվում է՝

$$I = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma_f(P, \xi) = \int_a^b f(x) dx:$$

Տրված  $[a; b]$  հատվածի վրա Ռ-իմանի իմաստով ինտեգրելի ֆունկցիաների բազմությունը նշանակվում է  $\mathfrak{R}[a; b]$ -ով:

Ի ն տ ե գ ռ ե լ ի ո թ յ ա ն ա ն հ ի ր ա ժ ե շ տ ա կ ա յ մ ա ն ը : Ռ-իմանի իմաստով ինտեգրելի ֆունկցիան սահմանափակ է:

Ի ն տ ե գ ռ ե լ ի ո թ յ ա ն ա ն հ ի ր ա ժ ե շ տ ն ք վ ա ռ ա ղ ա կ ա յ մ ա ն ը : Գիցուք  $f: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան սահմանափակ է:  $[a; b]$  հատվածի  $P$  տրոհման համար նշանակենք՝

$$m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad \Omega_i = M_i - m_i \quad (i = 0, 1, \dots, n-1):$$

Ռրպեսզի  $f$ -ը լինի Ռ-իմանի իմաստով ինտեգրելի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ կամայական  $\varepsilon > 0$  թվի համար գոյություն ունենա  $\delta > 0$  թիվ, այնպիսին, որ  $[a; b]$  հատվածի ցանկացած  $P$  տրոհման համար

$$\lambda(P) < \delta \Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} \Omega_i \Delta x_i < \varepsilon :$$

Հետևյալ գումարները կոչվում են *Գարբուի համապատասխանաբար ստորին* և *վերին գումարներ*.

$$L_f(P) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i, \quad U_f(P) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i :$$

Այս նշանակումներով ինտեգրելիության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը կարող է գրվել նաև հետևյալ կերպ.  $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (U_f(P) - L_f(P)) = 0 :$

Ցանկացած  $f : [a; b] \rightarrow R$  սահմանափակ ֆունկցիայի համար գոյություն ունեն

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} L_f(P) = L \int_a^b f(x) dx \quad \text{և} \quad \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} U_f(P) = U \int_a^b f(x) dx$$

վերջավոր սահմանները, որոնք կոչվում են  $[a; b]$  հատվածում  $f$  ֆունկցիայի համապատասխանաբար *ստորին* և *վերին* ինտեգրալներ: Դրանց հավասարությունը անհրաժեշտ և բավարար է, որպեսզի  $f$ -ն  $[a; b]$ -ում լինի ինտեգրելի:

Ի ն տ ե գ ր ե լ ի ֆ ու ն կ ց ի ա ն ե ր ի ղ ա ս ե ր : Եթե  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան անընդհատ է, ապա այն  $[a; b]$ -ում ինտեգրելի է.  $C[a; b] \subset \mathfrak{R}[a; b]$  :

Եթե  $f$ -ն  $[a; b]$  հատվածում սահմանափակ է և ունի միայն վերջավոր թվով խզումներ, ապա այն  $[a; b]$ -ում ինտեգրելի է:

Եթե  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է, ապա այն ինտեգրելի է:

$\mathfrak{R}[a; b]$  դ ա ս ի կ ա ն ո ւ ց վ ա ծ ք ր : Ցանկացած  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$  ֆունկցիաների համար՝

ա)  $\alpha f + \beta g \in \mathfrak{R}[a; b]$  ( $\alpha, \beta \in R$ ), ընդ որում՝

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx \quad (\text{ինտեգրալի գծայնություն}):$$

բ)  $|f| \in \mathfrak{R}[a; b]$ ;

գ)  $f \cdot g \in \mathfrak{R}[a; b]$ ;

դ) եթե  $[c; d] \subset [a; b]$  ( $c < d$ ), ապա  $f$ -ը  $[c; d]$  հատվածի վրա ինտեգրելի է:

Եթե  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ , ապա ընդունված է գրել.  $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ ,  $\int_a^a f(x) dx = 0$  :

Ի ն տ ե գ ր ա լ ի ա ղ ի տ ի վ ու թ յ ու ն ր : Եթե  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ , ապա ցանկացած  $\alpha, \beta, \gamma \in [a; b]$  կետերի համար ճշմարիտ է

$$\int_a^\beta f(x) dx + \int_\beta^\gamma f(x) dx = \int_a^\gamma f(x) dx$$

հավասարությունը:

Ի ն տ ե գ ր ա լ ի մ ն ն տ ն ու թ յ ու ն ր : Դիցուք՝  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Եթե  $a \leq b$  և  $f(x) \leq g(x)$  ( $a \leq x \leq b$ ), ապա

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx :$$

Միջին արժեքի անոթի պետություն: Եթե  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ ,  $m = \inf_{x \in [a; b]} f(x)$  և

$M = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$ , ապա գոյություն ունի  $\mu \in [m; M]$  թիվ, այնպիսին, որ

$$\int_a^b f(x)dx = \mu(b-a) :$$

Մասնավորապես, եթե  $f \in C[a; b]$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in [a; b]$  կետ, այնպիսին, որ

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) :$$

Միջին արժեքի ընդհանրացված պետություն: Եթե  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$ ,  $g(x) \geq 0$ ,

$m = \inf_{x \in [a; b]} f(x)$  և  $M = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$ , ապա գոյություն ունի  $\mu \in [m; M]$  թիվ, այնպիսին, որ

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx :$$

Միջին արժեքի երկրորդ պետություն (Բոնեի բանաձևը): Եթե  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$  և  $g$ -ն  $[a; b]$ -ի վրա մոնոտոն է, ապա գոյություն ունի  $\xi \in [a; b]$  կետ, այնպիսին, որ

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x)dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x)dx :$$

Ինտեգրալը որպես սահմանափակ վերին սահմանի ֆունկցիա: Դիտարկենք՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ :

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \quad (a \leq x \leq b)$$

ֆունկցիան կոչվում է փոփոխական վերին սահմանով ինտեգրալ:

Ճշմարիտ են հետևյալ պնդումները.

ա)  $F \in C[a; b]$ ;

բ) եթե  $f$ -ն  $x_0 \in [a; b]$  կետում անընդհատ է, ապա  $F$ -ն այդ կետում դիֆերենցելի է և  $F'(x_0) = f(x_0)$ : Մասնավորապես, եթե  $f \in C[a; b]$ , ապա  $F$ -ն  $f$ -ի նախնականն է:

Նյութ ու ունեւորությունիցի: Դիտարկենք՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ ,  $f$ -ն  $[a; b]$ -ում ունի ոչ ավելի, քան վերջավոր թվով խզումներ և  $F: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան  $f$ -ի (ընդհանրացված) նախնականն է: Ճշմարիտ է հետևյալ բանաձևը.

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) :$$

Մասնավորապես, եթե  $u(x)$  և  $v(x)$  ֆունկցիաներն  $[a; b]$  հատվածում անընդհատ դիֆերենցելի են, ապա՝

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = (u(x)v(x))\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx :$$

Փոփոխականների փոխարինում: Եթե  $\varphi: [\alpha; \beta] \rightarrow [a; b]$  ֆունկցիան անընդհատ դիֆերենցելի է,  $\varphi(\alpha) = a$  և  $\varphi(\beta) = b$ , ապա ցանկացած  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիայի համար  $f(\varphi(t))\varphi'(t)$  ֆունկցիան  $[\alpha; \beta]$  միջակայքում ինտեգրելի է, ընդ որում՝

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt :$$

Անփոփոխական ինտեգրալներ: Դիցուք  $f: [a, \omega) \rightarrow R$  ( $\omega \in R$  կամ  $\omega = +\infty$ ) ֆունկցիան ցանկացած  $[a; b]$  ( $a < b < \omega$ ) միջակայքում Ռիմանի իմաստով ինտեգրելի է:

Սահմանում:  $\int_a^\omega f(x)dx$  սիմվոլն անվանում են  $[a; \omega)$  միջակայքում  $f$  ֆունկցիայի

*անիսկական ինտեգրալ*: Եթե գոյություն ունի  $\lim_{b \rightarrow \omega} \int_a^b f(x)dx$  սահմանը, ապա այն ընդունում են որ-

պես  $\int_a^\omega f(x)dx$  -ի արժեք և եթե այդ սահմանը վերջավոր է, ապա անիսկական ինտեգրալն

անվանում են *գումամետ*: Իսկ եթե նշված սահմանը գոյություն չունի կամ անվերջ է, ապա անիսկական ինտեգրալն անվանում են *տարամետ*:  $\omega$  -ն անվանում են անիսկական ինտեգրալի կամ ընդիմտեգրալ ֆունկցիայի *եզակիտություն*:

Համանմանորեն սահմանվում է  $\int_{\omega_1}^b f(x)dx$  անիսկական ինտեգրալը, որտեղ  $\omega_1 \in R$  կամ

$\omega_1 = -\infty$ : Եթե  $f: (\omega_1; \omega) \rightarrow R$  ֆունկցիան ցանկացած  $[a; b] \subset (\omega_1; \omega)$  հատվածում Ռիմանի

իմաստով ինտեգրելի է, ապա սահմանվում է նաև  $\int_{\omega_1}^\omega f(x)dx$  անիսկական ինտեգրալը, որը

համարվում է գումամետ միայն այն դեպքում, երբ որևէ  $c \in (\omega_1; \omega)$  թվի համար  $\int_{\omega_1}^c f(x)dx$  և

$\int_c^\omega f(x)dx$  անիսկական ինտեգրալները միաժամանակ գումամետ են: Ընդամենը ընդունվում է՝

$$\int_{\omega_1}^\omega f(x)dx = \int_{\omega_1}^c f(x)dx + \int_c^\omega f(x)dx :$$

Եթե գոյություն ունի  $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^b f(x) dx$  վերջավոր սահմանը, ապա այն անվանում են *անխու-*

*կական ինտեգրալի գլխավոր արժեք* և նշանակում՝ *v.p.*  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$  :

Համանմանորեն, տրված  $\int_a^\omega f(x) dx$  և  $\int_\omega^b f(x) dx$  ( $a < \omega < b$ ) անիսկական ինտեգրալների

գումարը նույնպես անվանում են անիսկական ինտեգրալ և նշանակում՝  $\int_a^b f(x) dx$  : Այս գումարն էլ

համարվում է զուգամետ միայն այն դեպքում, երբ գումարելիներից յուրաքանչյուրը զուգամետ է :

Եթե գոյություն ունի  $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left( \int_a^{\omega-\varepsilon} f(x) dx + \int_{\omega+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$  վերջավոր սահմանը, ապա այն ընդունում են

որպես *ինտեգրալի գլխավոր արժեք* և նշանակում՝ *v.p.*  $\int_a^b f(x) dx$  :

Անիսկական ինտեգրալի սահմանումն ադիտիվության սկզբունքով ընդհանրացվում է վերջավոր թվով եզակիություններ ունեցող ֆունկցիաների համար :

Գծայնության, ադիտիվության և մոնոտոնության հատկությունները զուգամետ անիսկական ինտեգրալների համար նույնությամբ պահպանվում են :

Մ ա ս ե ռ ո վ ի ն տ ե գ ը մ ան ք ա ն ձ և ը ա ն ի ս կ ա կ ան ի ն տ ե գ ը ա լ ն ե թ ի հ ա մ ա ռ : Գիցուք  $u, v \in C^1[a; \omega)$  : Եթե գոյություն ունի  $\lim_{x \rightarrow \omega-0} u(x)v(x)$  վերջավոր սահմանը,

ապա  $\int_a^\omega u(x)v'(x) dx$  և  $\int_a^\omega u'(x)v(x) dx$  անիսկական ինտեգրալները միաժամանակ զուգամետ են

կամ միաժամանակ տարամետ, ընդ որում առաջին դեպքում՝

$$\int_a^\omega u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^\omega - \int_a^\omega u'(x)v(x) dx,$$

որտեղ

$$u(x)v(x) \Big|_a^\omega = \lim_{x \rightarrow \omega} u(x)v(x) - u(a)v(a) :$$

Ա ն ի ս կ ա կ ան ի ն տ ե գ ը ա լ ի զ ո գ ա մ ի տ ո թ յ ա ն հ ա յ տ ա ն ի շ ն ե թ ը : Գիցուք  $f : [a; \omega) \rightarrow R$  ֆունկցիան կամայական  $[a; b] \subset [a; \omega)$  հատվածում Ռիմանի իմաստով ինտեգրելի է :

Կ ո շ ի ի ս կ գ ը ո ն ը ը : Որպեսզի  $\int_a^\omega f(x) dx$  անիսկական ինտեգրալը լինի զուգամետ,

անհրաժեշտ է և բավարար, որ կամայական  $\varepsilon > 0$  թվի համար գոյություն ունենա այնպիսի



$\Delta \in [a; \omega)$  թիվ, որ ցանկացած  $b_1, b_2 \in [\Delta, \omega)$  կետերի համար տեղի ունենա  $\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$

անհավասարությունը:

Ս ա հ մ ա ն ու մ :  $\int_a^\omega f(x) dx$  անիսկական ինտեգրալը կոչվում է *բացարձակ զուգամետ*, եթե

զուգամետ է  $\int_a^\omega |f(x)| dx$  ինտեգրալը: Բացարձակ զուգամետ անիսկական ինտեգրալը զուգամետ է:

Եթե անիսկական ինտեգրալը զուգամետ է, բայց ոչ բացարձակ, ապա ասում են, որ այն *պայմանական զուգամետ* է:

Բ ա դ դ ա տ մ ա ն ա ն ա ջ ջ ի ն հ ա յ տ ա ն ի շ : Դիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները որոշված են  $[a; \omega)$  միջակայքում և ցանկացած  $[a; b] \subset [a; \omega)$  հատվածում ինտեգրելի են: Եթե

$|f(x)| \leq g(x)$  ( $a \leq x < \omega$ ) և  $\int_a^\omega g(x) dx$  -ը զուգամետ է, ապա  $\int_a^\omega f(x) dx$  -ը բացարձակ զուգամետ է:

Բ ա դ դ ա տ մ ա ն երկրորդ հայտանիշ : Եթե  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները  $[a; \omega)$  միջակայքում ոչ բացասական են և գոյություն ունեն  $c_1, c_2$  դրական հաստատուններ, այնպիսիք, որ

$c_1 f(x) \leq g(x) \leq c_2 f(x)$ , ապա  $\int_a^\omega f(x) dx$  և  $\int_a^\omega g(x) dx$  անիսկական ինտեգրալները միաժամանակ

զուգամետ են կամ միաժամանակ տարամետ:

Ա բ է լ ի հ ա յ տ ա ն ի շ ը : Եթե  $\int_a^\omega f(x) dx$  անիսկական ինտեգրալը զուգամետ է, իսկ

$g: [a; \omega) \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է և սահմանափակ, ապա  $\int_a^\omega f(x)g(x) dx$  -ը զուգամետ է:

Դ ի ը ի խ լ ե ի հ ա յ տ ա ն ի շ ը : Եթե  $F(z) = \int_a^z f(x) dx$  ֆունկցիան  $[a; \omega)$  միջակայքում

սահմանափակ է, իսկ  $g: [a; \omega) \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն ձգտում է զրոյի, երբ  $x \rightarrow \omega - 0$ , ապա

$\int_a^\omega f(x)g(x) dx$  ինտեգրալը զուգամետ է:

## Ա

Տրոհելով տրված հատվածն  $n$  հավասար մասերի և տրոհման յուրաքանչյուր հատվածում որպես  $\xi_i$  կետ ընտրելով հատվածի միջնակետը՝ կազմել ֆունկցիայի ինտեգրալային գումարը և հաշվել այն (2013-2016).

2013.  $y = 1 + x, x \in [-1; 4]$ :

2014.  $y = 3x^2 + 3x, x \in [0; 4]$ :

2015.  $y = \sin x, x \in [0; \pi]$ :

2016.  $y = \chi(x)$  (Գիրիխլեի ֆունկցիան է) ա)  $x \in [-3; 7]$ ; բ)  $x \in [-\sqrt{2}; 1 - \sqrt{2}]$ :

Տրոհելով տրված հատվածն  $n$  հավասար մասերի՝ գտնել Դարբուի ստորին և վերին գումարները (2017-2020).

2017.  $f(x) = 2x - 1, x \in [-2; 5]$ :

2018.  $f(x) = 2^x, x \in [0; 10]$ :

2019.  $f(x) = \cos x, x \in [0; \pi/2]$ :

2020.  $f(x) = \chi(x), x \in [a; b]$ :

Ընդունելով ինտեգրալի գոյությունը՝ հաշվել այն՝ որպես հարմար ձևով կազմված ինտեգրալային գումարների սահման (2021-2026).

2021.  $\int_{-1}^2 x^2 dx$ :

2022.  $\int_0^{\pi} \sin x dx$ :

2023.  $\int_0^1 a^x dx \quad (a > 0)$ :

2024.  $\int_0^{\pi/2} \cos t dt$ :

2025.  $\int_a^b \frac{dx}{x^2} \quad (0 < a < b)$ :

2026.  $\int_a^b \frac{dx}{x} \quad (0 < a < b)$ :

Ցուցում: Վերջին երկուսում տրոհման կետերն ընտրել այնպես, որ դրանք կազմեն երկրաչափական պրոգրեսիա:

2027. Ելնելով ինտեգրալի սահմանումից՝ համոզվել, որ  $[a; b]$  հատվածի վրա որոշված  $y = C$  հաստատուն ֆունկցիան ինտեգրելի է և գտնել նրա ինտեգրալը:

2028. Ցանկացած հատվածում հաշվել Գիրիխլեի ֆունկցիայի Դարբուի ստորին և վերին ինտեգրալները և համոզվել, որ այդ ֆունկցիան ոչ մի հատվածում ինտեգրելի չէ:

2029. Դիցուք  $f$ -ն  $[a; b]$  ( $a < b$ ) հատվածում ինտեգրելի է: Ապացուցել, որ  $|f|$  ֆունկցիան այդ նույն հատվածում նույնպես ինտեգրելի է, ընդ որում՝

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx :$$

2030. Տրված է  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ճշմարիտ է արդյոք, որ եթե  $|f|$ -ն  $[a; b]$ -ում ինտեգրելի է, ապա  $f$ -ը նույնպես ինտեգրելի է:

Օգտվելով Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևից՝ հաշվել ինտեգրալը (2031-2040).

$$2031. \int_{-1}^8 \sqrt[3]{x} dx :$$

$$2032. \int_0^{\pi} \cos^2 2x dx :$$

$$2033. \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} :$$

$$2034. \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} :$$

$$2035. \int_{sh1}^{sh2} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} :$$

$$2036. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - 2x \cos \alpha + 1} \quad (0 < \alpha < \pi) :$$

$$2037. \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (ab \neq 0) :$$

$$2038. \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^6} dx :$$

$$2039. \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} :$$

$$2040. \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx :$$

Հաջորդականության անդամները ներկայացնելով որպես որոշակի ֆունկցիայի ինտեգրալային գումարներ՝ գտնել հաջորդականության սահմանը (2041-2047).

$$2041. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} :$$

$$2042. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) :$$

$$2043. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} :$$

$$2044. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right) :$$

$$2045. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \dots + \frac{n}{2n^2} \right) :$$

$$2046. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p > 0) :$$

$$2047. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - k^2}} :$$

2048. Դիցուք՝  $f \in C[a; b]$ ,  $\varphi: [\alpha; \beta] \rightarrow [a; b]$  և  $\psi: [\alpha; \beta] \rightarrow [a; b]$  ֆունկցիաները դիֆերենցելի են: Ապացուցել փոփոխական վերին սահմաններով ինտեգրալի ածանցման հետևյալ կանոնը.

$$\frac{d}{dt} \int_{\varphi(t)}^{\psi(t)} f(x) dx = f(\psi(t))\psi'(t) - f(\varphi(t))\varphi'(t):$$

Գտնել ածանցյալը (2049-2054).

$$2049. \frac{d}{dx} \int_a^b \sin x^2 dx :$$

$$2050. \frac{d}{da} \int_a^b \sin x^2 dx :$$

$$2051. \frac{d}{dt} \int_0^{t^2} \sqrt{1+x^2} dx :$$

$$2052. \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} :$$

$$2053. \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi x^2) dx :$$

$$2054. \frac{d}{dx} \int_0^{x^4} e^{x^2} dx :$$

Օգտվելով Լոպիտալի կանոնից՝ գտնել սահմանը (2055-2058).

$$2055. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos x^2 dx}{x^2 + x} :$$

$$2056. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctg x)^2 dx}{\sqrt{x^2 + 1}} :$$

$$2057. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left( \int_0^x e^{u^2} du \right)^2}{\int_0^x e^{2u^2} du} :$$

$$2058. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \ln(1+t) dt}{\int_{x^2}^x \frac{\sin t}{t} dt} :$$

2059. Հաշվել ինտեգրալը.

$$\text{ա) } \int_0^2 f(x) dx, \text{ որտեղ } f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2; \end{cases}$$

$$\text{բ) } \int_0^1 f(x) dx, \text{ որտեղ } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq t, \\ t \frac{1-x}{1-t}, & t < x \leq 1: \end{cases}$$

Կատարելով մասերով ինտեգրում՝ հաշվել ինտեգրալը (2060-2067).

$$2060. \int_0^{\ln 2} x e^{-x} dx :$$

$$2061. \int_0^{\pi} x \sin x dx :$$

$$2062. \int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx :$$

$$2063. \int_0^1 \arccos x dx :$$

$$2064. \int_0^{\sqrt{3}} x \arctg x dx :$$

$$2065. \int_0^{\pi/2} e^{2x} \cos x dx :$$

$$2066. \int_1^2 x \ln x dx :$$

$$2067. \int_{1/e}^e |\ln x| dx :$$

Կատարելով փոփոխականի փոխարինում՝ հաշվել ինտեգրալը (2068-2073).

$$2068. \int_{-1}^1 \frac{xdx}{\sqrt{5-4x}} :$$

$$2069. \int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} :$$

$$2070. \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{2-x}} dx :$$

$$2071. \int_e^{e^2} \frac{\ln x dx}{x\sqrt{1+\ln x}} :$$

$$2072. \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} :$$

$$2073. \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}} :$$

2074. Հետևյալ ինտեգրալներում փոփոխականի նշված  $x = \varphi(t)$  փոխարինումը բերում է սխալ արդյունքի: Պարզել պատճառը:

$$\text{ա) } \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}, \quad x = \frac{1}{t}; \quad \text{բ) } \int_{-1}^1 (1+x^2) dx, \quad x = ctgt \left( -\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{4} \right):$$

2075. Կարելի՞ է արդյոք  $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$  ինտեգրալում  $x = \sin t$  տեղադրում կատարելիս որպես  $t$ -ի փոփոխման սահմաններ վերցնել  $\pi$ -ն և  $\frac{\pi}{2}$ -ը:

2076. Ապացուցել, որ ցանկացած  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$  ֆունկցիայի համար

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f(a+(b-a)x) dx :$$

2077. Ապացուցել հավասարությունը.

$$\int_0^a x^3 f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} x f(x) dx \quad (f \in \mathfrak{R}[0; a^2], a > 0):$$

2078. Ստուգել, որ եթե  $f \in \mathfrak{R}[-l; l]$  ֆունկցիան

ա) գույզ է, ապա  $\int_{-l}^l f(x) dx = 2 \int_0^l f(x) dx$ ;

բ) կենս է, ապա  $\int_{-l}^l f(x) dx = 0$ :

Գտնել ինտեգրալը (2079-2086).

2079.  $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$  :

2080.  $\int_0^1 \frac{x+3}{(x+1)^2} dx$  :

2081.  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}}$  :

2082.  $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \operatorname{tg} x dx$  :

2083.  $\int_0^{\pi/2} \sin x \sin 2x \sin 3x dx$  :

2084.  $\int_0^{\ln 2} sh^4 x dx$  :

2085.  $\int_0^{\pi} e^x \cos^2 x dx$  :

2086.  $\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx$  :

2087. Օգտագործելով ադիտիվության և մոնոտոնության հատկությունները՝ պարզել, թե հետևյալ ինտեգրալներից ո՞րն է դրական և ո՞րը բացասական.

ա)  $\int_{1/2}^1 x^2 \ln x dx$ ;

բ)  $\int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ ;

գ)  $\int_{-2}^2 x^3 2^x dx$ ;

դ)  $\int_0^{2\pi} x \sin x dx$ ;

2088. Տրված երկու ինտեգրալներից ո՞րն է մեծ.

ա)  $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$ ,  $I_2 = \int_0^{\pi/2} x^2 dx$ ;

բ)  $I_1 = \int_0^1 e^{-x} dx$ ,  $I_2 = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ ;

$$q) I_1 = \int_0^{\pi} e^{-x^2} \cos^2 x dx, \quad I_2 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{-x^2} \cos^2 x dx :$$

2089. Գիցուք  $f \in C[0;+\infty)$ : Համաձայն միջին արժեքի առաջին թեորեմի՝

$$\int_0^x f(t)dt = x \cdot f(\xi(x)) \quad (0 < \xi(x) < x) :$$

Գտնել  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\xi(x)}{x}$  և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\xi(x)}{x}$  սահմանները, եթե

$$u) f(t) = t^\alpha \quad (\alpha > 0); \quad \text{բ) } f(t) = e^t :$$

2090. Գնահատել հետևյալ ինտեգրալները.

$$u) I = \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x}} dx; \quad \text{բ) } I = \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx :$$

Օգտվելով միջին արժեքի երկրորդ թեորեմից՝ գնահատել ինտեգրալը (2091-2092).

$$2091. I = \int_{100\pi}^{200\pi} \frac{\sin x}{x} dx :$$

$$2092. I = \int_a^b e^{-x} \frac{\sin x}{x} dx \quad (0 < a < b) :$$

\*\*\*

Հաշվել անիսկական ինտեգրալը (2093-2099).

$$2093. \text{ u) } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2};$$

$$\text{բ) } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} :$$

$$2094. \text{ u) } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4+x^2};$$

$$\text{բ) } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx :$$

$$2095. \text{ u) } \int_0^1 \ln x dx;$$

$$\text{բ) } \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} :$$

$$2096. \text{ u) } \int_1^{+\infty} e^{-3x} dx;$$

$$\text{բ) } \int_0^{+\infty} x 2^{-x} dx :$$

$$2097. \text{ u) } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2};$$

$$\text{բ) } \int_0^{+\infty} \frac{\arctg x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx :$$

$$2098. \text{ ա) } \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx ;$$

$$\text{բ) } \int_0^4 \frac{dx}{x + \sqrt{x}} :$$

$$2099. \text{ ա) } \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx ;$$

$$\text{բ) } \int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx :$$

2100. Ստուգել, որ  $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$  ( $a > 0$ ) անիսկական ինտեգրալը զուգամետ է մի-

այն  $p > 1$  դեպքում, իսկ  $\int_0^a \frac{dx}{x^p}$  ( $a > 0$ ) ինտեգրալը՝ միայն  $p < 1$  դեպքում:

Հետագոտել անիսկական ինտեգրալի զուգամիտությունը (2101-2107).

$$2101. \text{ ա) } \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 - x^2 + 1} ;$$

$$\text{բ) } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 + 1}} :$$

$$2102. \text{ ա) } \int_1^{+\infty} \frac{2 + \cos x}{\sqrt{x}} dx ;$$

$$\text{բ) } \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx :$$

$$2103. \text{ ա) } \int_3^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x-1)(x-2)}} ;$$

$$\text{բ) } \int_1^{\infty} \frac{\operatorname{tg} \frac{1}{x}}{1+x\sqrt{x}} dx :$$

$$2104. \text{ ա) } \int_1^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx ;$$

$$\text{բ) } \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1 - \cos x}} dx :$$

$$2105. \text{ ա) } \int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} dx ;$$

$$\text{բ) } \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^3}} dx :$$

$$2106. \text{ ա) } \int_0^1 \frac{dx}{x - \sin x} ;$$

$$\text{բ) } \int_0^2 \frac{\ln\left(1 + \sqrt[5]{x^3}\right)}{e^{\sin x} - 1} dx :$$

$$2107. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p + x^q} :$$



**2108.** Գտնել տարամետ անիսկական ինտեգրալի գլխավոր արժեքը.

$$\text{ա) } v.p. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x};$$

$$\text{բ) } v.p. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1-x^2};$$

$$\text{գ) } v.p. \int_{1/2}^2 \frac{dx}{x \ln x};$$

$$\text{դ) } v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+x}{1+x^2} dx:$$

Բ

**2109.** Տրված է  $f: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան: Ապացուցել ինտեգրելիության բավարար պայմանի հետևյալ ուժեղացումը. եթե կամայական  $\varepsilon > 0$  թվի համար գոյություն ունի  $[a; b]$  հատվածի  $P = (x_0, x_1, \dots, x_n)$  տրոհում, այնպիսին, որ  $\sum_{i=0}^{n-1} \Omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ , ապա  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ :

**2110.** Ապացուցել ինտեգրելիության հետևյալ հայտանիշը.  $f: [a; b] \rightarrow R$  սահմանափակ ֆունկցիան Ռիմանի իմաստով ինտեգրելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած  $\varepsilon$  և  $\delta$  դրական թվերի համար գոյություն ունի  $[a; b]$  հատվածի տրոհում, որի այն հատվածների երկարությունների գումարը, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա  $f$ -ի տատանումը մեծ է  $\delta$ -ից, փոքր է  $\varepsilon$ -ից:

**2111.** Ապացուցել Դյուբուա-Ռայմոնի հայտանիշը. որպեսզի  $[a; b]$  հատվածի վրա սահմանափակ  $f$  ֆունկցիան լինի Ռիմանի իմաստով ինտեգրելի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ կամայական  $\varepsilon$  և  $\delta$  դրական թվերի համար  $[a; b]$  հատվածի բոլոր այն կետերի բազմությունը, որոնցից յուրաքանչյուրում  $f$ -ի տատանումը մեծ է  $\delta$ -ից, հնարավոր լինի ծածկել վերջավոր թվով միջակայքերով, որոնց երկարությունների գումարը փոքր է  $\varepsilon$ -ից:

**2112.** Տրված է՝  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Դիցուք  $P = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ -ը  $[a; b]$  հատվածի տրոհում է և  $\xi_i, \eta_i \in \Delta_i$  ( $i = 0, 1, \dots, n-1$ ): Ապացուցել, որ

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx:$$

**2113.** Դիցուք՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Ապացուցել, որ եթե  $f^* : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան  $f$  - ից տարբերվում է միայն վերջավոր թվով կետերում, ապա  $f^* \in \mathfrak{R}[a; b]$ , ընդ որում՝

$$\int_a^b f^*(x) dx = \int_a^b f(x) dx :$$

Ապացուցել ֆունկցիայի ինտեգրելիությունը(2114-2116).

**2114.**  $f(x) = \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right)$ , երբ  $x \in (0; 1]$ ,  $f(0) = 0$  :

**2115.**  $f(x) = \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]$ , երբ  $x \in (0; 1]$ ,  $f(0) = 0$  :

**2116.**  $f(x) = R(x)$  (Ռիմանի ֆունկցիան է),  $x \in [a; b]$  :

**2117.** Տրված է՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Դիցուք յուրաքանչյուր  $n \in N$  թվի համար  $[a; b]$

հատվածը տրոհված է  $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$ , կետերով: Ապացուցել, որ  $f_n(x) = \sup_{t \in \Delta_i} f(t)$ , երբ  $x \in \Delta_i$ , որտեղ  $\Delta_0 = [x_0; x_1]$ ,  $\Delta_i = (x_i; x_{i+1}]$ ,

$i = 1, 2, \dots, n-1$ , ֆունկցիաներն  $[a; b]$  հատվածի վրա ինտեգրելի են, ընդ որում՝

$$\text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx ;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0 :$$

**2118.** Ապացուցել, որ ցանկացած  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$  ֆունկցիայի համար գոյություն ունի  $[a; b]$  հատվածի վրա անընդհատ  $\varphi_n(x)$  ( $n \in N$ ) ֆունկցիաների հաջորդականություն, այնպիսին, որ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |\varphi_n(x) - f(x)| dx = 0 :$$

**2119.** Դիցուք՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$  և  $[c; d] \subset (a; b)$ : Ապացուցել, որ  $f$  -ն օժտված է «ինտեգրալային անընդհատության» հետևյալ հատկությամբ.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_c^d |f(x+h) - f(x)| dx = 0 :$$

2120. Գիցուք  $\varphi : [\alpha; \beta] \rightarrow [a; b]$  ֆունկցիան ինտեգրելի է և  $f \in C[a; b]$ : Ապացուցել, որ  $f \circ \varphi \in \mathfrak{R}[\alpha; \beta]$ :

2121. Ստուգել, որ եթե  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$ , ապա  $\max\{f; g\} \in \mathfrak{R}[a; b]$  և  $\min\{f; g\} \in \mathfrak{R}[a; b]$ :

2122. Գիցուք  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան ուռուցիկ է: Ապացուցել, որ  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ , ընդ որում՝

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}:$$

2123. Տրված է  $f : [1; +\infty) \rightarrow R$  ֆունկցիան չնվազող է և գոգավոր: Ապացուցել, որ

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \frac{1}{2} f(n) + \int_1^n f(x) dx + O(1) \quad (n \rightarrow \infty):$$

2124. Գիցուք  $f : [0; 1] \rightarrow R$  ֆունկցիան մոնոտոն է: Ապացուցել, որ

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty):$$

2125. Գիցուք՝  $f \in C^1[a; b]$  և

$$d_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right):$$

Գտնել  $\lim_{n \rightarrow \infty} n d_n$  սահմանը:

2126. Գիցուք՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$  և ամենուրեք՝  $f(x) \geq 0$ : Ապացուցել, որ եթե  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , ապա  $f$ -ի բոլոր անընդհատության կետերում  $f(x) = 0$ : Մասնավորապես, եթե  $f \in C[a; b]$ , ապա  $f(x) \equiv 0$ :

2127. Գիցուք՝  $\int_a^b f(x) dx > 0$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի  $[c; d] \subset [a; b]$  ( $c < d$ ) հատված, որի վրա ամենուրեք՝  $f(x) > 0$ :

2128. Ապացուցել, որ եթե  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիան նույնաբար զրո չէ, ապա գոյություն ունի  $[c; d] \subset [a; b]$  հատված, այնպիսին, որ  $\int_c^d f(x) dx \neq 0$ :

2129. Ստուգել, որ ցանկացած  $f \in \mathfrak{R}[0; 1]$  ֆունկցիայի համար՝

$$\text{ա) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx ;$$

$$\text{բ) } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx ;$$

$$\text{գ) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) \cos x dx :$$

**2130.** Տրված է՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$  և ցանկացած  $z \in [0; b-a]$  կետում  $f(a+z) = f(b-z)$ : Ստուգել, որ

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx :$$

**2131.** Դիցուք  $f: R \rightarrow R$  ֆունկցիան  $[0; T]$  հատվածում ինտեգրելի է և ունի  $T$  պարբերություն: Ապացուցել, որ ցանկացած  $a \in R$  թվի համար՝

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx :$$

**2132.** Դիցուք՝  $f \in C(R)$  և ցանկացած  $a \in R$  թվի համար՝

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \quad (T \neq 0):$$

Ապացուցել, որ  $f$  -ը  $T$  -պարբերական ֆունկցիա է:

**2133.** Տրված է՝  $f \in C[-l; l]$  և ցանկացած  $0 < a \leq l$  թվի համար

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx :$$

Ապացուցել, որ  $f$  -ը գույզ ֆունկցիա է:

**2134.** Ապացուցել, որ ցանկացած  $n \in N$  թվի համար

$$F(x) = \int_0^x \sin^n t dt \quad \text{և} \quad G(x) = \int_0^x \cos^n t dt$$

ֆունկցիաները, երբ  $n$ -ը կենտ է,  $2\pi$ -պարբերական ֆունկցիաներ են. իսկ երբ  $n$ -ը գույզ է, ապա դրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է մեկական գծա-  
յին և պարբերական ֆունկցիաների գումար:

**2135.** Դիցուք  $f \in C(R)$  ֆունկցիան ունի  $T$  պարբերություն: Ապացուցել, որ  $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt$  ֆունկցիան կարելի է ներկայացնել որպես գծային ֆունկցիայի և  $T$ -պարբերական ֆունկցիայի գումար:

**2136.** Տրված է  $f$ -ը ցանկացած  $[0; a]$  հատվածում ինտեգրելի է և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ : Գտնել սահմանը.

$$\text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx)dx; \quad \text{բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt :$$

Գտնել գումարի սահմանը (2137-2140).

Ցուցում: Գումարելիներից յուրաքանչյուրում առանձնացնել բարձր կարգի անվերջ փոքրերը և գնահատելով դրանք՝ դեն նետել:

$$\text{2137. } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n^2} + \left(1 + \frac{2}{n}\right) \sin \frac{2\pi}{n^2} + \dots + \left(1 + \frac{n-1}{n}\right) \sin \frac{(n-1)\pi}{n^2} \right]:$$

$$\text{2138. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}} :$$

$$\text{2139. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{(nx+k)(nx+k+1)}}{n^2} \quad (x > 0):$$

$$\text{2140. } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right):$$

**2141.** Ապացուցել անվերջ փոքրերի համարժեքությունը ( $x \rightarrow +0$ ).

$$\text{ա) } \int_0^{\sin x} \sqrt{tgt} dt \sim \int_0^{\operatorname{tg} x} \sqrt{\sin t} dt; \quad \text{բ) } \int_x^{x^2} \ln t dt \sim \int_{x^{2x}}^{x^x} \frac{dt}{t} :$$

**2142.** Գոյություն ունի՞ արդյոք  $f \in \mathfrak{R}[0;1]$  ոչ բացասական ֆունկցիա, որը որևէ  $\alpha \in R$  թվի համար բավարարում է

$$\int_0^1 f(x)dx = 1, \quad \int_0^1 xf(x)dx = \alpha \quad \text{և} \quad \int_0^1 x^2 f(x)dx = \alpha^2$$

պայմաններին:

**2143.** Դիցուք  $f$ -ը  $[0; +\infty)$  միջակայքում դրական և անընդհատ ֆունկցիա է: Ապացուցել, որ

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x u f(u) du}{\int_0^x f(u) du}$$

Ֆունկցիան  $(0; +\infty)$ -ում աճող է:

**2144.** Ապացուցել անհավասարությունը.

$$\text{ա) } \left| \int_{\alpha}^{\alpha+1} \sin x^2 dx \right| \leq \frac{1}{\alpha} \quad (\alpha > 0); \quad \text{բ) } \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^2}} dx < \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1+x^2}} dx :$$

Հաշվել ինտեգրալը (2145-2150).

$$2145. \int_{1/2}^2 \left( 1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x + \frac{1}{x}} dx :$$

$$2146. \int_{e^{-2m}}^1 \left| \left( \cos \left( \ln \frac{1}{x} \right) \right)' \right| dx \quad (n \in \mathbb{N}): \quad 2147. \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x dx}{1 + 2\alpha \cos x + \alpha^2} \quad (\alpha = \text{const}):$$

$$2148. \int_0^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt{1 - 2\alpha \cos x + \alpha^2}} \quad (\alpha = \text{const}):$$

$$2149. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx : \quad 2150. \int_0^{100\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx :$$

Ապացուցել հավասարությունը (2151-2152).

$$2151. \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos x + r^2} dx = 2\pi \operatorname{sgn}(1 - r) \quad (r \in \mathbb{R}_+):$$

$$2152. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)^2} = \frac{\pi}{4} \frac{a^2 + b^2}{a^3 b^3} \quad (a, b > 0):$$

2153.  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$  ( $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ ) ինտեգրալի համար ապացուցել

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \text{ անդրադարձ բանաձևը:}$$

2154. Հաշվել ինտեգրալը.

$$\text{ա) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx; \quad \text{բ) } \int_0^{\pi} \sin^7 x dx; \quad \text{գ) } \int_0^{\pi} \cos^8 x dx:$$

2155. Ստուգել, որ ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի համար

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{երբ } n - \text{ը գույգ է,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & \text{երբ } n - \text{ը կենսո է:} \end{cases}$$

2156. Ապացուցել Վալիսի բանաձևը.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[ \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}:$$

2157. Ապացուցել եռանկյունաչափական համակարգի օրթոգոնալությունը  $[-\pi; \pi]$  հատվածում.

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nxdx &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin kxdx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nxdx = 0 \quad (m, n, k \in \mathbb{Z}_+, m \neq n): \end{aligned}$$

2158. Ապացուցել Լեժանդրի բազմանդամների համակարգի (տես խնդիր 1179) օրթոգոնալությունը  $[-1; 1]$  հատվածում.

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{երբ } m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1}, & \text{երբ } m = n: \end{cases}$$

2159.  $I_n = \int_0^1 (\arccos x)^n dx$  ինտեգրալի համար ապացուցել

$$I_n = n \left( \frac{\pi}{2} \right)^{n-1} - n(n-1) I_{n-2} \quad (n > 1)$$

անդրադարձ բանաձևը:

Ապացուցել, որ ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի համար ճշմարիտ է հավասարությունը (2160-2163).

$$2160. \text{ ա) } \int_0^a (a^2 - x^2)^n dx = a^{2n+1} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!};$$

$$\text{բ) } \int_0^a (a^2 - x^2)^{\frac{2n-1}{2}} dx = a^{2n} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \quad (a > 0):$$

$$2161. \text{ ա) } \int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos(n+2)x dx = 0;$$

$$\text{բ) } \int_0^{\pi/2} \cos^n x \sin(n+2)x dx = \frac{1}{n+1};$$

$$\text{գ) } \int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos(n+2)x dx = -\frac{1}{n+1} \sin \frac{\pi n}{2};$$

$$\text{դ) } \int_0^{\pi/2} \sin^n x \sin(n+2)x dx = \frac{1}{n+1} \cos \frac{\pi n}{2};$$

$$2162. \text{ ա) } \int_0^{\pi/2} \cos^n x \sin nx dx = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{2^k}{k};$$

$$\text{բ) } \int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos nx dx = \frac{\pi}{2^{n+1}};$$

$$2163. \int_0^{2\pi} \sin(\sin x + nx) dx = 0 \quad (n \in \mathbb{Z}):$$

Աստիճանի իջեցման եղանակով հաշվել ինտեգրալը (2164-2167).

$$2164. I_{n,m} = \int_0^1 x^m (1-x)^n dx \quad (m, n \in \mathbb{Z}_+):$$

$$2165. I_{n,m} = \int_0^1 x^m \ln^n x dx \quad (m, n \in \mathbb{N}):$$



$$2166. I_n = \int_0^{\pi/4} t g^{2n} x dx \quad (n \in N):$$

$$2167. I_n = \int_0^{\pi/4} \left( \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \right)^{2n+1} dx \quad (n \in N):$$

2168. Գիցուք՝  $u, v \in C^{n+1}[a; b]$ : Ապացուցել մասերով ինտեգրման բանաձևի հետևյալ ընդհանրացումը.

$$\int_a^b u(x)v^{(n+1)}(x)dx = \sum_{k=0}^n (-1)^k u^{(k)}(x)v^{(n-k)}(x) \Big|_a^b - (-1)^n \int_a^b u^{(n+1)}(x)v(x)dx :$$

2169. Գիցուք՝  $f \in C^{n+1}[a; b]$  և  $x_0, x \in [a; b]$ : Ապացուցել Թեյլորի բանաձևը՝ մնացորդային անդամի ինտեգրալային տեսքով.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt :$$

Գտնել ֆունկցիայի ընդհանրացված նախնականը (2170-2173).

$$2170. \int \operatorname{sgn}(\sin x) dx : \quad 2171. \int x[x] dx :$$

$$2172. \int (x - [x]) dx : \quad 2173. \int (-1)^{[x]} dx :$$

Հաշվել ինտեգրալը (2174-2177).

$$2174. \int_0^2 [e^x] dx : \quad 2175. \int_1^{n+1} \ln[x] dx \quad (n \in N):$$

$$2176. \int_0^{\pi} x \operatorname{sgn}(\cos x) dx : \quad 2177. \int_0^6 [x] \sin \frac{\pi x}{6} dx :$$

Ապացուցել անհավասարությունը (2178-2183).

$$2178. \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0 : \quad 2179. \int_{\pi/2}^x \frac{\cos u}{u} du < 0 \quad \left( x > \frac{\pi}{2} \right):$$

$$2180. \int_1^2 2^{\frac{1}{x}} dx < 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} : \quad 2181. \int_0^{\pi} e^{\sin^2 \varphi} d\varphi > \frac{3\pi}{2} :$$

$$2182. \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \varphi} d\varphi < \frac{\pi}{2R} (1 - e^{-R}) \quad (R > 0):$$

2183.  $\int_a^b e^{-x^2} dx < \frac{1}{2a} e^{-a^2} \quad (0 < a < b):$

2184. Ապացուցել միջին արժեքի ընդհանրացված թեորեմի հետևյալ ճշգրտումը. եթե  $f \in C[a; b]$ ,  $g \in \mathfrak{R}[a; b]$  և  $g(x) \geq 0 \quad (a \leq x \leq b)$ , ապա գոյություն ունի  $\xi \in [a; b]$  կետ, այնպիսին, որ

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx :$$

2185. Տրված է՝  $f \in C^1[a; b]$ ,  $g \in C^1[a; b]$  և  $g$ -ն  $[a; b]$ -ում չնվազող է: Օգտվելով նախորդ խնդրից և կատարելով մասերով ինտեգրում՝ ապացուցել միջին արժեքի երկրորդ թեորեմը:

\*\*\*

Աստիճանի իջեցման եղանակով հաշվել անիսկական ինտեգրալը (2186-2190).

2186.  $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx :$

2187.  $I_n = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1) \cdots (x+n)} :$

2188.  $I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(ax^2 + 2bx + c)^n} \quad (ac - b^2 > 0):$

2189.  $I_n = \int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} :$

2190.  $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{ch^{n+1} x} :$

2191. Հաշվել ինտեգրալը.

ա)  $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx ;$

բ)  $\int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx ;$

գ)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \operatorname{ctg} x dx ;$

դ)  $\int_0^1 \frac{\ln x dx}{\sqrt{1-x^2}} :$

2192. Ապացուցել, որ

ա)  $\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2 + 4ab}\right) dx \quad (a, b > 0);$

$$p) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx,$$

ենթադրելով, որ  $\delta$  ախ կողմում գրված ինտեգրալները զուգամետ են:

Հետազոտել անիսկական ինտեգրալի զուգամիտությունը (2193-2204)

$$2193. \int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^4}} :$$

$$2194. \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx :$$

$$2195. \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} :$$

$$2196. \int_0^{+\infty} x^p |x-1|^q dx :$$

$$2197. \int_0^1 x^p \ln^q \frac{1}{x} dx :$$

$$2198. \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} :$$

$$2199. \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x (\ln \ln x)^r} :$$

$$2200. \int_0^{\pi/2} \frac{\ln(\sin x)}{\sqrt{x}} dx :$$

$$2201. \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx :$$

$$2202. \text{ա) } \int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^\alpha} dx ;$$

$$p) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx :$$

$$2203. \text{ա) } \int_0^{\infty} \frac{x \sin ax}{b^2 + x^2} dx ;$$

$$p) \int_0^{\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}} dx :$$

$$2204. \text{ա) } \int_0^{\infty} e^{\sin x} \frac{\sin 2x}{x^\alpha} dx ;$$

$$p) \int_1^{\infty} (\ln x)^\alpha \frac{\sin x}{x} dx :$$

$$2205. \text{Ապացուցել, որ } \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \text{ ինտեգրալը բացարձակ զուգամետ է } \alpha > 1$$

դեպքում, պայմանական զուգամետ՝  $0 < \alpha \leq 1$  դեպքում:

Հետագոտել անիսկական ինտեգրալի պայմանական և բացարձակ զուգամիտությունը (2206-2210).

$$2206. \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx :$$

$$2207. \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx :$$

$$2208. \int_0^{+\infty} \sin x^n dx :$$

$$2209. \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^q}{x^p} dx :$$

$$2210. \int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx, \quad q \geq 0 :$$

2211. Ճշմարիտ է արդյոք, որ եթե  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  -ը զուգամետ է, ապա

ա)  $f(x) \rightarrow 0$  երբ  $x \rightarrow +\infty$  ;

բ)  $f$  -ը սահմանափակ է  $+\infty$  -ի շրջակայքում:

Բերել համապատասխան օրինակներ:

2212. Գիցուք՝  $f \in C^1[a;+\infty)$ ,  $|f'(x)| \leq M$  ( $x \geq a$ ) և  $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$  -ը զուգամետ է: Ապացուցել, որ  $f(x) \rightarrow 0$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$  :

2213. Ապացուցել, որ եթե  $f$  -ը  $[a;+\infty)$ -ում մոնոտոն է և  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  -ը զուգամետ է, ապա  $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$  :

2214. Կարելի՞ է արդյոք  $f: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիայի զուգամետ անիսկական ինտեգրալը՝  $\int_a^b f(x)dx$  -ը, սահմանել որպես ինտեգրալային գումարների սահման:

2215. Գիցուք  $f$  -ը  $(0;1]$  միջակայքում մոնոտոն և գրոյի շրջակայքում անսահմանափակ ֆունկցիա է: Ապացուցել, որ եթե  $\int_0^1 f(x)dx$  -ը զուգամետ է, ապա

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx :$$

Օգտվելով այս փաստից՝ հաշվել  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$  -ը:

**2216.** Տրված է՝  $f \in C[1;+\infty)$ : Ապացուցել, որ եթե  $\int_1^{+\infty} xf(x)dx$ -ը զուգամեն է, ապա զուգամեն է նաև  $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ -ը:

**2217.** Գիցուք  $f : R \rightarrow R$  ֆունկցիան ցանկացած հատվածում ինտեգրելի է, ունի  $T$  պարբերություն և  $\int_0^T f(x)dx = 0$ : Ապացուցել, որ եթե  $g$ -ն  $[a;+\infty)$ -ում մոնոտոն է և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ , ապա  $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ -ը զուգամեն է:

**2218.** Գիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները  $[a; \omega)$  միջակայքի ցանկացած հատվածում ինտեգրելի են: Ապացուցել, որ եթե  $\int_a^\omega f^2(x)dx$  և  $\int_a^\omega g^2(x)dx$  ինտեգրալները զուգամեն են, ապա զուգամեն է նաև  $\int_a^\omega f(x)g(x)dx$  ինտեգրալը, ընդ որում՝

$$\left[ \int_a^\omega f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^\omega f^2(x)dx \cdot \int_a^\omega g^2(x)dx :$$

## Գ.

**2219.** Ապացուցել, որ եթե  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան  $[a; b]$  հատվածի յուրաքանչյուր կետում ունի վերջավոր սահման, ապա  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ :

**2220.** Ապացուցել, որ եթե  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիայի խզումները առաջին սեռի են, ապա  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ :

**2221.** Ճշմարիտ է արդյոք, որ տրված հատվածում նախնական ունեցող ցանկացած ֆունկցիա այդ հատվածում Ռիմանի իմաստով ինտեգրելի է: Բերել համապատասխան օրինակ:

**2222.** Կառուցել  $f \in \mathfrak{R}[0; 1]$  և  $\varphi : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  ֆունկցիաներ, այնպիսիք, որ  $\varphi$ -ն խիստ մոնոտոն է և ղիֆերենցելի,  $\varphi(0) = 0$ ,  $\varphi(1) = 1$ , սակայն

$$\int_0^1 f(x)dx \neq \int_0^1 f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

այն պատճառով, որ աջ կողմում ինտեգրալը գոյություն չունի:

2223. Գիցուք  $f : [a; b] \rightarrow R_+$  ֆունկցիան Ռիմանի իմաստով ինտեգրելի է: Ապացուցել, որ ցանկացած  $p > 1$  թվի համար  $f^p(x)$  ֆունկցիան  $[a; b]$  հատվածում նույնպես ինտեգրելի է և գտնել

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{(\Delta x_i)^{p-1}} \left( \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(t) dt \right)^p$$

սահմանը, որտեղ  $P = (x_0; x_1; \dots; x_n)$ -ն  $[a; b]$ -ի տրոհում է:

2224. Գիցուք  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիան աճող է և դրական: Ապացուցել, որ

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(y) dy = bf(b) - af(a):$$

2225. Ապացուցել, որ եթե  $f \in \mathfrak{R}[0; 1]$ , ապա ցանկացած  $\alpha \in [0; 1]$  թվի համար

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+\alpha}{n}} f(x) dx = \alpha \int_0^1 f(x) dx :$$

2226. Գիցուք  $f : [0; 1] \rightarrow R$  ֆունկցիան չաճող է: Ապացուցել, որ ցանկացած  $\alpha \in [0; 1]$  թվի համար  $\int_0^\alpha f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx$ :

2227. Ապացուցել, որ եթե  $f : [0; a] \rightarrow R$  ֆունկցիան չնվազող է, ապա  $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$  ֆունկցիան  $(0; a]$  միջակայքում չնվազող է:

2228. Գիցուք  $f : R_+ \rightarrow R$  ֆունկցիան չնվազող է և  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A$ : Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ :

2229. Ապացուցել, որ եթե  $f : [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան չնվազող է, ապա ցանկացած  $x \in (a; b)$  թվի համար

$$\frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \leq \frac{1}{b-x} \int_x^b f(t) dt :$$

2230. Գիցուք  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները որոշված են  $[0; 1]$  հատվածում, ընդ որում  $f$ -ը չնվազող է, իսկ  $g$ -ն՝ չաճող: Ապացուցել անհավասարությունը.

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \leq \int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 g(x)dx :$$

**2231.** Ապացուցել, որ եթե  $[0;1]$  հատվածում որոշված  $f$  և  $g$  ֆունկցիաները երկուսն էլ չնվազող են կամ՝ երկուսն էլ չաճող, ապա

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 g(x)dx :$$

**2232.** Դիցուք՝  $f \in C^1[0;1]$  և  $f(1) - f(0) = 1$  : Ապացուցել, որ  $\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1$  :

**2233.** Դիցուք՝  $f \in C^1[0;1]$  և  $f(1) = 0$  : Ապացուցել, որ

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 3 \left( \int_0^1 f(x) dx \right)^2 :$$

**2234.** Տրված է՝  $f \in C^1[a; b]$  և  $f(a) = f(b) = 0$  : Ապացուցել, որ

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx :$$

**2235.** Դիցուք  $f$  -ը  $[0;1]$  հատվածում նվազող և դրական ֆունկցիա է: Ապացուցել անհավասարությունը.

$$\frac{\int_0^1 xf^2(x)dx}{\int_0^1 xf(x)dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x)dx}{\int_0^1 f(x)dx} :$$

**2236.** Դիցուք  $f \in C[0;1]$  ֆունկցիան գոգավոր է, դրական և  $f(0) = 1$  : Ապացուցել, որ

$$\int_0^1 xf(x)dx \leq \frac{2}{3} \left( \int_0^1 f(x)dx \right)^2 :$$

**2237.** Տրված է՝  $f \in \mathcal{R}[a; b]$  և  $\inf_{x \in [a; b]} f(x) > 0$  : Ապացուցել  $[a; b]$  հատվածում

$f$  ֆունկցիայի «միջին երկրաչափական» և «միջին թվաբանական» արժեքների միջև հետևյալ անհավասարությունը.

$$\exp\left\{\frac{1}{b-a}\int_a^b \ln f(x)dx\right\} \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \quad (\exp\{u\} = e^u):$$

**2238.** Գիցուք  $f \in C(R)$  ֆունկցիան դրական է և 1-պարբերական: Ապացուցել, որ ցանկացած  $a \in R$  թվի համար՝

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x+a)} dx \geq 1:$$

**2239.** Գիցուք՝  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Օգտվելով գումարների համար Հյուլերի անհավասարությունից (տես խնդիր 1499)՝ ապացուցել Հյուլերի անհավասարությունն ինտեգրալների համար.

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}},$$

որտեղ  $p, q > 1$  և  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ :

**2240.** Գիցուք՝  $f, g \in \mathfrak{R}[a; b]$  և  $p \geq 1$ : Օգտվելով գումարների համար Մինկովսկու անհավասարությունից (տես խնդիր 1500)՝ ապացուցել Մինկովսկու անհավասարությունն ինտեգրալների համար.

$$\left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}:$$

Յույց տալ, որ  $0 < p < 1$  դեպքում գրված անհավասարությունը փոխարինվում է հակադիր անհավասարությամբ:

**2241.** Գիցուք՝  $f, g \in C[a; b]$ : Ապացուցել, որ եթե ցանկացած  $x \in [a; b]$  կետում

$$f(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, \text{ ապա } f(x) \equiv 0:$$

**2242.** Գիցուք՝  $f \in C[a; b]$  և  $\int_a^b f(x)dx = 0$ : Ապացուցել, որ գոյություն ունի

$$\xi \in (a; b) \text{ կետ, այնպիսին, որ } \int_a^\xi f(x)dx = f(\xi):$$

**2243.** Տրված է՝  $f \in C^1[0; 1]$  և  $f'(0) \neq 0$ : Գիցուք  $\xi(x)$  ֆունկցիան բավարարում է

$$\int_0^x f(t)dt = xf(\xi(x)) \text{ և } 0 \leq \xi(x) \leq x \text{ պայմաններին: Գտնել } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi(x)}{x} \text{-ը:}$$



2244. Տրված է՝  $f \in C[a; b]$ : Ապացուցել, որ

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|:$$

2245. Դիցուք՝  $f \in C[0; 1]$  և ամենուրեք՝  $f(x) > 0$ : Նշանակենք՝

$$F(\alpha) = \int_0^1 [f(x)]^\alpha dx:$$

Հաշվել  $\lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{\ln F(\alpha)}{\alpha}$ -ն:

2246. Դիցուք՝  $f, g \in C[0; 1]$  և ամենուրեք՝  $g(x) > 0$ : Գտնել սահմանը.

$$\text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 x^n f(x) dx}{\int_0^1 x^n g(x) dx}; \quad \text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_0^1 \sqrt[n]{g(x)} dx \right)^n:$$

2247.  $\varphi: [a; b] \rightarrow R$  ֆունկցիան կոչվում է *կտոր առ կտոր հաստատուն* կամ *աստիճանաձև* ֆունկցիա, եթե գոյություն ունի  $[a; b]$  հատվածի այնպիսի  $P = (x_0; x_1; \dots; x_n)$  տրոհում, որ  $(x_i; x_{i+1})$  միջակայքերից յուրաքանչյուրի վրա  $\varphi$ -ն հաստատուն է:

Դիցուք՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Ապացուցել, որ ցանկացած  $\varepsilon > 0$  թվի համար գոյություն ունի  $[a; b]$ -ում կտոր առ կտոր հաստատուն  $\varphi$  և  $\psi$  ֆունկցիաների զույգ, այնպիսին, որ  $\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x)$  ( $x \in [a; b]$ ) և

$$\int_a^b \psi(x) dx - \int_a^b \varphi(x) dx < \varepsilon:$$

2248. Տրված է՝  $f \in \mathfrak{R}[a; b]$ : Ապացուցել, որ

$$\text{ա) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx dx = 0;$$

$$\text{բ) } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx:$$

2249. Գիցուք՝  $f \in \mathfrak{R}[0;1]$ , իսկ  $g \in C(R)$  ֆունկցիան  $T$ -պարբերական է: Ապացուցել, որ

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)g(\alpha x)dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \cdot \int_0^1 f(x)dx :$$

2250. Ապացուցել, որ եթե  $f \in \mathfrak{R}[a;b]$  և  $x_0 \in (a;b)$  կետում  $f$ -ն ունի առաջին սերի խզում, ապա  $F(x) = \int_a^x f(t)dt$  ֆունկցիան  $x_0$  կետում դիֆերենցելի չէ: Յույց տալ, որ  $x_0$ -ում  $F$ -ն ունի սիմետրիկ ածանցյալ (տես խնդիր 1573) և

$$F'_s(x_0) = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2} :$$

2251. Ապացուցել, որ եթե  $f \in C(a;b)$  և ցանկացած  $x \in (a;b)$  կետում

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \int_0^h [f(x+t) - f(x)]dt = 0,$$

ապա  $f$ -ը հաստատուն ֆունկցիա է:

2252. Գիցուք  $f \in C[a;b]$  և ցանկացած  $[\alpha; \beta] \subset [a;b]$  հատվածի համար

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx \right| \leq M |\alpha - \beta|^{1+\delta},$$

որտեղ  $M$ -ը և  $\delta$ -ն դրական հաստատուններ են: Ապացուցել, որ  $f(x) \equiv 0$ :

2253. Գիցուք  $x_n$  ( $n \in N$ ) հաջորդականության բոլոր անդամները  $[0;1]$  հատվածից են: Տրված  $(\alpha; \beta) \subset [0;1]$  միջակայքի համար նշանակենք  $v_n(\alpha, \beta)$ -ով  $x_n$  հաջորդականության այն անդամների քանակը, որոնք ընկած են  $(\alpha; \beta)$ -ի մեջ և որոնց համարները չեն գերազանցում  $n$ -ը:

Կասենք, որ  $x_n$  հաջորդականությունը  $[0;1]$  հատվածում հավասարաչափ է բաշխված, եթե ցանկացած  $(\alpha; \beta) \subset [0;1]$  միջակայքի համար  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n(\alpha, \beta)}{n} = \beta - \alpha$ : Ապացուցել, որ  $x_n$  հաջորդականությունը  $[0;1]$ -ում հավասարաչափ է բաշխված այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած  $f \in \mathfrak{R}[0;1]$  ֆունկցիայի համար

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} = \int_0^1 f(x)dx :$$

2254. Գտնել սահմանը.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \cos x^n dx$  :

2255. Հաշվել ինտեգրալը.

$$\text{ա) } \int_{-1}^1 \frac{dx}{(e^x + 1)(x^2 + 1)};$$

$$\text{բ) } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^\alpha + 1)(x^2 + 1)} \quad (\alpha > 0);$$

$$\text{գ) } \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1 + x^2)^2} dx;$$

$$\text{դ) } \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{\pi^2 - x^2} dx :$$

2256. Ցանկացած  $n \in \mathbb{N}$  թվի համար հաշվել ինտեգրալը.

$$\text{ա) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} d\varphi;$$

$$\text{բ) } \int_0^\pi \left( \frac{\sin n\varphi}{\sin \varphi} \right)^2 d\varphi :$$

2257. Ստուգել, որ ցանկացած  $n$ -րդ աստիճանի  $P(x)$  հանրահաշվական բազմանդամի համար

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} P(x) dx = P(0) + P'(0) + \dots + P^{(n)}(0):$$

2258. Գիցուք  $P(x)$ -ը  $n$ -րդ աստիճանի հանրահաշվական բազմանդամ է:

Ապացուցել, որ եթե  $\int_0^1 x^k P(x) dx = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$ , ապա

$$\int_0^1 P^2(x) dx = (n+1)^2 \left( \int_0^1 P(x) dx \right)^2 :$$

2259. Գիցուք  $f \in C[1; +\infty)$  ֆունկցիան  $T$ -պարբերական է: Ընտրել  $\alpha$  պարամետրի արժեքն այնպես, որ  $\int_1^{+\infty} (f(x^2) + \alpha) dx$  ինտեգրալը լինի զուգամետ:

2260. Տրված է՝  $f \in C[0; +\infty)$ ,  $f(x) > 0 \quad (x \geq 0)$  և  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$ -ը զուգամետ է:

Ապացուցել, որ

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^2} \int_0^a f(x) dx = +\infty :$$

2261. Գիցուք  $f \in C^1[0; +\infty)$  և ամենուրեք՝  $f(x) > 0$  : Ապացուցել, որ

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1+f'^2(x)}}{f(x)} dx = +\infty :$$

2262. Գիցուք  $f \in C^1[0; +\infty)$  և ամենուրեք՝  $f(x) > 0$ ,  $f'(x) > 0$  : Ապացուցել, որ

եթե  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)+f'(x)} < +\infty$  (զուգամետ է), ապա  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{f(x)} < +\infty$  :

2263. Տրված է՝  $f : (0; a) \rightarrow R$  ֆունկցիան սննոտոն է, իսկ  $\int_0^a x^p f(x) dx$ -ը՝ զուգամետ : Ապացուցել, որ  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{p+1} f(x) = 0$  :

2264. Գիցուք՝  $f \in C(R_+)$ ,  $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx < +\infty$  և  $g(x) = f(x) - 2e^{-x} \int_0^x e^z f(z) dz$  : Ապացուցել, որ

$$\int_0^{+\infty} g^2(x) dx = \int_0^{+\infty} f^2(x) dx :$$

## Գլուխ 9

### Ինտեգրալի կիրառություններ

Ս ե ղ ա ն ա կ ե ռ պ ի մ ա կ ե ռ ե ս ը : Դիցուք՝  $f \in \mathfrak{R}[a;b]$  և  $f(x) \geq 0$ : Դեկարտյան հարթության վրա

$$\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$$

անհավասարություններով որոշվող պատկերի (սեղանակերպի)  $S$  մակերեսը որոշվում է

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

բանաձևով:

Եթե  $y = f(x)$  ֆունկցիան տրված է  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$  ( $\alpha \leq t \leq \beta$ ) պարամետրական հավասարումներով,  $\varphi \in C^1[\alpha; \beta]$ ,  $\varphi'(t) \geq 0$ ,  $\varphi(\alpha) = a$ ,  $\varphi(\beta) = b$ ,  $\psi \in C[\alpha; \beta]$  և  $\psi(t) \geq 0$ , ապա

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t) dt :$$

Ս ե կ տ ո ռ ի մ ա կ ե ռ ե ս ը : Բևեռային կորդինատների համակարգում  $r = r(\varphi)$  ( $\varphi_0 \leq \varphi \leq \phi$ ,  $0 < \phi - \varphi_0 \leq 2\pi$ ) անընդհատ ֆունկցիայի գրաֆիկով և  $\varphi = \varphi_0$ ,  $\varphi = \phi$  ճառագայթներով սահմանափակված պատկերի (սեկտորի) մակերեսը որոշվում է

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_0}^{\phi} r^2(\varphi) d\varphi$$

բանաձևով:

Կ ո ռ ի ե ռ կ ա ռ ո թ յ ու ն ը : Դիցուք տարածական  $L$  կորը տրված է  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$ ,  $z = \lambda(t)$  ( $\alpha \leq t \leq \beta$ ) պարամետրական հավասարումներով: Եթե  $\varphi, \psi, \lambda \in C^1[\alpha; \beta]$ , ապա  $L$  կորի երկարությունը որոշվում է

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \lambda'^2(t)} dt$$

բանաձևով:

Հարթ կորի դեպքում ( $\lambda(t) \equiv 0$ ) կորի երկարության բանաձևն ընդունում է

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$$

տեսքը: Մասնավորապես,  $f \in C^1[a; b]$  ֆունկցիայի գրաֆիկն ունի

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(t)} dt$$

երկարություն:

Եթե  $L$  հարթ կորը բևեռային կոորդինատների համակարգում տրված է  $r = r(\varphi)$  ( $\varphi_0 \leq \varphi \leq \phi$ ) հավասարումով, որտեղ  $r(\varphi)$  ֆունկցիան անընդհատ դիֆերենցելի է, ապա

$$l = \int_{\varphi_0}^{\phi} \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)} d\varphi :$$

$\Omega$  տ տ մ ա ն մ մ ա ռ մ ն ի ծ ա վ ա լ ը : Տրված  $f \in C[a; b]$  ֆունկցիայի գրաֆիկով և  $x = a$ ,  $x = b$ ,  $y = 0$  ուղիղներով սահմանափակված պատկերն  $Ox$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի  $V$  ծավալը որոշվում է

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

բանաձևով:

$\Omega$  տ տ մ ա ն մ մ ա կ ե թ և ո յ թ ի մ ա կ ե թ ե ս ը : Տրված  $f \in C^1[a; b]$  ֆունկցիայի գրաֆիկն  $Ox$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի  $S$  մակերեսը որոշվում է

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$$

բանաձևով:

Ի ն տ ե գ ռ ա լ ի կ ի թ ա ռ ո թ յ ու ն ն ե թ ը մ ե խ ա ն ն կ ա յ ու մ : Դիցուք  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$ ,  $t_0 \leq t \leq T$ ,  $l$  երկարությամբ կորի երկայնքով բաշխված է  $\rho = 1$  հաստատուն խտությամբ զանգված: Հետևյալ բանաձևերով հաշվում են.

կորի ստատիկ մոմենտները  $Ox$  և  $Oy$  առանցքների նկատմամբ՝

$$M_x = \int_{t_0}^T \psi(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt, \quad M_y = \int_{t_0}^T \varphi(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt,$$

ծանրության կենտրոնի կոորդինատները՝

$$x_c = \frac{M_y}{l}, \quad y_c = \frac{M_x}{l},$$

իներցիայի մոմենտները  $Ox$  և  $Oy$  առանցքների նկատմամբ՝

$$I_x = \int_{t_0}^T \psi^2(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt, \quad I_y = \int_{t_0}^T \varphi^2(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt :$$

Դիցուք  $P$  պատկերը տրված է հետևյալ անհավասարումներով՝

$$a \leq x \leq b, \quad f_1(x) \leq y \leq f_2(x),$$

որտեղ  $f_1, f_2 \in C[a; b]$ : Եթե  $P$ -ի վրա բաշխված է  $\rho = 1$  հաստատուն խտությամբ զանգված, ապա պատկերի  $m$  զանգվածը,  $M_x$  և  $M_y$  ստատիկ մոմենտները, ծանրության կենտրոնի  $x_c$  և

$y_c$  կորդիհնատները, ինչպես նաև իներցիայի  $I_x$  և  $I_y$  մոմենտները հաշվում են հետևյալ բանաձևերով.

$$m = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx :$$

$$M_x = \frac{1}{2} \int_a^b (f_2^2(x) - f_1^2(x)) dx, \quad M_y = \int_a^b x(f_2(x) - f_1(x)) dx :$$

$$x_c = \frac{M_y}{m}, \quad y_c = \frac{M_x}{m} :$$

$$I_x = \frac{1}{3} \int_a^b (f_2^3(x) - f_1^3(x)) dx, \quad I_y = \int_a^b x^2 (f_2(x) - f_1(x)) dx :$$

## Ա

Այս գլխի խնդիրներում հանդիպող պարամետրերը դրական են:

Հաշվել տրված կորերով սահմանափակված սեղանակերպի մակերեսը (2265-2268).

**2265.**  $y = \sin x, y = 0, x = 0, x = \pi :$

**2266.**  $y = e^{-x}, y = 0, x = 0, x = a :$

**2267.**  $y = xe^x, y = 0, x = 1 :$

**2268.**  $y = |\log_a x|, y = 0, x = \frac{1}{a}, x = a \quad (a > 1) :$

Հաշվել տրված կորերով սահմանափակված պատկերի մակերեսը (2269-2282).

**2269.**  $y = x^2, x + y = 2 :$

**2270.**  $y = x - \frac{\pi}{2}, y = \cos x, x = 0 :$

**2271.**  $y = \sin^2 x, y = x \sin x \quad (0 \leq x \leq \pi) :$

**2272.**  $y = \ln(1+x), y = -xe^{-x}, x = 1 :$

**2273.**  $y = \sin^3 x + \cos^3 x, y = 0 \quad \left( -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4} \right) :$

**2274.**  $y = |x|^3 e^{-x^2}, |x| = a, y = 0 : \quad \mathbf{2275.} \quad x = y^2(y-1), x = 0 :$

**2276.**  $x^2 + y^2 = 2, y^2 = 2x - 1 \quad \left( x \geq \frac{1}{2} \right) :$

2277.  $y = (x+1)^2$ ,  $x = \sin \pi y$ ,  $y = 0$  ( $0 \leq y \leq 1$ ):

2278.  $y = x$ ,  $y = \frac{1}{x}$ ,  $y = \frac{10}{3} - x$  ( $x \geq 1$ ):

2279.  $y = \arcsin x$ ,  $y = \arccos x$ ,  $y = 0$ :

2280.  $y = \sqrt{3x^2}$ ,  $y = \sqrt{4-x^2}$ :

2281.  $y = x^2$ ,  $y = x^2 + x - 1$ ,  $y = \frac{5}{2}x$  ( $y \leq x^2$ ):

2282.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ :

2283. Գիցուք՝  $y(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$  և  $y(x) \geq 0$ , երբ  $x_1 \leq x \leq x_2$ : Ապացուցել, որ  $0 \leq y \leq y(x)$ ,  $x_1 \leq x \leq x_2$  անհավասարություններով որոշվող պատկերի մակերեսը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով (Միմպսոնի բանաձև).

$$S = \frac{1}{6}(x_2 - x_1) \left[ y(x_1) + y(x_2) + 4y\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \right]:$$

Հաշվել կորի երկարությունը (2284-2290).

2284.  $y = x^{\frac{3}{2}}$ ,  $0 \leq x \leq 4$ :

2285.  $y = e^x$ ,  $0 \leq x \leq \ln 7$ :

2286.  $y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}$ ,  $1 \leq x \leq 3$ :

2287.  $y = \ln \sin x$ ,  $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ :

2288.  $y = \ln(x^2 - 1)$ ,  $2 \leq x \leq 5$ :

2289.  $y = \arcsin e^x$ ,  $-\ln 7 \leq x \leq -\ln 2$ :

2290.  $y = \sqrt{1-x^2} + \arcsin x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{9}{16}$ :

Հաշվել պարամետրական հավասարումներով տրված կորի երկարությունը (2291-2298).

2291.  $x = 6 - 3t^2$ ,  $y = 4t^3$  ( $x \geq 0$ ):

2292.  $x = a \cos^3 t$ ,  $y = a \sin^3 t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  (աստղաձև զիծ):

2293.  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  (ցիկլոիդ):

2294.  $x = 2a \sin^2 t$ ,  $y = 2a \cos t$ :

2295.  $x = 6at^5$ ,  $y = 5at(1 - t^8)$ ,  $A(0;0)$  կետից մինչև  $B(6a;0)$  կետը:

2296.  $x = ae^{bt} \cos t$ ,  $y = ae^{bt} \sin t$ ,  $0 \leq t \leq \pi$ :

2297.  $x = a(\cos t + t \sin t)$ ,  $y = a(\sin t - t \cos t)$ ,  $0 \leq t \leq T$ :



2298.  $x = ch^3t$ ,  $y = sh^3t$ ,  $0 \leq t \leq T$  :

Հաշվել տարածական կորի երկարությունը (2299-2304).

2299.  $x = 2a \cos t$ ,  $y = 2a \sin t$ ,  $z = at$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  :

2300.  $x = e^t$ ,  $y = e^{-t}$ ,  $z = \sqrt{2}t$ ,  $0 \leq t \leq T$  :

2301.  $x = \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2$ ,  $y = -\frac{4}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2$ ,  $z = \frac{1}{3}t^3 + t^2$ ,  $0 \leq t \leq 1$  :

2302.  $x = e^t(\cos t + \sin t)$ ,  $y = e^t(\cos t - \sin t)$ ,  $z = e^t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  :

2303.  $x = acht$ ,  $y = bsht$ ,  $z = at$ ,  $0 \leq t \leq T$  :

2304.  $x = \cos^3 t$ ,  $y = \sin^3 t$ ,  $z = \cos 2t$ ,  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  :

Հաշվել բևեռային կոորդինատների համակարգում տրված կորի երկարությունը (2305-2309).

2305.  $r = a\varphi$ ,  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$  (Արքիմեդի գալարագիծ):

2306.  $r = \varphi^2$ ,  $0 \leq \varphi \leq \pi$  :

2307.  $r = a \sin \varphi$  (շրջանագիծ):

2308.  $r = a(1 + \cos \varphi)$  (սրտաձև գիծ):

2309.  $r = \cos^3 \frac{\varphi}{3}$ ,  $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$  :

2310. Հաշվել կոնի ծավալը, եթե նրա հիմքի շառավիղն  $r$  է, իսկ բարձրությունը՝  $h$  :

2311. Հաշվել հատած կոնի ծավալը, եթե նրա հիմքերի շառավիղներն են  $R$  և  $r$ , իսկ բարձրությունը՝  $h$  :

2312. Հաշվել  $R$  շառավիղով գնդի ծավալը:

Հաշվել տրված կորերով սահմանափակված պատկերը  $Ox$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը (2313-2320).

2313.  $y = x^{\frac{2}{3}}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$  ( $x \geq 0$ ):    2314.  $y = \sin 2x$ ,  $y = 0$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ):

2315.  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$ ,  $y = 0$  ( $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ):

2316.  $y^2 = 2x$ ,  $y = 2$ ,  $x = 0$  :

2317.  $y = \sin^2 x$ ,  $y = x \sin x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ):

2318.  $y = e^x$ ,  $y = x + 1$ ,  $x = 3$ :

2319.  $y = e^{-x}$ ,  $y = 0$  ( $0 \leq x < +\infty$ ):

2320.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ :

Հաշվել տրված կորն  $Ox$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը (2321-2324).

2321.  $y = \sqrt{x}$  ( $2 \leq x \leq 6$ ):

2322.  $y = e^{-x}$  ( $0 \leq x \leq 1$ ):

2323.  $y = \sin x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ):

2324.  $y = \frac{1}{x}$  ( $1 \leq x \leq 2$ ):

Հաշվել տրված կորն  $Oy$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը (2325-2328).

2325.  $y = \frac{x^2}{6}$  ( $0 \leq x \leq 4$ ):

2326.  $3x = 4 \cos y$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq 0$ ):

2327.  $x = chy$  ( $\ln 2 \leq y \leq \ln 3$ ):

2328.  $4x + 2 \ln y = y^2$  ( $e^{-1} \leq y \leq e$ ):

## Բ

2329. Հաշվել  $y = x^2 - 2x + 3$  պարաբոլով, (3;6) կետով նրան տարված շոշափողով և կողողինատական առանցքներով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

2330. Հաշվել  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  էլիպսով,  $\left(\frac{a}{2}; \frac{b\sqrt{3}}{2}\right)$  կետով նրան տարված շոշափողով և  $y = 0$  ուղիղով սահմանափակված կորագիծ եռանկյան մակերեսը:

2331. Հաշվել արբսիսների առանցքով,  $y = (x-1)^5 + 1$  կորով և նրան  $10x - 2y - 5 = 0$  ուղիղին զուգահեռ տարված շոշափողով սահմանափակված պատկերի մակերեսը:

2332. Հաշվել տրված պարաբոլով և ճշված արբսիսն ունեցող կետերում պարաբոլի շոշափողներով սահմանափակված պատկերի մակերեսը.

ա)  $y = x^2 + 4x + 9$ ,  $x_1 = -3$ ,  $x_2 = 0$ ;

բ)  $y = 4x - x^2 + 1$ ,  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 3$ :

2333. Գտնել  $k$ -ի այն արժեքը, որի դեպքում  $y = kx + b$  ուղիղով և  $y = x^2 + px + q$  պարաբոլով սահմանափակված պատկերն ունի փոքրագույն մակերես ( $b \geq q$ ):



$$L = \int_{t_1}^{t_2} |f(t) + f''(t)| dt :$$

Օգտվելով նախորդ խնդրից՝ գտնել կորի երկարությունը (2355-2356).

**2355.**  $x = (t^2 - 2)\sin t + 2t \cos t$ ,  $y = (t^2 - 2)\cos t - 2t \sin t$  ( $0 \leq t \leq \pi$ ):

**2356.**  $x = a(2 \cos 2t \cos t + \sin 2t \sin t)$ ,  $y = a(\sin 2t \cos t - 2 \cos 2t \sin t)$   
( $0 \leq t \leq \pi$ ):

**2357.** Գիցուք՝  $f, g \in C^2[a; b]$ : Ապացուցել, որ

$$x = f(t) - g'(t), y = f'(t) + g(t), a \leq t \leq b$$

և

$$x = f'(t)\sin t - g'(t)\cos t, y = f'(t)\cos t + g'(t)\sin t, a \leq t \leq b$$

կորերի երկարությունները հավասար են:

Հաշվել կորի երկարությունը (2358-2361).

**2358.**  $y = \int_1^x \sqrt{t^4 - 1} dt$ ,  $1 \leq x \leq 2$ :

**2359.**  $y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} dt$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ :

**2360.**  $\varphi = \sqrt{r}$  ( $0 \leq r \leq R$ ):

**2361.**  $\varphi = \int_0^r \frac{sh \rho}{\rho} d\rho$  ( $0 \leq r \leq R$ ):

Անցնելով պարամետրական հավասարումների՝ հաշվել կորի երկարությունը (2362-2364).

**2362.**  $(y - \arcsin x)^2 = 1 - x^2$ :

**2363.**  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ :

**2364.**  $\sqrt[3]{\left(\frac{x}{a}\right)^2} + \sqrt[3]{\left(\frac{y}{b}\right)^2} = 1$ :

**2365.** Գիցուք՝  $f \in C[a; b]$  ( $a > 0$ ) և  $f(x) \geq 0$ : Ապացուցել, որ  $a \leq x \leq b$  և  $0 \leq y \leq f(x)$  անհավասարություններով որոշվող պատկերն  $Oy$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը հաշվվում է

$$V = 2\pi \int_a^b xf(x) dx$$

բանաձևով:

Հաշվել տրված կորերով սահմանափակված պատկերը  $Oy$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը (2366-2370).

2366.  $y = 3\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{2}{3}}, y = 0, x = 2 \quad (x \geq 0)$ :

2367.  $y = \cos x^2, y = 1, x = 1 \quad (0 \leq x \leq 1)$ :

2368.  $y^2 = 4x, y = x$ :

2369.  $y = \frac{a^3}{a^2 + x^2}, y = \frac{a}{2}$ :

2370.  $y = e^x + 6, y = e^{2x}, x = 0$ :

Հաշվել հետևյալ կորը նշված ուղիղի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթներով սահմանափակված մարմնի ծավալը (2371-2373).

2371.  $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$  ա)  $Ox$  առանցքի շուրջը; բ)  $x = a$  ուղիղի շուրջը:

2372.  $x = a \sin t, y = a \sin 2t$  ա)  $Ox$  առանցքի շուրջը; բ)  $Oy$  առանցքի շուրջը; գ)  $x = a$  ուղիղի շուրջը; դ)  $y = a$  ուղիղի շուրջը:

2373.  $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi), y = 0$  ա)  $Ox$  առանցքի շուրջը; բ)  $Oy$  առանցքի շուրջը; գ)  $y = 2a$  ուղիղի շուրջը:

2374. Գիցուք  $r = r(\varphi)$ -ն անընդհատ է  $[\alpha; \beta]$ -ի վրա ( $0 \leq \alpha < \beta \leq \pi, r$ -ը և  $\varphi$ -ն բևեռային կոորդինատներն են): Ապացուցել, որ  $\alpha \leq \varphi \leq \beta$  և  $0 \leq r \leq r(\varphi)$  անհավասարություններով որոշվող սեկտորը բևեռային առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\varphi) \sin \varphi d\varphi:$$

Հաշվել բևեռային կոորդինատներով տրված կորը բևեռային առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը (2375-2376).

2375.  $r = a(1 + \cos \varphi) \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi)$ : 2376.  $r = a\varphi \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$ :

2377. Գիցուք կորը տրված է  $x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha; \beta]$ , պարամետրական հավասարումներով, որտեղ  $\varphi, \psi \in C^1[\alpha; \beta]$  և  $\psi(t) \geq 0$ : Ապացուցել, որ այդ կորը  $Ox$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt:$$

Հաշվել պարամետրական հավասարումներով տրված կորը ա)  $Ox$ , բ)  $Oy$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը (2378-2380).

2378.  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ):

2379.  $x = a(3 \cos t - \cos 3t)$ ,  $y = a(3 \sin t - \sin 3t)$  ( $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ):

2380.  $x = \sqrt{2} \sin t$ ,  $y = \frac{1}{4} \sin 2t$  ( $0 \leq t \leq \pi$ ):

2381. Ապացուցել, որ բևեռային կորոդինատներով տրված  $r = r(\varphi)$  ( $0 \leq \alpha \leq \varphi \leq \beta \leq \pi$ ) կորը բևեռային առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերեսի մակերեսը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\varphi) \sqrt{r^2(\varphi) + r'^2(\varphi)} \sin \varphi d\varphi :$$

Հաշվել բևեռային կորոդինատներով տրված կորը բևեռային առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը (2382-2384).

2382.  $r = a(1 + \cos \varphi)$ :    2383.  $r = 2a \sin \varphi$ :    2384.  $r = a + b \cos \varphi$  ( $a > b$ ):

2385. Գտնել  $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$  կորը նշված առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը. ա) բևեռային առանցքի; բ)  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  առանցքի; գ)

$\varphi = \frac{\pi}{4}$  առանցքի:

2386-2399 խնդիրներում ընդունել  $\rho = 1$ :

Գտնել կորի  $M_x$  և  $M_y$  ստատիկ մոմենտները (2386-2389).

2386.  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$  ( $x \geq 0, y \geq 0$ ):    2387.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $y \geq 0, a > b$ ):

2388.  $x = a \sin^3 t$ ,  $y = a \cos^3 t$  ( $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ):

2389.  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ):

Գտնել կորի ծանրության կենտրոնի կորոդինատները (2390-2391).

2390.  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  ( $x \geq 0, y \geq 0$ ):

2391.  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ):

Գտնել կորի  $I_x$  իներցիայի մոմենտը (2392-2393).

2392.  $y = e^x \left( 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \right)$ :                      2393.  $x^2 + (y-a)^2 = R^2 \quad (a > R)$ :

Գտնել տրված կորերով սահմանափակված պատկերի ստատիկ մոմենտները (2394-2395).

2394.  $y = \cos x \left( \left| x \right| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ ,  $y = 0$ :                      2395.  $y = x^2$ ,  $y = \sqrt{x}$ :

Գտնել տրված կորերով սահմանափակված պատկերի ծանրության կենտրոնի կորոդինատները (2396-2397).

2396.  $x^2 + y^2 = R^2 \quad (y \geq 0)$ ,  $y = 0$ :                      2397.  $y^2 = 2px$ ,  $x^2 = 2py$ :

2398. Գտնել  $a$  հիմքով և  $h$  բարձրությամբ ուղղանկյան իներցիայի մոմենտը նրա հիմքի նկատմամբ:

2399. Գտնել  $y^2 = 4ax$  պարաբոլով և  $x = a$  ուղիղով սահմանափակված պատկերի իներցիայի մոմենտը  $Oy$  առանցքի նկատմամբ:

## Գ.

2400. Դիցուք՝  $f, g \in C[0;1]$ : Ապացուցել անհավասարությունը.

$$\left( \int_0^1 f(x) dx \right)^2 + \left( \int_0^1 g(x) dx \right)^2 \leq \left( \int_0^1 \sqrt{f^2(x) + g^2(x)} dx \right)^2:$$

Ո՞ր դեպքում է հնարավոր հավասարությունը:

2401. Դիցուք  $\varphi(x)$ -ն  $R_+$ -ի վրա աճող և անընդհատ ֆունկցիա է, ընդ որում՝  $\varphi(0) = 0$ : Ապացուցել, որ ցանկացած  $a, b \geq 0$  և  $b \in \varphi(R_+)$  թվերի համար

$$ab \leq \int_0^a \varphi(x) dx + \int_0^b \varphi^{-1}(x) dx,$$

որտեղ  $\varphi^{-1}$ -ը  $\varphi$ -ի հակադարձ ֆունկցիան է:

Ո՞ր դեպքում է հնարավոր հավասարությունը:

2402. Դիցուք՝  $f \in C^2[0; a]$ ,  $f(x) \geq 0$ ,  $f''(x) \geq 0$ ,  $f(0) = 0$  և  $f(a) = b$ : Ապացուցել անհավասարությունը.

$$\int_0^a f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \leq \frac{b}{2} \sqrt{a^2 + b^2}:$$

Ո՞ր դեպքում է հնարավոր հավասարությունը:

**2403.** Դիցուք  $f \in C[0;1]$  ֆունկցիան չնվազող է,  $f(0)=0$ ,  $f(1)=1$  և  $l$ -ը այդ ֆունկցիայի գրաֆիկի երկարությունն է:

ա) Ապացուցել, որ  $l \leq 2$ :

բ) Համոզվել, որ նախորդ կետում գրված անհավասարության մեջ  $2$ -ը չի կարելի փոխարինել ավելի փոքր թվով:

**2404.** Դիցուք  $f \in C(R_+)$  ֆունկցիան դրական է և  $S(t)$ -ն  $y = f(x)$  կորով,  $x = t$  ուղիղով և կորդինատների առանցքներով սահմանափակված պատկերի մակերեսն է: Գտնել  $f$ -ը, եթե ցանկացած  $t > 0$  համար  $S(t) = \alpha f(t)$  ( $0 < \alpha \leq 1$ ):

**2405.** Գտնել այն շրջանագծի շառավիղը, որի կենտրոնը գտնվում է կորդինատների սկզբնակետում և  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$  ( $x \geq 0, y \geq 0$ ) աստղաձև գծի աղեղը բաժանում է հավասար երկարությամբ երեք աղեղների:

**2406.** Ապացուցել, որ  $r = ae^{k\varphi}$  լոգարիթմական գալարագծի  $2\pi n \leq \varphi \leq 2\pi(n+1)$ ,  $n \in Z_+$ , գալարների երկարությունները կազմում են երկրաչափական պրոգրեսիա: Գտնել պրոգրեսիայի հայտարարը:

**2407.** Ապացուցել, որ  $a$ ,  $b$  ( $a \neq b$ ) կիսաառանցքներով էլիպսի  $l$  երկարությունը բավարարում է

$$\pi(a+b) < l < \pi\sqrt{2(a^2+b^2)}$$

անհավասարություններին:

**2408.** Գտնել  $y = f(x)$ ,  $x \geq 0$  ( $f(x) > 0$ , երբ  $x > 0$ ) կորը, եթե ցանկացած  $a$ -ի համար  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq f(x)$  անհավասարություններով տրված պատկերն  $Ox$  առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը հաշվվում է  $\lambda \pi a f^2(a)$  ( $0 < \lambda < 1$ ) բանաձևով:

**2409.** Ապացուցել, որ  $C$  հարթ կորն իրեն չհատող և իր հարթության մեջ գտնվող առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մակերևույթի մակերեսը հավասար է  $C$ -ի երկարության և  $C$ -ի ծանրության կենտրոնի գծած շրջանագծի երկարության արտադրյալին (Գուլդինի առաջին թեորեմ):

**2410.** Ապացուցել, որ  $S$  հարթ պատկերն իրեն չհատող և իր հարթության մեջ գտնվող առանցքի շուրջը պտտելիս առաջացած մարմնի ծավալը հավասար է  $S$ -ի մակերեսի և  $S$ -ի ծանրության կենտրոնի գծած շրջանագծի երկարության արտադրյալին (Գուլդինի երկրորդ թեորեմ):

**2411.**  $a$  կողմով հավասարակողմ եռանկյունը պտտվում է իր ծանրության կենտրոնից  $d$  ( $d > a$ ) հեռավորության վրա գտնվող առանցքի շուրջը: Գտնել առաջացած մարմնի ծավալը և մակերևույթի մակերեսը:



**2412.** Գտնել  $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ ,  $x \in [-R; R]$ , կիսաշրջանագծի և այդ կիսաշրջանագծով ու  $Ox$  առանցքով սահմանափակված կիսաշրջանի ծանրության կենտրոնները:

**2413.** Գտնել  $Ox$  առանցքով և  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$  ցիկլոիդի մեկ կամարով սահմանափակված պատկերի ծանրության կենտրոնը:

# Պատասխաններ

## Գլուխ 1

1. ա)  $\{-2;0;1;\sqrt{2};3;7;9\}$ ; բ)  $[1;6]$ ; գ)  $[2;4]$ ; դ)  $R$ ; ե)  $R$ ; զ)  $N$ : 2. ա)  $\{2;8\}$ ; բ)  $(0;2]$ ; գ)  $(0;2]$ ; դ)  $\emptyset$ ; ե)  $\{-4;-3;\dots\}$ ; գ)  $\emptyset$ ; ե)  $\{-8;-5;0;7\}$ : 3. ա)  $\{2\}$ ; բ)  $[5;7] \cup [9;11]$ ; գ)  $[2;3] \cup (4;7)$ ; դ)  $\{0\}$ ; ե)  $Q$ : 4. ա)  $(-\infty;0) \cup (1;+\infty)$ ; բ)  $[3;+\infty)$ ; գ)  $[0;1]$ ; դ)  $Q$ ; ե)  $(-\infty;-3] \cup [-1;1] \cup [3;+\infty)$ ; գ)  $(-\infty;1) \cup (1;2) \cup (2;+\infty)$ : 5.  $\{12k : k \in N\}$ : 6.  $Z_+$ : 7.  $Z_+$ : 8. ա)  $[-1;2]$ ,  $[-5;8]$ ; բ)  $R, R$ ; գ)  $Z, N \setminus \{1\}$ : 9. ա)  $[-6;2]$ ; բ)  $\{0\}$ ; գ)  $-N$ : 10. Ոչ: 12. Ընդհանրապես սասած՝ ոչ: 13. 3)-ը: 19. Ոչ: 22.  $Q, I, R, Q, R \setminus \{0\}$ : 35. ա) Սահմանափակ է; բ) սահմանափակ է; գ) սահմանափակ է; դ) սահմանափակ է ներքևից; ե) սահմանափակ է վերևից; գ)  $n$ 'չ վերևից,  $n$ 'չ ներքևից սահմանափակ չէ: 38. ա)  $\min A = 0, \max A = 1$ ; բ)  $\inf A = 0, \max A = 1$ ; գ)  $\min A = 0, \sup A = +\infty$ ; դ)  $\inf A = 0, \sup A = +\infty$ ; ե)  $\inf A = -\infty, \sup A = +\infty$ ; գ)  $\inf A = 0, \sup A = +\infty$ ; ե)  $\inf A = 0, \sup A = 1$ ; ը)  $\min A = 0, \sup A = +\infty$ ; բ)  $\min A = 0, \max A = 1$ : 44. ա) Բաց է; բ)  $n$ 'չ բաց է,  $n$ 'չ փակ; գ) փակ է; դ) փակ է; ե)  $n$ 'չ բաց է,  $n$ 'չ փակ; գ) բաց է; ե) փակ է; ը) փակ է; բ) փակ է: 51. ա)  $R \setminus \{-1;-2\}$ ; բ)  $(-\infty;-\sqrt{3}] \cup [0;\sqrt{3}]$ ; գ)  $(-\infty;1) \cup (2;+\infty)$ ; դ)  $(-1;1)$ ; ե)  $[1;4]$ ; գ)  $(1;+\infty)$ ; ե)  $R \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k : k \in Z \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + \pi k : k \in Z \right\}$ ; ը)  $\{-1;1\}$ ; բ)  $(-1;0) \cup (0;1)$ : 52. ա) աճող է; բ) նվազող է; գ) աճող է; դ) աճող է; ե) նվազող է; գ) նվազող է; ե) նվազող է; ը) աճող է; բ) երբ  $0 < a < 1$ , նվազող է, երբ  $a > 1$ , աճող է: 53. ա) Կենս է; բ)  $n$ 'չ գույգ է,  $n$ 'չ կենս; գ) գույգ է; դ) գույգ է; ե) գույգ է; գ) կենս է; ե)  $n$ 'չ գույգ է,  $n$ 'չ կենս; ը) կենս է; բ) կենս է: 58. ա)  $[0]=0, [-0,75]=-1, [0,75]=0, [-\sqrt{2}]=-2, [\sqrt{2}]=1, [-\pi]=-4, [\pi]=3$ ; բ)  $Z$ ; դ) ոչ: 59.  $T = 1, Y_0 = [0;1]$ : 60. ա)  $\bigcup_{k \in Z} (2\pi k; \pi + 2\pi k)$ ; բ)  $(1;10)$ : 61.  $\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$ ,  $\frac{x}{\sqrt{1+3x^2}}$ : 62. ա)  $2^{x^2}$ ; բ)  $2^{2x}$ ; գ)  $\arccos \frac{2x}{1+x^2}$ ; դ)  $\log_2(1 + \sin^2 x)$ : 64. Եթե  $\varphi$ -ն և  $\psi$ -ն երկուսն էլ չնվազող են, կամ երկուսն էլ չաճող, ապա  $\psi \circ \varphi$ -ն չնվազող է: Եթե  $\varphi$  և  $\psi$  ֆունկցիաներից մեկը չաճող է, մյուսը՝ չնվազող, ապա  $\psi \circ \varphi$ -ն չաճող է: 65. Ֆունկցիաները աճող են: 66. Ոչ: 68. ա)  $R, x = \frac{y+1}{3}$ ; բ)

$R, x=2^y$ ; қ)  $R_+, x=\sqrt{y}$ ; ң)  $R_+, x=-\sqrt{y}$ ; ғ)  $R_+, x=\arctg\sqrt{y}$ ; қ)  $R_+, x=-\arctg\sqrt{y}$ : **122.** п)  $\Omega_\Sigma$ : **123.**  $\cup_{j:n}$ : **141.**  $\Omega_\Sigma$ : **145.** у)  $R, [-2,5;3,5), Q$ ; п)  $[-1;+\infty), [-1;+\infty), [-1;0)$ ; қ)  $[-1;1], [0;1], [-1;1]$ ; ң)  $R, R_-, (0;1)$ ; ғ)  $(2;+\infty), [2,5;10], (3;+\infty)$ : **146.** у)  $R, [-1;2], Q$ ; п)  $(0;2)\cup(2;4), \{0;4\}, \emptyset$ ; қ)  $R \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k : k \in Z\}, \{\frac{\pi k}{2} : k \in Z\}, \emptyset$ ; ң)  $R, \emptyset, \{0\}$ ; ғ)  $[-1;1], \emptyset, \{\frac{1}{2};1\}$ : **148.** у)  $y=2x$ ; п)  $y=2x$ ; қ)  $y=2x+1$ ; ң)  $y=\ln(-x)$ ; ғ)  $y=\frac{2}{\pi}\arctg x$ ; қ)  $y=-\frac{1}{x}$ , ғ)  $x \leq -1$  և  $x+2$ , ғ)  $x > -1$ : **153.**  $-\frac{1}{5}\left(2x^2 + \frac{3}{x^2}\right)$ : **154.** у)  $x^2 - 5x + 6$ ; п)  $x^2 - 2$ ; қ)  $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2$ ; ң)  $x^3 - 3x$ : **155.** у)  $\{0;1\}, \{0;1\}$ ; п)  $\{-1;0;1\}, \{0\}$ : **174.** у)  $\{-1;0\}$ ; п)  $\left\{\frac{1-r^2}{2r-1} : r \in Q \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}\right\}$ : **178.**  $R$ : **179.** у)  $R_+$ ; п)  $[1;+\infty)$ : **183.**  $T=1$ : **186.**  $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ : **187.** 9:

## Қысқашы 2

**227.** у)  $n > 11$ ; п)  $n > \frac{21(k+1)+2}{4}$ : **257.** у) 0; п)  $\frac{a_1+a_2}{2}$ : **258.** у) 0; п) 0: **259.** у)  $1/3$ ; п)  $4/3$ : **260.** у) 1; п) 2: **261.** у) 0; п) 0: **262.** у) 3; п) 0; қ)  $\infty$ ; ң)  $a_0/b_0$ , ғ)  $p=q$ ; 0, ғ)  $p < q$ ;  $\infty$ , ғ)  $p > q$ : **263.** у)  $1/3$ ; п) 2: **264.** у) 0; п) 0: **265.** у)  $2/3$ ; п) 0: **266.** у)  $1/2$ ; п)  $\lg 2$ : **267.** у) 0; п) 2: **268.** у) 1; п)  $-1$ : **269.**  $\frac{qp(q-p)}{2}$ : **270.**  $-1$ : **271.**  $a^2 + a + \frac{1}{3}$ : **287.**  $\Omega_\Sigma$ : **288.**  $\inf x_n = -3,5$ ;  $\sup x_n = 5$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -2$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ : **289.**  $\inf x_n = 0$ ;  $\sup x_n = 2$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ : **290.**  $\inf x_n = 0$ ;  $\sup x_n = 1$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ : **291.**  $\inf x_n = -4$ ;  $\sup x_n = 6$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -4$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 6$ : **292.**  $\inf x_n = -1/2$ ;  $\sup x_n = 1$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1/2$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ : **293.**  $\inf x_n = 0$ ;  $\sup x_n = +\infty$ ;

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ : **294.**  $\inf x_n = -5$ ;  $\sup x_n = 1,25$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ;  
 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ : **295.**  $\inf x_n = 1$ ;  $\sup x_n = \sqrt{5}$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ : **296.**  $\Omega_\Sigma$ :  
**297.** ա)  $\Omega_\Sigma$ ; բ)  $\cup_{j \in \mathbb{N}}$ : **299.**  $\{0;1\}$ : **300.**  $\{-1;0;1\}$ : **301.**  $\{1;5\}$ : **302.**  $\{a;b\}$ : **308.**  
 $p \geq \frac{kq}{k-1}$ : **310.**  $x_n = \frac{n}{n+1}$ ; սահմանափակ է: **311.**  $x_n = 2 - 2^{2^{-n}}$ ; սահմանափակ է:  
**312.**  $x_n = (b-a)2^{n-1} + 2a - b$ , սահմանափակ է, եթե  $a = b$ : **313.**  
 $x_n = (2a+b-3)(-1)^{n-1} - (a+b-2)(-2)^{n-1} + 1$ ; սահմանափակ է, երբ  
 $a+b=2$ : **327.**  $2/3$ : **328.**  $3$ : **329.**  $1$ : **330.**  $\sqrt{2}/2$ : **331.**  $1/4$ : **332.**  $0$ : **333.**  $1$ : **334.**  
 $\frac{\ln a}{\ln b}$ : **335.**  $4/5$ : **336.**  $0$ : **337.**  $\sqrt[m]{a_1 a_2 \dots a_m}$ : **338.**  $1/da_1$ : **339.**  $1/\sqrt{d}$ : **340.**  
 $q/(1-q)^2$ : **345.** Չուզամեն է;  $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ : **346.** Չուզամեն է;  $1$ : **347.** Չուզամեն է;  
 $4$ : **348.** Չուզամեն է;  $k-\sqrt{a}$ : **349.** Չուզամեն է;  $A/3$ : **350.** Չուզամեն է;  $\sqrt[3]{M}$ :  
**351.** Չուզամեն է;  $\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$ : **352.**  $1$ , եթե  $a \neq 0$ ; եթե  $a = 0$ ՝ սահմանը  
գոյություն չունի կամ պատկանում է  $[-1;1]$  հատվածին: **355.**  $[0;1]$ : **372.** գ)  $\Omega_\Sigma$ :  
**374.** Սահմանափակ է: **379.**  $a \notin \left\{ -\frac{2^k}{2^k-1} : k \in \mathbb{N} \right\}$ ;  $x_n = \frac{a}{(a+1)2^{n-1} - a}$ : **380.**  
ա)  $x_n = \frac{3a}{a - (a-3)4^{n-1}}$ ; բ)  $a \in \left\{ \frac{3 \cdot 4^k}{4^k - 1} : k \in \mathbb{N} \right\}$ : **383.**  $\sqrt{ab}$ : **391.** Տարամեն է:  
**392.** Չուզամեն է, երբ  $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ : **393.** Չուզամեն է: **394.** Չուզամեն է: **400.**  
 $a = b$ : **401.**  $a = b = 0$ : **402.**  $b = \frac{a}{4}(5 - \sqrt{41})$ : **404.** Չուզամեն է: **405.**  $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ :  
**417.**  $\frac{1}{p+1}$ : **418.**  $\frac{1}{2}$ : **419.**  $4/e$ : **420.**  $1$ : **421.**  $0$ : **422.**  $\pi/2$ :

### Գլուխ 3

**430.** Սահմանափակ չէ: **432.**  $\inf f(x) = 0$ ;  $\sup f(x) = 25$ : **433.**  
 $\inf f(x) = 0$ ;  $\sup f(x) = 1$ : **434.**  $\inf f(x) = -1$ ;  $\sup f(x) = 1$ : **435.**

$\inf f(x)=2$ ;  $\sup f(x)=+\infty$ : **436.**  $\omega\inf f(x)=-\sqrt{2}$ ;  $\sup f(x)=\sqrt{2}$ ;  $\rho
 $\inf f(x)=-\sqrt{2}$ ;  $\sup f(x)=\sqrt{2}$ : **437.**  $\omega\inf f(x)=0$ ;  $\sup f(x)=1$ ;  $\rho
 $\inf f(x)=0$ ;  $\sup f(x)=2$ : **438.**  $\inf f(x)=\cos 3$ ,  $\sup f(x)=\cos 1$ : **450.**  $\Omega$  $\xi$ :  
**453.** 1: **454.** 10: **455.**  $\frac{mn(n-m)}{2}$ : **456.** 0,5: **457.** 1/4: **458.**  $5^{-5}$ : **459.**  $(3/2)^{30}$ :  
**460.**  $(3/2)^{10}$ : **461.**  $\frac{n(n+1)}{2}$ : **462.**  $m/n$ : **463.** 1: **464.** -2: **465.**  $1/\sqrt{2a}$ : **466.**  
0,25: **467.** 2,4: **468.**  $(a+b)/2$ : **469.** -0,25: **470.** -2: **471.** 0,25: **472.** 1,5:  
**473.** 16/3: **474.**  $n/m$ : **475.**  $a_1/m$ : **478.** 0: **479.** 1: **480.**  $\alpha/\beta$ : **481.** 1: **482.** 3/5:  
**483.** 1: **484.**  $\cos a$ : **485.**  $1/\cos^2 a$ : **486.** 0,5: **487.** 0,5: **488.** 1: **489.**  $1/p$ : **490.**  
0,5: **491.**  $\sqrt{2}$ : **492.** -9/128: **493.** 4: **498.**  $\omega$ ) 0,5;  $\rho$ ) 1: **499.**  $\omega$ ) 0;  $\rho$ ) 0: **500.**  
 $\omega$ ) 1;  $\rho$ )  $e^4$ : **501.**  $\omega$ )  $e^3$ ;  $\rho$ )  $e^{-0,5}$ : **502.**  $\omega$ )  $\sqrt{e}$ ;  $\rho$ )  $e^{-1}$ : **503.**  $\omega$ ) 1;  $\rho$ )  $e^{1,5}$ : **504.**  
 $\omega$ )  $1/a$ ;  $\rho$ )  $-x^{-2}$ : **505.**  $\omega$ ) 1;  $\rho$ ) 0,2: **506.**  $\omega$ ) 2/3;  $\rho$ )  $e^{-0,5}$ : **507.** 1: **508.** 1/5:  
**509.**  $\sqrt{ab}$ : **510.**  $\omega$ ) 0;  $\rho$ )  $\log_2^3$ : **513.** *cha*: **514.** *sha*: **515.** -1: **517.**  $-\pi/2$ : **518.**  
0,5: **519.**  $\pi/3$ : **520.**  $1/(1+x^2)$ : **522.**  $\omega$ ) 2;  $\psi$ երևից;  $\rho$ ) 2;  $\Omega$ երբևից: **523.**  $\omega$ )  
 $\pi/2$ ;  $\Omega$ երբևից;  $\rho$ )  $-\pi/2$ ;  $\psi$ երևից: **524.**  $\omega$ ) 1;  $\Omega$ երբևից;  $\rho$ ) 0;  $\psi$ երևից: **525.**  $\omega$ )  
0;  $\Omega$ երբևից;  $\rho$ ) 1;  $\psi$ երևից: **526.**  $f(-0)=1$ ;  $f(+0)=0$ : **527.**  $f(-0)=0$ ;  
 $f(+0)=+\infty$ : **528.**  $f(1-0)=1,5$ ;  $f(1+0)=0,25$ : **529.**  $f\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=1$ ;  
 $f\left(\frac{\pi}{2}+0\right)=-1$ : **530.**  $f(3-0)=0$ ;  $f(3+0)=1/3$ : **531.**  $f(10-0)=109$ ;  
 $f(10+0)=110$ : **532.**  $f(-1-0)=1$ ;  $f(-1+0)=+\infty$ : **533.**  $f(1-0)=0$ ;  
 $f(1+0)=1$ : **534.**  $f(1-0)=3$ ;  $f(1+0)=2$ : **535.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=+\infty$ ;  
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=0$ : **536.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=e^{-1}$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=e$ : **537.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=+\infty$ ;  
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=-\infty$ : **547.** 25/16: **548.** 2: **549.** 10/37: **550.** -1/9: **551.** -0,25:  
**552.** -0,5: **553.** -2: **554.** 2: **555.** 7/3: **556.** 12: **557.** 1: **558.**  $\omega$ ) 1;  $\rho$ ) 2;  $\eta$ ) 2;  
 $\eta$ ) 2;  $\xi$ ) 2;  $\rho$ ) 2: **559.**  $\omega$ ) 2;  $\rho$ ) 1;  $\eta$ ) 6;  $\xi$ ) 3: **560.** Անվերջ փոքր է: **561.**  
Անվերջ փոքր է: **562.**  $\omega$ ) Անվերջ փոքր չէ;  $\rho$ ) անվերջ փոքր է: **563.**  $\omega$ ) Անվերջ  
մեծ է;  $\rho$ ) անվերջ մեծ չէ: **564.** Անվերջ մեծ է: **565.**  $\omega$ ) Անվերջ մեծ չէ;  $\rho$ ) անվերջ$$

մեծ է: **566.** ա) Անվերջ մեծ է; բ) անվերջ մեծ չէ: **567.** ա)  $-\sqrt[3]{\frac{x-1}{2}}$ ; բ)  $x-1$ ; գ)  $e(x-1)$ ; դ)  $x-1$ : **568.** ա)  $2x^2$ ; բ)  $x^{\frac{2}{3}}$ ; գ)  $x^{\frac{1}{8}}$ : **569.** ա)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ ;  $\overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$ ;  $\overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ : **570.** ա)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -1$ ;  $\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ ; բ)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ;  $\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ ; գ)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\frac{\pi}{2}$ ;  $\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pi$ : **578.**  $n^{\frac{n(n+1)}{2}}$ : **579.**  $\frac{n(n+1)}{2}$ : **580.**  $\frac{n(n-1)}{2} a^{n-2}$ : **581.**  $\frac{m-n}{2}$ : **582.**  $-0,5$ : **583.**  $\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n}$ : **584.**  $1/n!$ : **585.**  $(a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n$ : **586.**  $a_1 = -1; b_1 = 0,5; a_2 = 1; b_2 = -0,5$ : **587.**  $\lambda = \sum_{k=1}^n \sqrt{a_k}$ ,  $\mu = \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{2\sqrt{a_k}}$ : **588.**  $-\cos a$ : **589.**  $2 \cos a / \sin^3 a$ ,  $a \notin \{\pi k : k \in \mathbb{Z}\}$ : **590.**  $14$ : **591.**  $-\cos 2a / \cos^4 a$ : **592.**  $4/3$ : **593.**  $-1/12$ : **594.**  $3$ : **595.**  $0$ , եթե  $a_1 < a_2$ ;  $e^{\frac{b_1 - b_2}{a_1}}$ , եթե  $a_1 = a_2$ ;  $+\infty$ , եթե  $a_1 > a_2$ : **596.**  $\sqrt{e}$ : **597.**  $1$ : **598.**  $\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2m}$ : **599.**  $\frac{2a}{b}$ : **600.**  $e^{\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2}}$ : **601.**  $\alpha/\beta$ : **602.**  $-2$ : **603.**  $1$ : **604.** ա)  $a^b \ln a$ ; բ)  $a^a \ln(a/e)$ : **605.** ա)  $\frac{\alpha}{\beta} a^{\alpha-\beta}$ ; բ)  $a^a \ln a e$ : **606.**  $a^{a^a} (\ln a - 1)$ : **607.**  $e^{-a-b}$ : **608.**  $(a^a b^b c^c)^{\frac{1}{a+b+c}}$ : **609.**  $1/\sqrt{ab}$ : **611.**  $2 \ln a$ : **612.**  $e^{\pi^2}$ : **613.**  $-\frac{n(n+1)(2n+1)}{12}$ : **614.**  $\frac{n(n+1)}{2}$ : **615.**  $\frac{n(n+1)}{2}$ : **616.**  $-4,5$ : **617.**  $0$ : **618.**  $4 - \pi$ : **619.**  $\frac{64}{3} \ln 2$ : **620.**  $\sqrt{2}$ : **621.**  $e^{-\frac{\pi}{4}}$ : **622.**  $0$ : **623.**  $\frac{1}{1-x}$ : **624.**  $0$ : **625.**  $\frac{\sin x}{x}$ : **626.** ա)  $\alpha = 1, \beta = 0$ ; բ)  $\alpha = \beta = 0$ : **627.**  $\alpha = 1, \beta = 5$ : **628.** ա)  $\alpha = 3, \beta = 0$ ; բ)  $\alpha = \beta = 0$ : **629.** ա)  $\alpha = \pi/2, \beta = -1$ ; բ)  $\alpha = -\pi/2, \beta = -1$ : **630.**  $\beta < 0$  ևս  $0 \leq \beta < \alpha$ : **631.** ա)  $x^2$ ; բ)  $x^2$ : **632.** ա)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{2}, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2; \quad \text{բ) } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \quad \text{գ) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{e}, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = e; \quad \text{դ) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{2}, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty; \quad \text{ե) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\frac{\pi}{2}, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{\pi}{2} : 633. \text{ ա) } [-1; 1]; \text{ բ) } [1; +\infty) : 642. \text{ ա) } 1; \text{ բ) } 1 : 646.$$

$$1/6 : 647. \text{ ա) } 2 : 648. \frac{\ln a}{2} : 649. \sqrt[3]{e^{-a^2}} : 650. f(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2} :$$

## Գլուխ 4

659. ա) Ոչ.  $f$ -ը  $x_0$ -ի ցանկացած շրջակայքում սահմանափակ է; բ) ոչ. եթե  $X$ -ը սահմանափակ է, ապա ցանկացած  $f : X \rightarrow R$  ֆունկցիա բավարարում է նշված պայմանին, իսկ եթե  $X$ -ը սահմանափակ չէ, ապա  $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = +\infty$ ; գ) ոչ. եթե նշված պայմանը տեղի ունի յուրաքանչյուր  $x_0 \in X$  կետում, ապա  $f$ -ը հակադարձելի է, ընդ որում  $f^{-1}$ -ը անընդհատ է: 663.  $Z$  բազմության բոլոր կետերում ֆունկցիան ունի առաջին սեռի խզում: 664.  $Z$  բազմության բո-լոր կետերում ֆունկցիան ունի առաջին սեռի խզում: 665.  $x_0 = 0$ -ն առաջին սեռի խզման կետ է: 666.  $x_0 = 0$ -ն վերացնելի խզման կետ է: 667. Անընդհատ է: 668. Անընդհատ է: 669. Անընդհատ է: 670.  $x_0 = 0$ -ն երկրորդ սեռի խզման կետ է: 671.  $\{\pi n : n \in Z\}$  բազմության կետերը երկրորդ սեռի խզման կետեր են: 672. Անընդհատ է: 673.  $\{n^2 : n \in N\}$  բազմության կետերն առաջին սեռի խզման կետեր են: 674.  $\{\pm \sqrt{n} : n \in N\}$  բազմության կետերն առաջին սեռի խզման կետեր են: 675.  $Z \setminus \{0\}$  բազմության կետերն առաջին սեռի խզման կետեր են: 676.  $\{\pi n : n \in N\}$  բազմության կետերն առաջին սեռի խզման կետեր են: 677.  $\{1/n : n \in Z \setminus \{0\}\}$  բազմության կետերն առաջին սեռի խզման կետեր են: 678.  $Z$  բազմության կետերը վերացնելի խզման կետեր են: 679. Անընդհատ է: 680.  $\{\pm \sqrt{n} : n \in N\}$  բազմության կետերն առաջին սեռի խզման կետեր են: 681. Անընդհատ է: 682. Անընդհատ է: 683. ա) 4; բ)  $\sin 1 + 1$ ; գ)  $a \in R$ ; դ) 3; -1 : 684. ա) Երկրորդ սեռի է; բ) առաջին սեռի է: 685. Երկրորդ սեռի է: 690. Ոչ: 694.  $x = 1$ -ում  $y$ -ն ունի առաջին սեռի խզում: 695.  $x = 1$ -ում  $y$ -ն ունի առաջին

սեռի խզում: **696.** Անընդհատ է: **697.**  $\{\pi n : n \in Z\}$  բազմության կետերը վերացնելի խզման կետեր են: **698.** Անընդհատ է: **699.**  $x = 0$  կետն առաջին սեռի խզման կետ է: **700.**  $Z$ : **707.** ա)-ն և դ)-ն: **718.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **719.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **720.** Հավասարաչափ անընդհատ չէ: **721.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **722.** ա) Հավասարաչափ անընդհատ չէ; բ) հավասարաչափ անընդհատ է: **723.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **724.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **725.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **726.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **727.** ա) Հավասարաչափ անընդհատ է; բ) հավասարաչափ անընդհատ չէ: **728.** ա) Հավասարաչափ անընդհատ է; բ) հավասարաչափ անընդհատ չէ: **729.** ա) Հավասարաչափ անընդհատ չէ; բ) հավասարաչափ անընդհատ է: **730.** Անընդհատ է: **731.**  $x = 0$  կետում առաջին սեռի խզում է: **732.** Անընդհատ է  $x = 2$  կետում; խզման կետերը երկրորդ սեռի են: **733.** Անընդհատ է  $a_1, a_2, \dots, a_n$  կետերում: Խզման կետերը երկրորդ սեռի են: **735.** Խզումները վերացնելի են: **736.**  $(-\infty; 0)$  միջակայքի բոլոր կետերը երկրորդ սեռի խզման կետեր են, իսկ  $(0; +\infty)$  միջակայքի ռացիոնալ կետերը խզման կետեր են: **737.** Խզման կետերի բազմությունը  $\partial M$  -ն է: Ընդ որում  $\partial M$  բազմության մեկուսացված կետերում ֆունկցիայի խզումն առաջին սեռի է, իսկ մնացած կետերում՝ երկրորդ սեռի: **738.** ա)  $\varphi \circ \psi$  -ն անընդհատ է,  $\psi \circ \varphi$  -ն՝ խզվող; բ)  $\varphi \circ \psi$  -ն անընդհատ է,  $\psi \circ \varphi$  -ն՝ խզվող; գ) անընդհատ է: **740.**  $x = 0$  կետում ձախից անընդհատ է: **741.**  $x = 0$  կետում ձախից անընդհատ է: **742.**  $\{e^n : n \in Z\}$  բազմության կետերում աջից անընդհատ է: **743.**  $\{e^n : n \in Z\}$  բազմության կետերում աջից անընդհատ է: **744.**  $\{\pi n/2 : n \in Z\}$  բազմության կետերը թռիչքի կետեր են,  $\{2\pi k : k \in Z\}$  բազմության կետերում անընդհատ է աջից, իսկ  $\{2\pi k + \pi : k \in Z\}$  բազմության կետերում՝ ձախից: **751.** Ոչ: **763.** Ոչ: **770.** ա) Ոչ; բ) ոչ: **777.** Հավասարաչափ անընդհատ չէ: **778.** Հավասարաչափ անընդհատ չէ: **779.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **780.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **781.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **782.** Հավասարաչափ անընդհատ չէ: **783.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **784.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **785.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **786.** Հավասարաչափ անընդհատ է: **789.** ա)  $\omega_f(\delta) \leq 3\delta$ ; բ)  $\omega_f(\delta) \leq \sqrt{\delta}$ ; գ)  $\omega_f(\delta) \leq \delta$ ; դ)  $\omega_f(\delta) \leq \sqrt{2}\delta$ ; ե)  $\omega_f(\delta) \leq 2$ ; զ)  $\omega_f(\delta) \leq 2$ : **797.**  $f(x) \equiv 0$ ;  $f(x) = \cos ax$ ;  $f(x) = chax$ : **822.** Ոչ: **827.** Ոչ: **835.** Ոչ: **836.** Ոչ:

## Գլուխ 5



839. у)  $a\Delta x$ ; р)  $(2ax_0 + b)\Delta x + a(\Delta x)^2$ ; q)  $a^{x_0}(a^{\Delta x} - 1)$ ; η)  $\frac{tg\Delta x}{\cos^2 x_0(1 - tgx_0 tg\Delta x)}$ ; 841. у)  $2x$ ; р)  $-\frac{1}{x^2}$ ; q)  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ ; η)  $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ ; т)  $\cos x$ ; q)  $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ; т)  $\frac{1}{1+x^2}$ ; 844. у) 5; р) -2; q) 4; η)  $\frac{\pi}{4} + 1$ ; т) 0; 846. Ω; 848.  $5x^4 - 3x^2$ ; 849.  $2x(3x-2)(1-x^3) + 3(x^2+1)(1-x^3) - 3x^2(x^2+1)(3x-2)$ ; 850.  $\frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ ; 851.  $\frac{2(1-2x)}{(1-x+x^2)^2}$ ; 852.  $\frac{1-x+4x^2}{(1-x)^3(1+x)^4}$ ; 853.  $(-3x^5 + 5x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 6x + 12)/(1-x)^3$ ; 854.  $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ ; 855.  $-\frac{2}{3\sqrt[3]{x^5}}$ ; 856.  $\frac{x-1}{2x\sqrt{x}}$ ; 857.  $-\left(\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x^3} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}\right)$ ; 858.  $\frac{5}{4}\sqrt[4]{x}$ ; 859.  $-\frac{8\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x^2} + 2}{6\sqrt[6]{x}(x - 2\sqrt[3]{x})^2}$ ; 860.  $\sin x - x \cos x + x^2 \sin x$ ; 861.  $\frac{x}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} + tgx$ ; 862.  $\frac{1}{1 + \cos x}$ ; 863.  $\frac{\sin x \cos^2 x + \sin^2 x \cos x + x \cos^3 x - x \sin^3 x}{1 + \sin 2x}$ ; 864.  $e^x(x^2 + 3x)$ ; 865.  $1 + \ln x + e^x(\cos x + \sin x)$ ; 866.  $2^x \ln 2ctgx - \frac{2^x}{\sin^2 x}$ ; 867.  $15(1+3x)^4$ ; 868.  $\frac{-3}{2\sqrt{2-3x}}$ ; 869.  $\frac{-2x}{3\sqrt[3]{(1-x^2)^2}}$ ; 870.  $\frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ ; 871.  $\frac{4}{\sqrt{(4-x^2)^3}}$ ; 872.  $\frac{3(1+x^2)^2(2x-x^2+1)}{(1-x)^4}$ ; 873.  $\frac{1+2\sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ ; 874.  $\frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+x\sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1+\frac{3}{2}\sqrt{x}}{2\sqrt{x+x\sqrt{x}}}\right)$ ; 875.  $\frac{2x^2}{1-x^6} \times \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}$ ; 876.  $9\sin^2 3x \cos 3x$ ; 877.  $-3\sin(3x-1)\sin 2x + 2\cos(3x-1) \times \cos 2x$ ; 878.  $\frac{2x}{\cos^2(x^2+1)}$ ; 879.  $x^2 \sin x$ ; 880.  $\frac{\cos 2x}{|\sin x + \cos x|}$ ; 881.  $2x \sin 2x^2$ ;

$$\begin{aligned}
& 882. -\frac{2x \sin\left(2\sqrt[3]{x^2-1}\right)}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^2}} : 883. \sin x + \frac{\sin x}{\cos^2 x} : 884. \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2}} - \frac{tg^2 x}{\cos^2 x} : 885. \\
& \frac{10(x+1)tg^4(x^2+2x-1)}{\cos^2(x^2+2x-1)} : 886. \frac{-2}{3\sin^2 x \sqrt[3]{ctgx}} : 887. 2x \sin(\sin x) + x^2 \cos x \times \\
& \times \cos(\sin x) : 888. \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} \cos\left(\cos \frac{1}{x}\right) : 889. -3 \frac{tg^2 x}{\cos^2 x} \sin(2tg^3 x) \times \\
& \times \cos(\cos^2(tg^3 x)) : 890. \frac{3 \sin 6x(1+ctg 3x)+3}{(1+ctg 3x)^2} : 891. \\
& \frac{x^4-1}{x^3 \cos^2(x^2+x^{-2}) \sqrt{1+tg(x^2+x^{-2})}} : 892. -\frac{2^{tg \frac{1}{x}} \ln 2}{x^2 \cos^2 \frac{1}{x}} : 893. e^{-x^2} (-2x \cos x/2 - \\
& -\frac{1}{2} \sin x/2) : 894. 2x(1-3x^3)e^{-2x^3} : 895. (2x \cos x^2 - \sin x \sin x^2)e^{\cos x} : 896. \\
& \frac{e^{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}}}{(1-x)^2 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}} : 897. -\sin x \operatorname{ch} \cos x : 898. e^{-2x} (-2\operatorname{ch} x^3 + 3x^2 \operatorname{sh} x^3) : 899. \\
& -2x \frac{\operatorname{sh}^2 x^2 + 2}{\operatorname{sh}^3 x^2} : 900. e^x e^{e^x} : 901. a^a x^{a^a-1} + ax^{a-1} a^{x^a} \ln a + a^x a^{a^x} \ln^2 a : 902. \\
& \frac{3}{3x+1} : 903. \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} : 904. \frac{\frac{1}{2\sqrt{x-1}} + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x^2+1}} : 905. \frac{6 \lg^2 x^2}{x \ln 10} : 906. \\
& \frac{12 \log_2^2(2x+3)^2}{(2x+3) \ln 2} : 907. 10^{\frac{x}{\log_3 x}} \cdot \ln 10 \cdot \frac{\log_3 \frac{x}{e}}{\log_3^2 x} : 908. \frac{(2x+1)}{2(x^2+x+1)} \times \\
& \times \frac{e^{\sqrt{\ln(x^2+x+1)}}}{\sqrt{\ln(x^2+x+1)}} : 909. \frac{-\sqrt{2} \sin x}{\sqrt{\cos 2x}} : 910. \frac{1}{x \ln x \ln \ln x} : 911. \frac{6}{x \ln x \ln^3 x} : 912. \\
& \frac{x}{x^4-1} : 913. \frac{1}{\cos x} : 914. \frac{-2 \sin x}{1+\cos x} \ln(1+\cos x) : 915. -\frac{1}{\cos x} : 916. \frac{\ln x}{x^5} : 917.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 2 \sin \ln x : \mathbf{918.} \quad \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} : \mathbf{919.} \quad \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} : \mathbf{920.} \quad \frac{-1}{x^2+2} : \mathbf{921.} \quad -\frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{1-x^2}} \\
& (x \neq 0) : \mathbf{922.} \quad \frac{2 \operatorname{sgn}(\sin x) \cos x}{\sqrt{1+\cos^2 x}} \quad (\sin x \neq 0) : \mathbf{923.} \quad \frac{1}{1+x^2} : \mathbf{924.} \quad \frac{-2 \operatorname{sgn} x}{1+x^2} \\
& (x \neq 0) : \mathbf{925.} \quad \frac{1}{2x\sqrt{x-1} \arccos \frac{1}{\sqrt{x}}} : \mathbf{926.} \quad \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} : \mathbf{927.} \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{\arcsin x^2} \frac{2x \ln \frac{1}{3}}{\sqrt{1-x^4}} : \\
& \mathbf{928.} \quad \frac{2x \operatorname{arctg} x^2}{(1+x^4)\sqrt{1+x^4}} : \mathbf{929.} \quad \frac{3^{\operatorname{arctg}(2x+\pi)} \cdot 2 \ln 3}{1+(2x+\pi)^2} : \mathbf{930.} \quad -\frac{xe^{2x}}{(e^{2x}-1)\sqrt{e^{2x}-1}} : \\
& \mathbf{931.} \quad \frac{\frac{x}{e^2}-1}{2(e^x+1)} : \mathbf{932.} \quad \frac{x \arcsin x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} : \mathbf{933.} \quad \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} : \mathbf{934.} \quad \frac{2x(\cos x^2 + \sin x^2)}{\sqrt{\sin(2x^2)}} : \\
& \mathbf{935.} \quad \frac{2 \sin 2x}{2-\sin^2 2x} : \mathbf{936.} \quad 2x[\operatorname{sgn} \cos x^2 + \operatorname{sgn} \sin x^2] \left(x^2 \neq \frac{\pi k}{2}, k \in Z_+\right) : \mathbf{937.} \\
& \frac{\sin \alpha \operatorname{sgn}(\cos x - \cos \alpha)}{1 - \cos \alpha \cos x} \quad (\cos x \neq \cos \alpha) : \mathbf{938.} \quad \sqrt{a^2-x^2} : \mathbf{939.} \quad \frac{2}{1+e^{2x}} - \\
& -e^{-x} \operatorname{arctg} e^x : \quad \mathbf{940.} \quad -8x^3 \operatorname{sgn} \sin 2x^4 \quad (\sin 2x^4 \neq 0) : \quad \mathbf{941.} \\
& -\frac{3 \ln^2 x \sin \ln^3 x}{4x(1+\cos \ln^3 x)\sqrt{\cos \ln^3 x} \sqrt{\operatorname{arctg} \sqrt{\cos \ln^3 x}}} : \mathbf{942.} \quad \frac{1}{(1+th^2x)ch^2x} : \mathbf{943.} \\
& \frac{\operatorname{sgn} shx}{chx} \quad (x \neq 0) : \mathbf{944.} \quad x^x(1+\ln x) : \mathbf{945.} \quad x^x x^{x^x} \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x}\right) : \mathbf{946.} \\
& e^x x^{e^x} \left(\ln x + \frac{1}{x}\right) : \mathbf{947.} \quad e^x (chx)^{e^x} (\ln chx + thx) : \mathbf{948.} \quad \frac{x^{\frac{1}{x}}(1-\ln x)}{x^2} : \mathbf{949.} \\
& x^{a-1} x^{x^a} (1+a \ln x) + a^x x^{a^x} \left(\ln a \ln x + \frac{1}{x}\right) + x^x a^{x^x} \ln a(1+\ln x) : \quad \mathbf{950.} \\
& \frac{(\ln x)^{x-1} \left[x - 2 \ln^2 x + x \ln x \cdot \ln \ln x\right]}{x^{\ln x+1}} : \mathbf{951.} \quad \sin x (\sin x)^{\cos x} (ctg^2 x - \ln \sin x) : \mathbf{952.} \\
& \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right)^{x \arcsin 2x} \left(\arcsin 2x \cdot \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \frac{2x}{\sqrt{1-4x^2}} \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \frac{x \arcsin 2x}{\sin x}\right) :
\end{aligned}$$

**953.**  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}\right)$ ; **954.**  $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^x \left(\ln \frac{\sin x}{x} + x \operatorname{ctgx} - 1\right)$ ; **955.**  
 $\frac{1-x-x^2}{x(1-x^2)}$ ; **956.**  $\frac{2x^3+4x^2-36x+54}{3x(1-x)(9-x^2)}$ ; **957.**  $\sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{x-a_k}$ ; **958.**  $\frac{n}{\sqrt{1+x^2}}$ ; **959.**  
 $1;-1$ ; **960.**  $1;-1$ ; **961.**  $2 \ln 2; -2 \ln 2$ ; **962.**  $\cos 1 + \sin 1$ ; **963.**  $1;-1$ ; **964.**  $-1; 2$ ;  
**965.**  $-\infty; 1$ ; **966.**  $(x-1)(x+1)^2(5x-1) \operatorname{sgn}(x+1)$ ; **967.**  $\frac{3}{2} \sin 2x |\sin x|$ ; **968.**  $-1$ ,  
 $\operatorname{tpp} x < 1$ ;  $2x-3$ ,  $\operatorname{tpp} 1 \leq x \leq 2$ ;  $1$ ,  $\operatorname{tpp} x > 2$ ; **969.**  
 $2(x-a)(x-b)(2x-a-b)$ ,  $\operatorname{tpp} x \in [a; b]$ ;  $0$ ,  $\operatorname{tpp} x \notin [a; b]$ ; **970.**  $1$ ,  $\operatorname{tpp} x < 0$ ;  
 $\frac{1}{1+x}$ ,  $\operatorname{tpp} x \geq 0$ ; **971.**  $2xe^{-x^2}(1-x^2)$ ,  $\operatorname{tpp} |x| \leq 1$ ;  $0$ ,  $\operatorname{tpp} |x| > 1$ ; **972.**  $\omega) R$ ,  
 $\frac{x(y)}{x(y)+1}$ ;  $\rho) [1; +\infty)$ ,  $\frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$  ( $y > 1$ );  $\text{q}) R$ ,  $\frac{1}{1+e^{x(y)}}$ ;  $\text{r}) (-1; 1)$ ,  $\frac{1}{1-y^2}$ ;  $\text{t})$   
 $R$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$ ; **973.**  $\sqrt[6]{\frac{(1-\sqrt{t})^4}{t(1-\sqrt[3]{t})^3}}$ ; **974.**  $\frac{2(t+1)}{(2t+1)(t^2+1)} \sqrt{t^2+t}$ ; **975.**  $-1$ ; **976.**  
 $-\frac{b}{a} \operatorname{ctgt}$ ; **977.**  $\frac{b}{a} \operatorname{ctht}$ ; **978.**  $-tg^3t$ ; **979.**  $-tgt$ ; **980.**  $\operatorname{ctg} \frac{t}{2}$ ; **981.**  $\operatorname{sgn} t$  ( $t \neq 0$ );  
**982.**  $\omega) y = \sqrt[3]{4}(x+1)$ ,  $y = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}(x+1)$ ;  $\rho) y = 3$ ,  $x = 2$ ; **983.**  $\omega) y = \pi x$ ,  
 $y = -\frac{1}{\pi}x$ ;  $\rho) y = -\frac{\pi}{2}(x-1)$ ,  $y = \frac{2}{\pi}(x-1)$ ; **984.**  $\omega) y = \frac{\pi}{3} + \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \times$   
 $\times (x-1)$ ,  $y = \frac{\pi}{3} - \frac{3}{2\pi - \sqrt{3}}(x-1)$ ;  $\rho) y = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\pi - 3\right)(x - \sqrt{3})$ ,  $y = \frac{\pi}{2} -$   
 $-\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{3}\pi - 3}(x - \sqrt{3})$ ; **985.**  $\omega) y = \frac{1}{64} + \frac{6-\pi}{32}\left(x - \frac{1}{4}\right)$ ,  $y = \frac{1}{64} + \frac{32}{\pi-6}\left(x - \frac{1}{4}\right)$ ;  
 $\rho) y = -\frac{\pi}{8}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ ,  $y = \frac{8}{\pi}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ ; **986.**  $\omega) 3x - 2y = 0$ ,  $2x + 3y = 0$ ;  $\rho)$   
 $3x - y - 1 = 0$ ,  $x + 3y - 7 = 0$ ; **987.**  $\omega) y = 1 - x$ ,  $y = 1 + x$ ;  $\rho) x = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}}$ ,

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}} : \mathbf{988.}$$

ա)  $y = x$ ,  $y = -x$ ; բ)  $3x - y - 4 = 0$ ,  $x + 3y - 3 = 0 : \mathbf{989.}$

$$\frac{\pi}{2}, \operatorname{arctg} \frac{3}{4} : \mathbf{990.} \operatorname{arctg} 3 : \mathbf{991.} \operatorname{arctg} 2\sqrt{2} : \mathbf{992.} \operatorname{arctg} \frac{9}{7} : \mathbf{993.}$$

ա)  $\left(-\frac{1}{2}; \frac{7}{4}\right);$

բ)  $(0; 2) : \mathbf{995.} b^2 - 4ac = 0. \mathbf{996.} \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2 = 0 : \mathbf{997.} a = \frac{1}{2e} : \mathbf{998.}$

$$-\frac{dx}{2\sqrt{x^3}} : \mathbf{999.} \left(-\sin x + \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}\right) dx : \mathbf{1000.} \left(\frac{-1}{2\sqrt{(1-x^2)} \operatorname{arccos} x} - 2^{-x} \ln 2\right) dx :$$

$$\mathbf{1001.} \frac{3^{\sqrt{\operatorname{arctg} x^2}} x \ln 3}{(1+x^4)\sqrt{\operatorname{arctg} x^2}} dx : \mathbf{1002.} \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}} dx : \mathbf{1003.} -\frac{6 \cos 2x}{\sin^4 2x} dx : \mathbf{1004.}$$

ա)

$vwdu + uwdv + uvdw$ ; բ)  $-\frac{udu + vdv}{(u^2 + v^2)^{\frac{3}{2}}}$ ; գ)  $\frac{vdu - udv}{u^2 + v^2}$ ; դ)  $\frac{udu + vdv}{u^2 + v^2} : \mathbf{1005.}$  ա)

$1 - 4x^3 - 3x^6$ ; բ)  $-\operatorname{ctg} x$ ; գ)  $\frac{1}{2x^2} \left(\cos x - \frac{\sin x}{x}\right)$ ; դ)  $-1 : \mathbf{1006.} 1, 007 : \mathbf{1007.}$

$0, 4849 : \mathbf{1008.} -0, 8747 : \mathbf{1009.} 0, 8104 : \mathbf{1010.} 0, 925 : \mathbf{1012.}$  Կարող է:  $\mathbf{1014.}$  ա)

Չի կարող; բ) կարող է:  $\mathbf{1015.}$  ա) Կարող է; բ) կարող է:  $\mathbf{1016.}$  ա) Այո; բ) այո; գ)

դիֆերենցիալի չէ  $x = \pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , կետերում:  $\mathbf{1020.} \frac{x(3+2x^2)}{\sqrt{(1+x^2)^3}} : \mathbf{1021.}$

$$\frac{3x}{\sqrt{(1-x^2)^5}} : \mathbf{1022.} 2e^{-x^2}(2x^2 - 1) : \mathbf{1023.} \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} : \mathbf{1024.} \frac{3x}{(1-x^2)^2} +$$

$$+ \frac{(1+2x^2) \arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^5}} : \mathbf{1025.} \frac{2x}{1+x^2} + 2 \operatorname{arctg} x : \mathbf{1026.} x^x(1+\ln x)^2 + x^{x-1} : \mathbf{1029.}$$

$$\frac{(-1)^n 2^n n!}{(2x+3)^{n+1}} : \mathbf{1030.} \frac{(-1)^{n-1} n! c^{n-1} (ad-bc)}{(cx+d)^{n+1}} : \mathbf{1031.} n! \left[ \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} + \frac{1}{(1-x)^{n+1}} \right] :$$

$$\mathbf{1032.} (-1)^n n! \left[ \frac{1}{(x+1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right] : \mathbf{1033.} \frac{(2n-1)!!}{(1-2x)^{n+\frac{1}{2}}} : \mathbf{1034.}$$

$$\frac{(-1)^n}{3^n} 1 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (3n-5)(1-x)^{-n-\frac{1}{3}}(9n-2x-4), \quad n \geq 2 : \mathbf{1035.}$$

$$-2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{\pi n}{2}\right): \quad \mathbf{1036.} \quad \frac{3}{4} \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right) - \frac{3^n}{4} \sin\left(3x + \frac{\pi n}{2}\right): \quad \mathbf{1037.}$$

$$2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{\pi n}{2}\right) + 2^{2n-3} \cos\left(4x + \frac{\pi n}{2}\right): \quad \mathbf{1038.} \quad \frac{(a-b)^n}{2} \cos\left[(a-b)x + \frac{\pi n}{2}\right] +$$

$$+ \frac{(a+b)^n}{2} \cos\left[(a+b)x + \frac{\pi n}{2}\right]: \quad \mathbf{1039.} \quad \frac{1}{2} \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right) - \frac{3^n}{4} \sin\left(3x + \frac{\pi n}{2}\right) +$$

$$+ \frac{5^n}{4} \sin\left(5x + \frac{\pi n}{2}\right): \mathbf{1040.} -2^{n-3} \left[4x^2 \cos\left(2x + \frac{\pi n}{2}\right) + 4nx \cos\left(2x + \frac{\pi(n-1)}{2}\right) +$$

$$(n^2 - n) \cos\left(2x + \frac{\pi(n-2)}{2}\right)\right], \quad n \geq 3: \quad \mathbf{1041.} \quad \frac{(-1)^{n-1} (n-3)!}{(x+1)^n} (2x^2 + 2xn + n^2 - n),$$

$$n \geq 3: \quad \mathbf{1042.} \quad 5^n e^{3x} \sin(4x + n\varphi), \quad \varphi = \arcsin \frac{4}{5}: \quad \mathbf{1043.} \quad \frac{e^x}{2} + \frac{e^x}{2} 5^{\frac{n}{2}} \times$$

$$\times \cos(2x + n\varphi), \quad \varphi = \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}: \quad \mathbf{1044.} \quad \frac{1}{2} \left\{ [(x+n) - (-1)^n (x-n)] chx +$$

$$+ [(x+n) + (-1)^n (x-n)] shx \right\}: \quad \mathbf{1045.} \quad y^{(2k)} = \frac{1}{2} (a+b)^{2k} ch(a+b)x +$$

$$+ \frac{1}{2} (a-b)^{2k} ch(a-b)x, \quad y^{(2k-1)} = \frac{1}{2} (a+b)^{2k-1} sh(a+b)x + \frac{1}{2} (a-b)^{2k-1} \times$$

$$\times sh(a-b)x, \quad k \in N: \quad \mathbf{1046.} \quad e^x \left[ x^n + n^2 x^{n-1} + \frac{n^2 (n-1)^2}{2!} x^{n-2} + \dots + n! \right]: \quad \mathbf{1047.}$$

$$a_n n!: \quad \mathbf{1048.} \quad -\frac{(n-1)!}{(1-x^2)^n} \left[ (1+x)^n + (-1)^{n-1} (1-x)^n \right]: \quad \mathbf{1051.} \quad \frac{3}{4(1-t)}: \quad \mathbf{1052.}$$

$$-\frac{1}{a \sin^3 t}: \quad \mathbf{1053.} \quad \frac{\cos \frac{t}{2}}{4a^2 \sin^7 \frac{t}{2}}: \quad \mathbf{1054.} \quad \frac{e^{-2t} (2 \sin t + \cos t)}{\sqrt{2} \cos^5 \left( t + \frac{\pi}{4} \right)}: \quad \mathbf{1055.} \quad \frac{t^2 - 1}{(1+t^2) \sqrt{1+t^2}}:$$

$$\mathbf{1056.} \quad \frac{t + 2t \cos^2 t + \frac{1}{2} \sin 2t}{4t^3 \sin^4 t}: \quad \mathbf{1057.} \quad y'' - 5y' + 6y = 0: \quad \mathbf{1058.} \quad v'' -$$

$$- [1 + 4e^{4s} q(e^{2s})] v = 0: \quad \mathbf{1059.} \quad r'' - r = 0: \quad \mathbf{1060.} \quad 2(uu'' + u'^2): \quad \mathbf{1061.} \quad uv'' +$$

$+ 2u'v' + vu''$ : **1062.**  $\frac{v(u''v - uv'') - 2v'(vu' - uv')}{v^3}$ : **1063.**  $\frac{uu'' - u'^2}{u^2} - \frac{vv' - v'^2}{v^2}$ :  
**1064.**  $\frac{(u^2 + v^2)(uu'' + vv'') + (u'v - uv')^2}{(u^2 + v^2)^{\frac{3}{2}}}$ : **1065.**  $u^v \left[ \left( v \frac{u'}{u} + v' \ln u \right)^2 + \frac{2u'v'}{u} + v \frac{uu'' - u'^2}{u^2} + v'' \ln u \right]$ : **1066.**  $y'' = 4x^2 f''(x^2) + 2f'(x^2)$ ,  $y''' = 8x^3 f'''(x^2) + 12xf''(x^2)$ : **1067.**  $y'' = \frac{1}{x^4} f''\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^3} f'\left(\frac{1}{x}\right)$ ,  $y''' = -\frac{1}{x^6} f'''\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{6}{x^5} f''\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{6}{x^4} f'\left(\frac{1}{x}\right)$ : **1068.**  $y'' = e^{2x} f''(e^x) + e^x f'(e^x)$ ,  $y''' = e^{3x} f'''(e^x) + 3e^{2x} f''(e^x) + e^x f'(e^x)$ : **1069.** 6 : **1070.** 59 : **1071.** 98,5 ; 13,5 : **1072.**  $v = \beta - 2\gamma t$ ,  $a = -2\gamma$  ;  
 աճիվը կանգ կառնի, երբ  $t = \frac{\beta}{2\gamma}$  : **1073.** 26450 : **1076.**  $\frac{5h}{h-1,7}$  կմ/ժ : **1077.** 6 :  
**1078.**  $-\frac{3y}{\sqrt{100-y^2}}$  ; -2,25 : **1079.** Օրդինատը փոփոխվում է ավելի արագ, երբ  $|x| > 2$ , ավելի դանդաղ՝ երբ  $|x| < 2$  : **1080.** ա) 0 ; բ)  $n!$  ; գ)  $n! \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  ; դ) 0 ; ե)  $\frac{1}{2}$  :  
**1081.**  $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$  : **1082.**  $\pi[x] \sin 2\pi x$  : **1083.**  $y' = -\frac{2(x+1) \operatorname{arctg} \frac{1}{x+1}}{x^2+2x+2} + \operatorname{arctg}^2 \frac{1}{x+1} + 2$ , երբ  $x \neq -1$ ,  $y'(-1) = \frac{\pi^2}{4} + 2$  : **1084.**  $\frac{1}{x^2+1}$ , երբ  $-1 < x \leq 1$ ,  $\frac{1}{2}$ , երբ  $|x| > 1$  : **1086.** ա)  $a = 0$ ,  $f'(0) = 1$  ; բ)  $a = 0$ ,  $f'(0) = 1$  : **1088.**  $a = 2$ ,  $b = -1$  : **1089.**  $a = 1$ ,  $b = 1$  : **1090.**  $a = 1,5$ ,  $b = -0,5$  : **1091.**  $a = b$  : **1092.**  $a_1 = -1$ ,  $b_1 = \pi/2$ ,  $a_2 = 1$ ,  $b_2 = \pi/2$  : **1093.**  $a_1 = -\pi/2$ ,  $b_1 = \pi/2$ ,  $a_2 = \pi$ ,  $b_2 = \pi$  : **1094.**  $a_1 = -\frac{\pi+1}{4}$ ,  $b_1 = \frac{2\pi+1}{4}$ ,  $a_2 = \frac{\pi+1}{4}$ ,  $b_2 = -\frac{2\pi+1}{4}$  : **1095.**  $a_1 = -\frac{1}{2}$ ,  $b_1 = -\frac{1}{2e^2}$ ,  $a_2 = 3e$ ,  $b_2 = -2e^2$  : **1096.**  $f(x) = \frac{x \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x}{x^2}$ ,  $x \neq 0$  ;

$f'(0)=0$ : 1097.  $\frac{1}{(1-x)^2}$ : 1098. Գիֆերենցելի չէ  $x=1$  կետում: 1099.

Գիֆերենցելի չէ  $\left\{ \frac{2k-1}{2}\pi : k \in Z \right\}$  բազմության կետերում: 1100. Գիֆերենցելի

է: 1101.  $f'(0)=0$ : 1102.  $f'(0)=0$ ,  $f''(0)=0$ : 1103.  $f'(0)=0$ : 1104.

$f'(0)=0$ ,  $f''(0)=0$ ,  $f'''(0)=1$ ,  $f^{(4)}(0)=0$ : 1106. ա)  $\alpha > 0$ ; բ)  $\alpha > 1$ ; գ)

$\alpha > 2$ : 1107. ա)  $\alpha \geq \beta + 1$ ; բ)  $1 < \alpha < \beta + 1$ : 1110.  $\varphi(a)$ : 1111.  $f'_-(a) = -\varphi(a)$ ,

$f'_+(a) = \varphi(a)$ : 1115.  $f'_-(k) = (-1)^k(k-1)\pi$ ,  $f'_+(k) = (-1)^k k\pi$ ,  $k \in Z$ : 1116.

$f'_-(0) = -1$ ,  $f'_+(0) = 1$ ,  $f'_-(\pm\sqrt{(2k+1)\pi}) = \mp\infty$ ,  $k \in Z_+$ ,  $f'_+(\pm\sqrt{2\pi k}) = \pm\infty$ ,

$k \in N$ : 1117.  $f'_-\left(\frac{2}{2k+1}\right) = -(2k+1)\frac{\pi}{2}$ ,  $f'_+\left(\frac{2}{2k+1}\right) = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ ,  $k \in Z$ :

1118.  $f'_-(0) = -1$ ,  $f'_+(0) = +\infty$ : 1119.  $f'_+(1) = -\infty$ ,  $f'_-(1) = \frac{1}{2}$ : 1120.

$f'_-(4) = -\frac{\pi}{2}$ ,  $f'_+(4) = \frac{\pi}{2}$ : 1121.  $f'_-(\pm 1) = -1$ ,  $f'_+(\pm 1) = 1$ : 1122.  $f'_-(\pm 1) = \pm 1$ ,

$f'_+(\pm 1) = \mp 1$ : 1123.  $f'_-(0) = -1$ ,  $f'_+(0) = 0$ : 1124.  $f'_-(0) = \sqrt{2}$ ,  $f'_+(0) = -\sqrt{2}$ :

1125.  $f'_-(0) = -1$ ,  $f'_+(0) = 1$ : 1126.  $f'_-(0) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $f'_+(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ : 1127.

$f'_-(0) = 1$ ,  $f'_+(0) = 0$ : 1128.  $f'_-(0) = 2$ ,  $f'_+(0) = 0$ : 1129.  $f'_-(0) = 0$ ,  $f'_+(0) = 0$ :

1132. ա), բ), գ) Կարող է դիֆերենցելի լինել, կարող է և չլինել: 1134.

Ընդհանրապես՝ ոչ: 1135. ա)  $\frac{1-(n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}$ , բ)

$\frac{(1+x-(n+1)^2x^n + (2n^2+2n-1)x^{n+1} - n^2x^{n+2})}{(1-x)^3}$ : 1136.

$\frac{\frac{1}{2}\sin nx - n\cos(n+\frac{1}{2})x\sin\frac{x}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}}$ ; բ)  $\frac{n\sin(n+\frac{1}{2})x\sin\frac{x}{2} - \sin^2\frac{nx}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}}$ : 1137. ա)

$\frac{\sin nx(2n\cos nx\sin x - \sin nx\cos x)}{\sin^2 x}$ ; բ)  $\frac{\sin 2nx\cos x - 2n\cos 2nx\sin x}{2\sin^2 x}$ : 1138.

$\frac{1}{2^n}\operatorname{ctg}\frac{x}{2^n} - \operatorname{ctg}x$ : 1139.  $\frac{1}{3(y^2+1)}$ : 1140.  $\frac{1}{1-\varepsilon\cos y}$ : 1143. ա)  $3x^2+15$ ; բ)



$$6x^2: 1144. \text{ у) } \operatorname{tg}(\varphi + \operatorname{arctg}\varphi); \text{ п) } -\operatorname{ctg}\frac{3\varphi}{2}; \text{ қ) } \operatorname{tg}\left(\varphi + \operatorname{arctg}\frac{1}{m}\right): 1145.$$

$$x = \pi k, \quad k \in Z: 1146. \frac{\pi}{3}: 1151. \text{ у) } \frac{1}{2^{n-1}\sqrt{1-x^2}} \left\{ \frac{(2n-3)!!}{(1+x)^{n-1}} - \right. \\ \left. - (n-1) \frac{(2n-5)!! \cdot 1!!}{(1+x)^{n-2}(1-x)} + \frac{(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2} \frac{(2n-7)!! \cdot 3!!}{(1+x)^{n-3}(1-x)^2} + \dots \right\}, \quad n > 3; \text{ п) } \\ \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x^2)^{\frac{n}{2}}} \sin(\operatorname{arccctg}x): 1152. n! \varphi(a): 1154. f^{(n)}(0) = 0: 1155. f^{(n)}(0) = 0:$$

$$1156. a = \frac{1}{2} f''(x_0), \quad b = f'(x_0), \quad c = f(x_0): 1160. \text{ у) } \text{Ընդհանրապես` ոչ}; \text{ п) } \\ \text{այո: } 1161. \text{Ընդհանրապես` ոչ}; 1162. \Omega; 1163. \Omega; 1188. \text{ у) } 1) \ x, \ 2) \\ -\frac{1}{5}x^3 + \frac{6}{5}x; \text{ п) } 1) \ \operatorname{ch}2 - x \operatorname{sh}2, \ 2) \ \left( -\frac{3}{4}e^2 - \frac{e^{-2}}{4} \right) x^3 + e^2 x^2 - \operatorname{sh}2 + \\ + \left( \frac{3}{4}e^{-2} + \frac{1}{4}e^2 \right) x:$$

## Գլուխ 6

$$1194. \text{ у) } \cup; \text{ п) } \cap; 1199. \xi = (a+b)/2: 1200. \text{ у) } \theta = 1/2; \text{ п) } \\ \theta = \frac{x}{\Delta x} \left( \sqrt{1 + \frac{\Delta x}{x}} - 1 \right) \quad (x(x+\Delta x) > 0); \text{ қ) } \theta = \frac{1}{\Delta x} \ln \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}: 1201. A(-1; -1); \\ C(1; 1): 1207. \frac{\pi}{4}, \text{ երբ } x \in (-\infty; 1); \quad -\frac{3\pi}{4}, \text{ երբ } x \in (1; +\infty): 1211. P(x) = \\ = 3 - 3(x+1)^2 + (x+1)^3: 1212. 1 + 2x + \frac{2^2}{2!}x^2 + \dots + \frac{2^n}{n!}x^n: 1213. x - x^2 + \frac{x^3}{2!} + \\ + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{(n-1)!}: 1214. 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{n!}: 1215. \frac{4^2}{2!}x^2 - \frac{4^4 x^4}{4!} + \\ + \dots + (-1)^{n-1} \frac{4^{2n}}{(2n)!}x^{2n}: 1216. \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 + \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{2n}: 1217.$$

$$-(x-1)^2 + \frac{(x-1)^3}{2} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n-1} : 1218. x^3 + \frac{3^2}{2!} x^5 + \dots + \frac{3^{2n}}{(2n)!} x^{2n+3} :$$

1219.  $1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{2n!} : 1220. 1 + x^2 + \dots + x^{2n} : 1221. -x^3 - \frac{x^6}{2} - \dots - \frac{x^{3n}}{n} :$

1222.  $1 + \frac{\ln a}{1!} x + \frac{\ln^2 a}{2!} x^2 + \dots + \frac{\ln^n a}{n!} x^n : 1223. \frac{x-1}{\ln a} - \frac{(x-1)^2}{2 \ln a} + \dots +$   
 $+ (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n \ln a} 1224. \text{ у) } \Phi_{npp} \text{ т } \frac{e}{(n+1)!} \text{-hg; p) } \psi_{npp} \text{ т } \frac{1}{3840} \text{-hg; q) } \psi_{npp}$   
 $\text{т } 2 \cdot 10^{-6} \text{-hg; н) } \psi_{npp} \text{ т } \frac{1}{16} \text{-hg; } 1225. |x| \leq \frac{\sqrt[4]{24}}{10} : 1227. \text{ у) } 3,107 ; \text{ p) } 3,0171 ; \text{ q) } 1,1535 ;$   
 $\text{н) } 0,309 ; \text{ т) } 0,00995 ; \text{ q) } 1,121 : 1228. \text{ у) } 2,718282 ; \text{ p) } 0,021 ; \text{ q) } 0,01745 ;$   
 $\text{н) } 2,2361 : 1229. -\frac{1}{12} : 1230. 1/3 : 1231. 0 : 1232. \ln^2 3 : 1233. 1/3 : 1234. 1/2 :$   
 $1235. 1/6 : 1236. -1/4 : 1237. 0 : 1238. 1/3 : 1239. 1/2 : 1240. 1/2 : 1241. 1 + 2x + 2x^2 - 2x^4 :$   
 $1242. 1 + 2x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{6}x^4 - \frac{1}{15}x^5 : 1243. 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} - \frac{x^4}{720} :$   
 $1244. -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} : 1245. x - \frac{x^3}{3} : 1246. x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} :$   
 $1247. x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} : 1248. x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} +$   
 $+ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cdot \frac{x^9}{9} : 1249. 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 : 1250. \frac{a}{b} : 1251. 1 : 1252. 2 :$   
 $1253. -2 : 1254. \frac{1}{2} : 1255. \frac{1}{2} : 1256. 0 : 1257. -\frac{1}{3} : 1258. \frac{1}{3} : 1259. \frac{1}{6} : 1260. \frac{\ln a}{6} :$   
 $1261. 1 : 1262. \frac{1}{2} : 1263. 1/e : 1264. -e/2 : 1265. 1 : 1266. 1/6 : 1267. 1 : 1268. (a/b)^2 :$   
 $1269. 1/e : 1270. 1 : 1271. 0 : 1272. 0 : 1273. 2 : 1274. 1 : 1275. 2/3 : 1276. -2 : 1277. a^a(\ln a - 1) : 1278. 1/a : 1279. e^{-\frac{1}{6}} : 1280. e^{-\frac{2}{\pi}} : 1281. 1 :$   
 $1282. e^{-\frac{1}{6}} : 1283. e^{-\frac{1}{3}} : 1284. 2\pi : 1285. 0 : 1286. 0 : 1287. e^{-\frac{1}{2}} : 1288. 1/e : 1289. \frac{mn}{n-m} :$   
 $1290. \sqrt{e} : 1291. \frac{2}{3} : 1292. \Omega : 1293. \text{ т } (-\infty; 0] \text{ т } [0; +\infty) \text{ т } \psi_{npp}$

կայքերում, աճող  $[0;2]$  միջակայքում: **1294.** Նվազող է  $\left[0; \frac{4}{11}\right]$  միջակայքում, աճող  $(-\infty;0]$  և  $\left[\frac{4}{11};+\infty\right)$  միջակայքերում: **1295.** Նվազող է  $(-\infty;-1)$ ,  $[1/9;1)$  և  $[3;+\infty)$  միջակայքերում, աճող  $(-1;1/9]$  և  $(1;3]$  միջակայքերում: **1296.** Նվազող է  $(0;1]$  և  $[e^4;+\infty)$  միջակայքերում, աճող  $[1;e^4]$  միջակայքում: **1297.** Նվազող է  $(0;+\infty)$  միջակայքում: **1298.** Նվազող է  $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k\right]$ ,  $k \in Z$ , միջակայքերում, աճող  $\left[\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{5\pi}{6} + \pi k\right]$ ,  $k \in Z$ , միջակայքերում: **1299.** Նվազող է  $(0;e^{-1}]$  միջակայքում, աճող  $[e^{-1};+\infty)$  միջակայքում: **1300.** Նվազող է  $[e;+\infty)$  միջակայքում, աճող  $(0;e]$  միջակայքում: **1301.** Նվազող է  $(-\infty;-1]$  և  $(0;1]$  միջակայքերում, աճող  $[-1;0)$  և  $[1;+\infty)$  միջակայքերում: **1302.** Աճող է  $R$ -ում: **1303.** Նվազող է  $(-\infty;0]$  և  $[2/\ln 2;+\infty)$  միջակայքերում, աճող  $[0;2/\ln 2]$  միջակայքում: **1304.** Նվազող է  $[\sqrt{e};+\infty)$  միջակայքում, աճող  $(0;\sqrt{e}]$  միջակայքում: **1305.** ա)  $\Omega$ ; բ)  $\eta$ : **1308.** Ուռուցիկ է  $(-\infty;1]$ -ում, գոգավոր  $[1;+\infty)$ -ում,  $x=1$ -ը շրջման կետ է: **1309.** Ուռուցիկ է  $\left(-\infty;-\frac{a}{\sqrt{3}}\right]$  և  $\left[\frac{a}{\sqrt{3}};+\infty\right)$  միջակայքերում, գոգավոր  $\left[-\frac{a}{\sqrt{3}}; \frac{a}{\sqrt{3}}\right]$  միջակայքում, շրջման կետերն են  $\mp \frac{a}{\sqrt{3}}$ : **1310.** Ուռուցիկ է  $R_+$ -ում, գոգավոր  $R_-$ -ում,  $x=0$ -ն շրջման կետ է: **1311.** Ուռուցիկ է  $R$ -ում: **1312.** Ուռուցիկ է  $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$ ,  $k \in Z$ , միջակայքերում, գոգավոր  $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$ ,  $k \in Z$ , միջակայքերում, շրջման կետերն են  $x = \pi k$ ,  $k \in Z$ : **1313.** Ուռուցիկ է  $\left(-\infty;-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$  և  $\left[\frac{\sqrt{2}}{2};+\infty\right)$  միջակայքերում, գոգավոր  $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$  միջակայքում, շրջման կետերն են  $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ : **1314.** Ուռուցիկ է  $[-1;1]$  միջակայքում, գոգավոր  $(-\infty;-1]$  և

$[1; +\infty)$  միջակայքերում, շրջման կետերն են՝  $\pm 1$ : **1315.** Ուռուցիկ է  $\left[ e^{-\frac{3\pi}{4}+2\pi k}; e^{\frac{\pi}{4}+2\pi k} \right]$ ,  $k \in Z$ , միջակայքերում, գոգավոր՝  $\left[ e^{\frac{\pi}{4}+2\pi k}; e^{\frac{5\pi}{4}+2\pi k} \right]$ ,

$k \in Z$ , միջակայքերում, շրջման կետերն են՝  $x = e^{\frac{\pi}{4}+\pi k}$ ,  $k \in Z$ : **1316.** Ուռուցիկ է  $(0; +\infty)$  միջակայքում: **1319.**  $x_{\max} = 1/2$ : **1320.**  $x = 1$ -ը կրիտիկական կետ է:

**1321.**  $x_{\min} = 1$ : **1322.**  $x_{\max} = \frac{m}{m+n}$ ; երբ  $m$ -ը գույզ է,  $x_{\min} = 0$ ; երբ  $n$ -ը գույզ է,  $x_{\min} = 1$ : **1323.**  $x_{\max} = 2\pi k$ ,  $x_{\min} = \pi + 2\pi k$  ( $k \in Z$ ): **1324.**  $x_{\min} = 0$ : **1325.**

$x_{\min} = 0$ : **1326.**  $x_{\min} = -1$ ,  $x_{\max} = 9$ : **1327.**  $x_{\min} = 0$ : **1328.**  $x_{\min} = 1$ ,  $x_{\max} = \frac{1}{3}$ ,

$x = 0$ -ն կրիտիկական կետ է: **1329.**  $x_{\max} = 1$ ,  $y(1) = 0$ ;  $x_{\min} = 3$ ,  $y(3) = -4$ :

**1330.**  $x_{\max} = \pm 1$ ,  $y(1) = y(-1) = 1$ ;  $x_{\min} = 0$ ,  $y(0) = 0$ : **1331.**  $x_{\min} = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$ ,

$y\left(\frac{5 + \sqrt{13}}{6}\right) \approx -0,05$ ,  $y\left(\frac{5 - \sqrt{13}}{6}\right) \approx -0,76$ ;  $x_{\max} = 1$ ,  $y(1) = 0$ : **1332.**

$x_{\max} = -1$ ,  $y(-1) = -2$ ;  $x_{\min} = 1$ ,  $y(1) = 2$ : **1333.**  $x_{\min} = -1$ ,  $y(-1) = -1$ ;

$x_{\max} = 1$ ,  $y(1) = 1$ : **1334.**  $x_{\min} = \frac{7}{5}$ ,  $y\left(\frac{7}{5}\right) = -\frac{1}{24}$ : **1335.**  $x_{\min} = \frac{3}{4}$ ,

$y\left(\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{8}\sqrt[3]{2}$ : **1336.**  $x_{\max} = 1$ ,  $y(1) = 1/e$ : **1337.**  $x_{\min} = 1$ ,  $y(1) = 0$ ;

$x_{\max} = e^2$ ,  $y(e^2) = 4/e^2$ : **1338.**  $x_{\max} = \pi k$ ,  $y(\pi k) = (-1)^k + 1/2$ ,  $k \in Z$ ;

$x_{\min} = \pm 2\pi/3 + 2\pi k$ ,  $y(\pm 2\pi/3 + 2\pi k) = -3/4$ ,  $k \in Z$ : **1339.**  $x_{\max} = \pi k$ ,

$y(\pi k) = 10$ ,  $k \in Z$ ;  $x_{\min} = \pi/2 + \pi k$ ,  $y(\pi/2 + \pi k) = 5$ ,  $k \in Z$ : **1340.**  $x_{\max} = 1$ ,

$y(1) = \pi/4 - \ln 2/2$ : **1341.**  $x_{\min} = -\pi/4 + 2\pi k$ ,  $y(-\pi/4 + 2\pi k) = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}+2\pi k}$ ,

$k \in Z$ ;  $x_{\max} = 3\pi/4 + 2\pi k$ ,  $y(3\pi/4 + 2\pi k) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{3\pi}{4}+2\pi k}$ ,  $k \in Z$ : **1342.**

$x_{\min} = -1$ ,  $y(-1) = -2e$ ;  $x_{\max} = 3$ ,  $y(3) = 6e^{-3}$ : **1343.**  $\min y = 1/2$ ,

$\max y = 32$ : **1344.**  $\min y = 0$ ,  $\max y = 4$ : **1345.** ա)  $\min y = -47$ ,  $\max y = 1$ ;

բ)  $\min y = -47$ ;  $\max y = 466$ : **1346.** ա)  $\min y = 3$ ,  $\max y = 19$ ; բ)

$\min y = -17$ ,  $\max y = 3$ : **1347**.  $\min y = -138$ ,  $\max y = 16$ : **1348**.  $\min y = 0$ ,  $\max y = 132$ : **1349**.  $\min y = 0$ ,  $\max y = 1$ : **1350**.  $\min y = -2/e$ ,  $\max y = 0$ : **1351**.  $\min y = 1$ ,  $\max y = 3$ : **1352**.  $\min y = 0$ ,  $\max y = 4/3$ : **1353**.  $\inf y = 0$ ,  $\max y = 1/(2e)$ : **1354**.  $\inf y = 0$ ,  $\max y = (\sqrt{2} + 1)/2$ : **1355**.  $\min y = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{3\pi}{4}}$ ,  $\max y = 1$ : **1356**.  $\min y = 0$ ,  $\max y = 7/5$ : **1357**. ա)  $\inf y = 0$ ,  $\sup y = 2$ ; բ)  $\min y = -1/4$ ,  $\sup y = 2$ ; գ)  $\min y = -1/4$ ,  $\max y = 3/4$ : **1358**.  $\max x_n = (10/e)^{10}$ : **1359**.  $\max x_n = \sqrt[3]{3}$ : **1360**.  $y = x/2 + 1/4$ , երբ  $x \rightarrow \infty$ ;  $x = 1/2$ : **1361**.  $y = x/2$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$ ;  $y = -x/2$ , երբ  $x \rightarrow -\infty$ : **1362**.  $y = x$ , երբ  $x \rightarrow \infty$ ;  $x = 0$ : **1363**.  $y = 2x$ , երբ  $x \rightarrow -\infty$ : **1364**.  $x = 0$ ;  $y = 0$ : **1365**.  $y = \pi x/2 - 1$ , երբ  $x \rightarrow +\infty$ ;  $y = -\pi x/2 - 1$ , երբ  $x \rightarrow -\infty$ : **1412**.

$(m+n) \left( \frac{a^{mn}}{m^m n^n} \right)^{\frac{1}{m+n}}$ : **1413**.  $m^m n^n \left( \frac{a}{m+n} \right)^{m+n}$ : **1414**.  $\sqrt{S}$  կողմով քառակուսի:

**1415**.  $\frac{P}{4}$  կողմով քառակուսի: **1416**.  $30^\circ$ ,  $60^\circ$ : **1417**.  $b = \frac{d}{\sqrt{3}}$ ;  $h = d\sqrt{\frac{2}{3}}$ : **1418**.

$S = \frac{bh}{4}$ : **1419**.  $V = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}l^3$ : **1420**.  $S = \pi R^2(1 + \sqrt{5})$ : **1421**.  $V = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}R^3$ : **1422**.

Եթե  $\sqrt{2}b < a$ , ապա մեծագույն լարն ունի  $|MB| = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}}$  երկարություն, որ-

տեղ  $M$ -ի կոորդինատներն են  $\left( \pm \frac{a^2}{a^2 - b^2} \sqrt{a^2 - 2b^2}; \frac{b^3}{a^2 - b^2} \right)$ ; եթե  $\sqrt{2}b \geq a$ ,

ապա մեծագույն լարն ունի  $|MB| = 2b$  երկարություն, որտեղ  $M$ -ի կոորդի-

նատներն են  $(0; b)$ : **1423**. Շոշափման կետերն են  $\left( \pm \frac{a}{\sqrt{2}}; \pm \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ : **1424**.

$a \left( 1 + 3\sqrt{\frac{S_B}{S_A}} \right)^{-1}$ : **1425**.  $\frac{R}{\sqrt{2}}$ , որտեղ  $R$ -ը սեղանի շառավիղն է: **1426**.  $\arctg k$ :

**1427**. Հորիզոնի նկատմամբ ձողի կազմած  $\alpha$  անկյունը որոշվում է

$\cos \alpha = \frac{l + \sqrt{l^2 + 128a^2}}{16a}$  հավասարումից: **1439**. ա)  $1/2$ ,  $\sqrt{2}$ ; բ)  $1$ : **1442**. Ոչ:

**1456.** Այն: **1457.** ա) Այն; բ)  $e^{-\frac{1}{x^2}}$ : **1458.** Այն: **1459.**  $x^7/30$ : **1460.**  $x^2$ : **1461.**  $x/2$ : **1462.**  $2x$ : **1463.**  $a=-2/5$ ,  $b=-1/15$ : **1464.**  $a=1/2$ ,  $b=d=1/12$ ,  $c=-1/2$ : **1465.** ա)  $a=1/6$ ,  $b=2/3$ ,  $n=4$ : բ)  $a=4/15$ ,  $b=3/5$ ,  $n=7$ ; գ)  $a=-17/60$ ;  $b=-9/20$ ,  $n=7$ ; դ)  $a=1$ ,  $b=c=1/2$ ,  $n=4$ ; ե)  $a=(k+1)/2k$ ,  $b=(k-1)/2k$ ,  $n=3$ : **1466.** Գիֆերենցեյի են: **1467.**  $f(h)=\ln x + \frac{h}{x} - \frac{h^2}{2x^2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{h^n}{nx^n} + o(h^n)$ : **1486.** Նվազող է, երբ  $t \in (-\infty; -1]$ , աճող է, երբ  $t \in [-1; 1]$  կամ  $t \in [1; +\infty)$ : **1487.** Նվազող է, երբ  $t \in [-1; 1]$ , աճող է, երբ  $t \in (-\infty; -1]$  կամ  $t \in [1; +\infty)$ : **1488.** Աճող է, երբ  $t \in (-\infty; 0]$  կամ  $t \in [0; +\infty)$ : **1489.** Նվազող է, երբ  $t \in (0; 1/e)$  կամ  $t \in (e; +\infty)$ , աճող է, երբ  $t \in (1/e; e)$ : **1490.** Նվազող է, երբ  $t \in [\pi k/2; \pi(k+1)/2]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ : **1491.** Նվազող է, երբ  $t \in (-\infty; 0]$ , աճող է, երբ  $t \in [0; +\infty)$ : **1496.**  $h=1/\sqrt{2}\sigma$ : **1504.** Ոչ: **1510.**  $4/27$ : **1511.**  $\frac{9+6\sqrt{3}}{4}$ : **1512.**  $q=-1/2$ : **1513.**  $f(x)=\frac{x+2}{3}$ : **1514.**  $f(x)=x-\frac{1}{8}$ : **1516.** ա)  $y=0$ ,  $x=-1$ ; բ)  $y=\pm \frac{x}{2}-\frac{1}{2}$ : **1528.** Մեկ արմատ  $(3; +\infty)$  միջակայքում: **1529.** Երբ  $a > 4$ , հավասարումն ունի մեկ արմատ  $(1; +\infty)$  միջակայքում; երբ  $a < -4$ ՝ մեկ արմատ  $(-\infty; -1)$  միջակայքում; երբ  $-4 < a < 4$ ՝ մեկական արմատ  $(-\infty; -1)$ ,  $(-1; 1)$  և  $(1; +\infty)$  միջակայքերում; երբ  $a = -4$ ՝ մեկ արմատ  $(-\infty; -1)$ -ում և  $x=1$  կրկնակի արմատ; երբ  $a = 4$ ՝ մեկ արմատ  $(1; +\infty)$ -ում և  $x=-1$  կրկնակի արմատ: **1530.** Երբ  $k > 1/e$ ՝ արմատ չունի; երբ  $k = 1/e$ ՝  $x=e$ -ն կրկնակի արմատ է; երբ  $0 < k < 1/e$ ՝ մեկական արմատ  $(1; 1/k)$  և  $(1/k; +\infty)$  միջակայքերում; երբ  $k \leq 0$ ՝ մեկ արմատ  $(0; 1]$ -ում: **1531.** Երբ  $a \leq 0$ ՝ արմատ չունի; երբ  $0 < a < e^2/4$ ՝ մեկ արմատ  $(-\infty; 0)$ -ում; երբ  $a = e^2/4$ ՝ մեկ արմատ  $(-\infty; 0)$ -ում և  $x=2$  կրկնակի արմատ; երբ  $a > e^2/4$ ՝ մեկական արմատ  $(-\infty; 0)$ ,  $(0; 2)$  և  $(2; +\infty)$  միջակայքերում: **1532.** Երբ  $|a| > 3\sqrt{3}/16$  հավասարումն արմատ չունի; երբ  $-3\sqrt{3}/16 < a < 0$ ՝ մեկական արմատ  $(\pi/2; 2\pi/3)$ -ում և  $(2\pi/3; \pi)$ -ում; երբ  $0 < a < 3\sqrt{3}/16$ ՝ մեկական արմատ  $(0; \pi/3)$ -ում և  $(\pi/3; \pi/2)$ -ում; երբ  $a = 0$ ՝  $x=0$ -ն և  $x=\pi$ -ն եռապատիկ ար-

մատոներ են,իսկ  $x = \pi/2$ -ը պարզ արմատ է; երբ  $a = \pm 3\sqrt{3}/16$ , համապատասխանաբար  $x = \pi/2 \mp \pi/6$ -ը կրկնակի արմատ է: **1533.** Երբ  $|k| > sh\xi$ , որտեղ  $\xi$ -ն  $cthx = x$  հավասարման դրական արմատն է, ապա մեկական արմատ  $(0; \xi)$ -ում և  $(\xi; +\infty)$ -ում; երբ  $|k| < sh\xi$ , հավասարումն արմատ չունի: **1534.** ա)  $p^3/27 + q^2/4 > 0$ ; բ)  $p^3/27 + q^2/4 < 0$ : **1549.** Ոչ: **1578.** ա) Ոչ; բ) այո: **1581.** Ոչ: **1584.** Ոչ: **1594.** ա)  $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$ : **1598.** Ոչ: **1612.**

$$x^3 - 6x^2 + 9x + 2 : \mathbf{1613.} \alpha = \frac{1}{\ln 2} - 1; \beta = \frac{1}{2} :$$

Գլուխ 7

$$\mathbf{1614.} \frac{3}{4} \sqrt[3]{2x^{\frac{4}{3}}} : \mathbf{1615.} \frac{5}{4} \sqrt[5]{x^4/5} : \mathbf{1616.} \frac{x^5}{5} - x^3 : \mathbf{1617.} x^2 \left( \frac{2\sqrt{x}}{5} + 1 \right) -$$

$$- 2x \left( \frac{\sqrt{x}}{3} + 1 \right) : \mathbf{1618.} \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + \frac{9}{4} x^{\frac{4}{3}} + 3x + \frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} : \mathbf{1619.} \frac{8}{15} x^{\frac{15}{8}} : \mathbf{1620.} -e^{-x-3} : \mathbf{1621.}$$

$$\frac{(ae)^{x+1}}{1 + \ln a} : \mathbf{1622.} \ln|\ln x| : \mathbf{1623.} \sin(x+1) : \mathbf{1624.} \frac{1}{3} tg 3x : \mathbf{1625.} -x - ctgx : \mathbf{1626.}$$

$$-tgx - ctgx : \mathbf{1627.} tgx : \mathbf{1628.} 3x - \frac{2}{\ln 3 - \ln 2} \left( \frac{3}{2} \right)^x : \mathbf{1629.} 3\sqrt[3]{\sin x} : \mathbf{1630.}$$

$$-2\sqrt{1-tgx} : \mathbf{1631.} tg(1 + \ln x) : \mathbf{1632.} \frac{2}{3} (\ln x)^{\frac{3}{2}} : \mathbf{1633.} \sqrt{x^2 + 1} : \mathbf{1634.} \frac{-1}{\arcsin x} :$$

$$\mathbf{1635.} -\cos(e^x) : \mathbf{1636.} -e^{\cos x} : \mathbf{1637.} \frac{e^{x^2}}{2} : \mathbf{1638.} \ln|x| - \frac{1}{4x^4} : \mathbf{1639.} \arcsin x +$$

$$+ \ln(x + \sqrt{1+x^2}) : \mathbf{1640.} \frac{1}{5} \arcsin x^5 : \mathbf{1641.} \frac{5}{32} (2x^4 + 1)^{\frac{4}{5}} : \mathbf{1642.}$$

$$\frac{1}{2} \ln(e^{2x} + a^2) : \mathbf{1643.} -\frac{4}{15} (1-3x)^{\frac{5}{4}} : \mathbf{1644.} -\frac{1}{\ln 4} 2^{-2x-7} : \mathbf{1645.} \frac{1}{6} e^{6x} -$$

$$-\frac{3}{4} e^{4x} + \frac{3}{2} e^{2x} - x : \mathbf{1646.} \frac{1}{2} \arctg x^2 - \frac{1}{4} \ln(1+x^4) : \mathbf{1647.} x - 4 \ln|x+4| : \mathbf{1648.}$$

$$-x - 6 \ln|x-3| : \mathbf{1649.} x - \sqrt{2} \arctg \frac{x}{\sqrt{2}} : \mathbf{1650.} \frac{\sqrt{3}}{18} \ln \left| \frac{1+\sqrt{3x}}{1-\sqrt{3x}} \right| - \frac{x}{3} : \mathbf{1651.} x +$$

$$\begin{aligned}
& + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 : 1652. e^x + x - 2 \ln(1 + e^x) : 1653. \frac{a}{3} \operatorname{ch} 3x + \frac{b}{4} \operatorname{sh} 4x : 1654. x - \operatorname{th} x : \\
1655. \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{ch} x}{a} : 1656. \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| : 1657. \frac{1}{7} \ln \left| \frac{x-2}{x+5} \right| : 1658. \frac{1}{5} \ln \left| \frac{2x-3}{2x+2} \right| : 1659. \\
\operatorname{arctg} x - \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} : 1660. \frac{1}{b^2 - a^2} \left( \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} - \frac{1}{b} \operatorname{arctg} \frac{x}{b} \right) : 1661. \\
-\frac{2x+a+b}{(a-b)^2(x+a)(x+b)} + \frac{2}{(a-b)^3} \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| : 1662. \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x : 1663. \\
\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{16} \sin 8x : 1664. \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} : 1665. \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x : \\
1666. \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln |\cos x| : 1667. \frac{x}{4} + \frac{\sin 2x}{16} - \frac{\sin 4x}{16} - \frac{\sin 6x}{24} + \frac{\sin 10x}{80} : 1668. \\
\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x : 1669. \cos x + \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| : 1670. \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} : 1671. -e^{\frac{1}{x}} : 1672. \\
\frac{2}{3} (e^x + 1)^{\frac{3}{2}} : 1673. x - 2e^{-x} - \frac{1}{2} e^{-2x} : 1674. -2\sqrt{1-x^2} - \frac{2}{3} (\arcsin x)^{\frac{3}{2}} : 1675. \\
-\frac{1}{9} \sqrt{1-9x^2} - \frac{1}{9} (\arccos 3x)^3 : 1676. (\arcsin \sqrt{x})^2 : 1677. \ln \left| \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1} \right| : 1678. \\
2 \operatorname{arctg} \sqrt{x} : 1679. \frac{1}{8} \sqrt[3]{8x^3 + 27} : 1680. \frac{-1}{\sqrt{1+x^2}} : 1681. \ln |\ln \ln x| : 1682. \\
\frac{3}{2} (1 - \sin 2x)^{\frac{1}{3}} : 1683. -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \cos x + \sqrt{\cos^2 x - \frac{1}{2}} \right| : 1684. -\frac{4}{3} (\operatorname{ctg} x)^{\frac{3}{4}} : 1685. \\
\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left( \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}} \right) : 1686. \ln \left| \operatorname{tg} \left( \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| : 1687. \frac{2}{n+2} \ln \left( x^{\frac{n+2}{2}} + \sqrt{1+x^{n+2}} \right) : 1688. \\
\frac{1}{5\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^5}{\sqrt{3}} : 1689. \frac{1}{2(\ln 3 - \ln 2)} \ln \left| \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} \right| : 1690. -\ln(e^{-x} + \sqrt{1+e^{-2x}}) : \\
1691. -\frac{1}{e^x + 1} : 1692. \frac{1}{99(1-x)^{99}} - \frac{1}{49(1-x)^{98}} + \frac{1}{97(1-x)^{97}} : 1693. \\
\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| : 1694. \frac{1}{3} \left[ (x+1)^{\frac{3}{2}} - (x-1)^{\frac{3}{2}} \right] : 1695.
\end{aligned}$$



$$-\frac{8+30x}{375}(2-5x)^{\frac{3}{5}}: \mathbf{1696.} \quad \frac{1}{8\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^4 - \sqrt{2}}{x^4 + \sqrt{2}} \right|: \mathbf{1697.} \quad -\frac{1+2x}{10}(1-3x)^{\frac{2}{3}}: \mathbf{1698.}$$

$$\frac{-3}{140}(9+12x+14x^2)(1-x)^{\frac{4}{3}}: \mathbf{1699.} \quad -\frac{1+55x^2}{6600}(1-5x^2)^{11}: \mathbf{1700.} \quad \frac{-2}{15}(32+8x+$$

$$+3x^2)\sqrt{2-x}: \mathbf{1701.} \quad \frac{-1}{15}(8+4x^2+3x^4)\sqrt{1-x^2}: \mathbf{1702.} \quad \arctg(\cos x) - \cos x:$$

$$\mathbf{1703.} \quad \frac{2}{3}(\ln x - 2)\sqrt{1+\ln x}: \quad \mathbf{1704.} \quad -2e^{-\frac{x}{2}} + 2\ln(1+e^{-\frac{x}{2}}): \quad \mathbf{1705.} \quad x -$$

$$-2\ln(1+\sqrt{1+e^x}): \quad \mathbf{1706.} \quad (\arctg\sqrt{x})^2: \quad \mathbf{1707.} \quad \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}: \quad \mathbf{1708.}$$

$$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}: \quad \mathbf{1709.} \quad -\sqrt{a^2-x^2} + a \cdot \arcsin\frac{x}{a}: \quad \mathbf{1710.}$$

$$\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}: \quad \mathbf{1711.} \quad -\frac{3a+x}{2}\sqrt{x(2a-x)} + 3a^2 \arcsin\sqrt{\frac{x}{2a}}: \quad \mathbf{1712.}$$

$$\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} - \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}: \quad \mathbf{1713.} \quad \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}): \quad \mathbf{1714.}$$

$$\frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}): \quad \mathbf{1715.} \quad \sqrt{x^2-a^2} - 2a\ln(\sqrt{x-a}+\sqrt{x+a}),$$

$$\text{тпп } x > a; \quad -\sqrt{x^2-a^2} + 2a\ln(\sqrt{-x+a}+\sqrt{-x-a}), \quad \text{тпп } x < -a: \quad \mathbf{1716.}$$

$$x(\ln x - 1): \mathbf{1717.} \quad \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right): \mathbf{1718.} \quad \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\left(\ln^2 x - \frac{4}{3}\ln x + \frac{8}{9}\right): \mathbf{1719.}$$

$$x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}: \mathbf{1720.} \quad x - \frac{1-x^2}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}: \mathbf{1721.} \quad -(x+1)e^{-x}: \mathbf{1722.}$$

$$-\frac{x^2+1}{2}e^{-x^2}: \mathbf{1723.} \quad x\sin x + \cos x: \mathbf{1724.} \quad -\frac{2x^2-1}{4}\cos 2x + \frac{x}{2}\sin 2x: \mathbf{1725.}$$

$$x\text{tg}x + \ln|\cos x|: \mathbf{1726.} \quad \frac{x^2}{4} - \frac{x\sin 2x}{4} - \frac{\cos 2x}{8}: \mathbf{1727.} \quad \ln\left|\text{tg}\frac{x}{2}\right| - \cos x \ln \text{tg}x:$$

$$\mathbf{1728.} \quad x^2\text{sh}x - 2x\text{ch}x + 2\text{sh}x: \quad \mathbf{1729.} \quad x\arctg x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2): \quad \mathbf{1730.} \quad -\frac{x}{2} +$$

$$+\frac{1+x^2}{2}\arctg x: \quad \mathbf{1731.} \quad x\arccos(5x-2) + \frac{2}{5}\arcsin(5x-2) - \frac{1}{5}\sqrt{1-(5x-2)^2}: \quad \mathbf{1732.}$$

$$\begin{aligned}
1732. & \frac{1}{3}x^3 \arcsin 2x + \frac{1}{36}(1+2x^2)\sqrt{1-4x^2} : 1733. -\frac{\arcsin x}{x} - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x} \right| : \\
1734. & -x - \sqrt{1-x^2} \arccos x : 1735. x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x : 1736. \\
& \sqrt{1+x^2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x : 1737. 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} : 1738. 2(6-x)\sqrt{x} \cos \sqrt{x} - \\
& -6(2-x)\sin \sqrt{x} : 1739. \frac{x}{2}[\sin \ln x - \cos \ln x] : 1740. \frac{a \cos bx + b \sin bx}{a^2 + b^2} e^{ax} : \\
1741. & \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} : 1742. \frac{e^{2x}}{8}(2 - \sin 2x - \cos 2x) : 1743. \frac{(1+x)e^{\arctg x}}{2\sqrt{1+x^2}} : \\
1744. & \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x - e^x(\cos x + \sin x) + \frac{1}{2}e^{2x} : 1745. -[x + \operatorname{ctg} x \ln(e \sin x)] : 1746. \\
& \frac{e^x}{x+1} : 1747. \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{7}} : 1748. \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{3x+1} \right| : 1749. \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 - \sqrt{2} - 1}{x^2 + \sqrt{2} - 1} \right| : \\
1750. & \frac{1}{2} \ln(x^2 + x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} : 1751. \frac{1}{9} \ln \left\{ |x^3 + 1| (x^3 - 2)^2 \right\} : 1752. \\
& \arcsin \frac{x+1}{\sqrt{2}} : 1753. \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x} \right| : 1754. \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| x - \frac{1}{4} + \sqrt{x^2 - \frac{x}{2} + 1} \right| : \\
1755. & \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x \cos a + 1) + \operatorname{ctg} a \cdot \operatorname{arctg} \frac{x - \cos a}{\sin a} : 1756. \frac{29}{45} \operatorname{arctg} \frac{5x+3}{9} - \\
& -\frac{3}{10} \ln(5x^2 + 6x + 18) : 1757. 3\sqrt{x^2 + 2x + 2} - 4 \ln(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}) : \\
1758. & -\frac{1}{4} \sqrt{3+4x-4x^2} + \frac{7}{4} \arcsin \frac{2x-1}{2} : 1759. \frac{2x-1}{4} \sqrt{x-x^2} + \\
& + \frac{1}{8} \arcsin(2x-1) : 1760. \frac{1}{8} \ln \frac{x^2+1}{x^2+5} : 1761. \frac{x+1}{2} \sqrt{x^2+2x+5} + 2 \ln(x+1 + \\
& + \sqrt{x^2+2x+5}) : 1762. \ln|(x-2)(x+5)| : 1763. \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(x+2)^4}{(x+1)(x+3)^3} \right| : 1764. \frac{x^2}{2} - \\
& -x + \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{8}{3} \ln|x+2| : 1765. x + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x - \frac{8}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} : 1766. \frac{1}{x+1} +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1|: \quad \mathbf{1767.} \quad \frac{1}{33} \ln \left| \frac{(3x+1)^9(2x-3)^2}{x^{11}} \right|: \quad \mathbf{1768.} \quad \frac{1}{12} \ln \left| \frac{(x+1)^4(x-2)^5}{(x-1)^4(x+2)^5} \right|: \\
\mathbf{1769.} \quad & \frac{1}{2-x} - \arctg(x-2): \quad \mathbf{1770.} \quad \frac{1}{6} \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2x+1}{\sqrt{3}}: \quad \mathbf{1771.} \\
& \ln \left| \frac{(x-1)^3}{(x-2)(x+2)^2} \right|: \quad \mathbf{1772.} \quad \frac{x^4}{4} + \frac{4}{3}x^3 + 6x^2 + 30x - \frac{27}{x-2} + 72 \ln|x-2|: \quad \mathbf{1773.} \\
& \frac{3}{4} \ln|x-1| + \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \arctg x: \quad \mathbf{1774.} \quad \frac{1}{4} \ln|x^4 - 1| + \frac{1}{2} \arctg x - \frac{1}{2(x-1)}: \quad \mathbf{1775.} \\
& \ln \frac{x^2+4}{\sqrt{x^2+2}} + \frac{3}{2} \arctg \frac{x}{2} - \frac{3}{\sqrt{2}} \arctg \frac{x}{\sqrt{2}}: \mathbf{1776.} \quad -\frac{1}{4x^4} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x} + \ln|x| + \\
& + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|: \quad \mathbf{1777.} \quad 2\sqrt{x} - 2 \ln(1 + \sqrt{x}): \quad \mathbf{1778.} \quad \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 - \frac{3}{4} \ln|t-1| + \\
& + \frac{15}{8} \ln(t^2+t+2) - \frac{27}{4\sqrt{7}} \arctg \frac{2t+1}{\sqrt{7}}, \quad t = \sqrt[3]{2+x}: \quad \mathbf{1779.} \quad \frac{2}{(1+\sqrt[4]{x})^2} - \frac{4}{1+\sqrt[4]{x}}: \\
\mathbf{1780.} \quad & \frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \arctg \sqrt[6]{x}: \quad \mathbf{1781.} \quad \sqrt{x} + \frac{3}{4} \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x} + \frac{3}{4} \sqrt[6]{x} + \\
& + 3\sqrt[12]{x} + \frac{12}{5} \ln|1 - \sqrt[12]{x}| - \frac{3}{40} \ln(1 + 2\sqrt[12]{x} + 2\sqrt[6]{x}) - \frac{9}{20} \arctg(1 + 2\sqrt[12]{x}): \quad \mathbf{1782.} \\
& \frac{5}{4} \left( \frac{x+1}{x} \right)^{4/5} - \frac{5}{9} \left( \frac{x+1}{x} \right)^{9/5}: \quad \mathbf{1783.} \quad \frac{x^2}{2} - \frac{x\sqrt{x^2-1}}{2} + \frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{x^2-1}|: \quad \mathbf{1784.} \\
& \ln|1 + 3\sqrt[3]{x}|: \quad \mathbf{1785.} \quad \frac{1}{2}(x-2)\sqrt{x^2-1} + \frac{1}{2} \ln|x + \sqrt{x^2-1}|: \quad \mathbf{1786.} \quad \sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \\
& + \frac{1}{5} \sin^5 x: \quad \mathbf{1787.} \quad \frac{5}{16}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} \sin^3 2x: \quad \mathbf{1788.} \quad \frac{\sin^5 x}{5} - \\
& - \frac{2 \sin^7 x}{7} + \frac{\sin^9 x}{9}: \quad \mathbf{1789.} \quad \frac{\cos 6x}{24} - \frac{\cos 4x}{16} - \frac{\cos 2x}{8}: \quad \mathbf{1790.} \quad \frac{2}{\cos x}: \quad \mathbf{1791.} \\
& \ln|\cos x| - \cos 2x: \quad \mathbf{1792.} \quad -\frac{\ctg^4 x}{4}: \quad \mathbf{1793.} \quad \frac{\tg^2 x}{2} + \ln|\tg x|: \quad \mathbf{1794.} \quad -\frac{\ctg^3 x}{3} - \ctg x: \\
\mathbf{1795.} \quad & \frac{1}{4} \ln \frac{1-\cos x}{1+\cos x} + \frac{1}{2(1+\cos x)}: \quad \mathbf{1796.} \quad \frac{1}{4} \ln \frac{5-\sin x}{1-\sin x}: \quad \mathbf{1797.} \quad \frac{1}{\sin a} \ln \left| \frac{\cos \frac{x-a}{2}}{\cos \frac{x+a}{2}} \right|:
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1798. \quad & \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3tg \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{5}}: & 1799. \quad & x - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}(\sqrt{2}tgx): & 1800. \quad & \omega) \\
& \frac{2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} \operatorname{arctg} \left( \sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}} tg \frac{x}{2} \right); & \text{p)} & \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^2-1}} \ln \left| \frac{\varepsilon + \cos x + \sqrt{\varepsilon^2-1} \sin x}{1 + \varepsilon \cos x} \right|: & 1801. & \\
& \frac{1}{2} (\sin x - \cos x) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| tg \left( \frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) \right|: & 1802. & \frac{1}{6} \ln \frac{(1-\cos x)(2+\cos x)^2}{(1+\cos x)^3}: & 1803. & \\
& -x + ctga \ln \left| \frac{\cos x}{\cos(x+a)} \right|: & 1804. & \frac{3}{7}(a+x)^{7/3} - \frac{3}{4}a(a+x)^{4/3}: & 1805. & 4\sqrt{x+1} \times \\
& \times (\ln \sqrt{x+1} - 1): & 1806. & 3e^{\sqrt[3]{x}} \left( \sqrt[3]{x^5} - 5\sqrt[3]{x^4} + 20x - 60\sqrt[3]{x^2} + 120\sqrt[3]{x} - 120 \right): & & \\
1807. \quad & x \operatorname{arctg}(1 + \sqrt{x}) - \sqrt{x} + \ln |x + 2\sqrt{x} + 2|: & 1808. & \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \sqrt{x^2-1} - \\
& - \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{x^2-1}|: & 1809. & \ln \left| \frac{\sqrt{2x+1}-1}{\sqrt{2x+1}+1} \right| - \frac{\sqrt{2x+1}}{4x}: & 1810. & \operatorname{arctg} \sqrt{x-1} + \\
& + \frac{\sqrt{x-1}}{x}: & 1811. & x + \frac{25 \ln |x+5| - 49 \ln |x+7|}{2}: & 1812. & \frac{1}{4} \ln(2x^2 - x + 1) + \\
& + \frac{1}{2\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4x-1}{\sqrt{7}}: & 1813. & \frac{x^3}{3} - 4x + 8 \operatorname{arctg} \left( \frac{x}{2} \right): & 1814. & 6\sqrt[6]{x} - 3\sqrt[3]{x} + 2\sqrt{x} - \\
& - 6 \ln(1 + \sqrt[6]{x}): & 1815. & -\frac{2}{3} \ln \frac{(1+y)^2}{1-y+y^2} + \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2y-1}{\sqrt{3}}, \quad y = \sqrt[4]{x}: & 1816. & \\
& (1 + \sqrt[4]{2x-1})^2 + 2 \ln |1 - \sqrt[4]{2x-1}|: & 1817. & \frac{x^2-2}{3} \sqrt{1+x^2}: & 1818. & \frac{2x-1}{4} \times \\
& \times \sqrt{4x^2-4x+3} + \frac{1}{2} \ln(2x-1 + \sqrt{4x^2-4x+3}): & 1819. & x - tgx + \frac{1}{\cos x}: & 1820. & \\
& \frac{tg^3 x}{3}: & 1821. & \frac{ch^7 x}{7} - \frac{ch^5 x}{5}: & 1822. & \sqrt{2} \ln ctg \left( \frac{\pi-x}{4} \right): & 1823. \\
& \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left( \frac{\sqrt{2} + \sqrt{1+\sin^2 x}}{|\cos x|} \right): & 1824. & \frac{1}{4} \ln \frac{(\sqrt{1+e^x}-1)(1-\sqrt{1-e^x})}{(\sqrt{1+e^x}+1)(1+\sqrt{1-e^x})} - e^{-x} \times
\end{aligned}$$

$$\times \frac{\sqrt{1+e^x} - \sqrt{1-e^x}}{2} : 1825. \frac{1}{2} \sin x^2 - \frac{1}{2} x^2 \cos x^2 : 1826. \frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) : 1827.$$

$$e^{e^x} : 1828. \ln x \cdot \sin \ln x + \cos \ln x : 1829. x \arccos \sqrt{\frac{x}{x+1}} + \sqrt{x} - \operatorname{arctg} \sqrt{x} : 1830.$$

u)  $\sqrt{x}$ ; б)  $x^2$ ; в)  $x^3$ ; г)  $x^4$ ; д)  $x^5$ ; е)  $x^6$ ; ж)  $x^7$ ; з)  $x^8$ ; и)  $x^9$ ; к)  $x^{10}$ ; л)  $x^{11}$ ; м)  $x^{12}$ ; н)  $x^{13}$ ; о)  $x^{14}$ ; п)  $x^{15}$ ; р)  $x^{16}$ ; с)  $x^{17}$ ; т)  $x^{18}$ ; у)  $x^{19}$ ; ф)  $x^{20}$ ; х)  $x^{21}$ ; ц)  $x^{22}$ ; ч)  $x^{23}$ ; ш)  $x^{24}$ ; щ)  $x^{25}$ ; э)  $x^{26}$ ; ю)  $x^{27}$ ; я)  $x^{28}$ ; 1833.  $x|x|/2$  : 1834.  $x^2|x|/3$  :

$$1835. e^x - 1, \text{ երբ } x < 0 \text{ և } 1 - e^{-x}, \text{ երբ } x \geq 0 : 1836. \frac{(x+1)|1+x|}{2} + \frac{(1-x)|1-x|}{2} :$$

$$1837. 1 - chx, \text{ երբ } x < 0 \text{ և } chx - 1, \text{ երբ } x \geq 0 : 1838. \frac{1}{2} f(2x) : 1839.$$

$$xf'(x) - f(x) : 1840. \text{ u) } x - x^2/2; \text{ п) } x, \text{ երբ } -\infty < x \leq 0 \text{ և } e^x - 1, \text{ երբ}$$

$$0 < x < +\infty : 1842. \text{ u) } \frac{1}{2} \left( \operatorname{arctg} x - \frac{x}{1+x^2} \right); \text{ п) } \frac{1}{128} \left[ \frac{3x^3 + 20x}{(x^2 + 4)^2} + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} \right] :$$

$$1843. \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + x\sqrt{2} + 1}{x^2 - x\sqrt{2} + 1} + \frac{\sqrt{2}}{4} \left( \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x + 1) + \operatorname{arctg}(\sqrt{2}x - 1) \right) : 1844. \frac{1}{4} \times$$

$$\times \ln \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left( \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) : 1845. \frac{1}{6} \operatorname{arctg} x^3 +$$

$$+ \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \frac{1 + x\sqrt{3} + x^2}{1 - x\sqrt{3} + x^2} : 1846. \frac{1}{6} \ln \frac{(x-1)^2}{x^2 + x + 1} - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} :$$

$$1847. \frac{3x(3x^2 + 5)}{8(x^2 + 1)^2} + \frac{17}{8} \operatorname{arctg} x : 1848. \frac{x^3 - 2x^2 + x + 3}{x^2 - 2x + 2} + 2 \ln(x^2 - 2x + 2) +$$

$$+ \operatorname{arctg}(x-1) : 1849. -\frac{3x^2 + 2}{2x(x^2 + 1)} - \frac{3}{2} \operatorname{arctg} x : 1850. -\frac{2x^3 + 1}{3x^3(x^3 + 1)} + \frac{2}{3} \times$$

$$\times \ln \left| \frac{x^3 + 1}{x^3} \right| : 1851. \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \frac{1 + x\sqrt{3} + x^2}{1 - x\sqrt{3} + x^2} - \frac{1}{2\sqrt{3}} \left( \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) :$$

$$1854. \frac{2x-3}{4} \sqrt{1+x+x^2} - \frac{1}{8} \ln \left( \frac{1}{2} + x + \sqrt{1+x+x^2} \right) : 1855. \frac{11}{8} \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} +$$

$$+ \frac{1-2x}{4} \sqrt{1+x-x^2} : 1856. -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1-x+\sqrt{2(1+x^2)}}{1+x} \right| : 1857. \arcsin \frac{x-2}{\sqrt{2}|x-1|} :$$

$$1858. \frac{2-x}{3(1-x)^2} \sqrt{1-x^2} : 1859. \frac{1}{5} \frac{\sqrt{x^2+2x-5}}{x+2} + \frac{1}{5\sqrt{5}} \arcsin \frac{x+7}{\sqrt{6}|x+2|} : 1860.$$

$$\sqrt{x^2+2x+2} + \ln(x+1+\sqrt{x^2+2x+2}) - \sqrt{2} \ln \left| \frac{x+2+\sqrt{2(x^2+2x+2)}}{x} \right| :$$

$$1861. \frac{3}{2(2z+1)} + \frac{1}{2} \ln \frac{z^4}{|2z+1|^3} \quad \left( z = x + \sqrt{x^2+x+1} \right) : 1862.$$

$$\frac{1}{24} [(z-1)^3 + (z-1)^{-3}] + \frac{1}{8} [(z-1)^2 - (z-1)^{-2}] + \frac{1}{8} [(z-1) + (z-1)^{-1}] + \frac{1}{2} \ln |z-1|,$$

$$z = x + \sqrt{x^2 - 2x + 2} : 1863. \sqrt{1+x+x^2} + \frac{1}{2} \ln \frac{1+2x+2\sqrt{1+x+x^2}}{(2+x+2\sqrt{1+x+x^2})^2} : 1864.$$

$$\ln(x + \sqrt{x^2+1}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2x^2+2-x}}{\sqrt{x^2+2}} : 1865. \frac{3}{2} \ln \left( x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2-x+1} \right) -$$

$$- \ln \frac{2-x+2\sqrt{x^2-x+1}}{x} + \sqrt{x^2-x+1} \quad (x > 0) : 1866. -\frac{1+x}{2} \sqrt{1+2x-x^2} +$$

$$+ 2 \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{\sqrt{2}x}{x+1} : 1867. \frac{6}{5} x^{\frac{5}{6}} - 4x^{\frac{1}{2}} + 18x^{\frac{1}{6}} + \frac{3x^{\frac{1}{6}}}{1+x^{\frac{1}{3}}} -$$

$$- 21 \operatorname{arctg} x^{\frac{1}{6}} : 1868. \frac{1}{6} \ln \frac{z^2+z+1}{(z-1)^2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2z+1}{\sqrt{3}}, \quad z = \frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{x} : 1869.$$

$$-z + \frac{2}{3} z^3 - \frac{z^5}{5}, \quad z = \sqrt{1-x^2} : 1870. \frac{3z}{2z^3+2} - \frac{1}{4} \ln \frac{(z+1)^2}{z^2-z+1} - \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{arctg} \frac{2z-1}{\sqrt{3}},$$

$$z = \frac{\sqrt[3]{3x-x^3}}{x} : 1871. \frac{3}{5} z^5 - 2z^3 + 3z, \quad z = \sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}} : 1872. \frac{5}{4} z^4 - \frac{5}{9} z^9,$$

$$z = \sqrt[5]{1+\frac{1}{x}} : 1873. \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2\operatorname{tg}x+1}{\sqrt{7}} : 1874. \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg}x+1+\sqrt{2}}{\operatorname{tg}x+1-\sqrt{2}} \right| :$$

$$1875. \frac{1}{2\sqrt{13}} \ln \left| \frac{2\operatorname{tg}x+3-\sqrt{13}}{2\operatorname{tg}x+3+\sqrt{13}} \right| : 1876. \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg}2x}{\sqrt{2}} : 1877. \frac{1}{6} \ln \frac{(\operatorname{tg}x+1)^2}{\operatorname{tg}^2x-\operatorname{tg}x+1} +$$

$$+\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2\operatorname{tg}x-1}{\sqrt{3}}: \quad \mathbf{1878.} \operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}2x}{2}: \quad \mathbf{1879.}$$

$$\frac{1}{1-\varepsilon^2}\left[\frac{2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\operatorname{arctg}\left(\sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)-\frac{\varepsilon\sin x}{1+\varepsilon\cos x}\right]: \quad \mathbf{1880.}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\frac{7+4\sqrt{2}+\cos 4x}{7-4\sqrt{2}-\cos 4x}: \quad \mathbf{1881.} \quad -\ln\left(\cos^2 x+\sqrt{1+\cos^4 x}\right): \quad \mathbf{1882.} \quad 3\cos x-$$

$$-\sin x+2\sqrt{2}\ln|\operatorname{tg}(x/2+\pi/8)|: \quad \mathbf{1883.} \quad \ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|-\ln\left|\frac{3\sin x+1}{\sin x}\right|: \quad \mathbf{1884.} \quad -\frac{1}{8}\operatorname{ctg}^2 x+$$

$$+\frac{1}{32}\ln(1+4\operatorname{ctg}^2 x): \quad \mathbf{1885.} \quad \frac{x}{2}+\frac{\operatorname{sh}2x}{4}+\frac{\operatorname{sh}^2 x}{2}: \quad \mathbf{1886.} \quad -\frac{1}{4}\ln\left|\frac{\operatorname{th}x-2}{\operatorname{th}x+2}\right|: \quad \mathbf{1887.}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{sh}2x}{\sqrt{2}}: \quad \mathbf{1888.} \quad \frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{e^x-\sqrt{3}}{e^x+\sqrt{3}}\right|: \quad \mathbf{1889.} \quad \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{ath}\frac{x}{2}+b}{\sqrt{a^2-b^2}},$$

$$\text{тип } b^2 < a^2, \quad \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}}\ln\frac{\operatorname{ath}\frac{x}{2}+b-\sqrt{b^2-a^2}}{\operatorname{ath}\frac{x}{2}+b+\sqrt{b^2-a^2}}, \quad \text{тип } b^2 > a^2: \quad \mathbf{1890.}$$

$$\frac{1}{8}\left(5\operatorname{sh}x-3\operatorname{ch}x-\frac{15}{4}\ln\left|\frac{3\operatorname{th}\frac{x}{2}+1}{\operatorname{th}\frac{x}{2}+3}\right|\right): \quad \mathbf{1891.} \quad \frac{2}{3}x-\frac{1}{3\sqrt{5}}\ln\left|\frac{2\operatorname{th}\frac{x}{2}-5+3\sqrt{5}}{2\operatorname{th}\frac{x}{2}-5-3\sqrt{5}}\right|-$$

$$-\frac{1}{3}\ln|4\operatorname{ch}x+5\operatorname{sh}x+6|: \quad \mathbf{1892.} \quad \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sqrt{\operatorname{th}x}}{1-\sqrt{\operatorname{th}x}}\right|-\operatorname{arctg}\sqrt{\operatorname{th}x}: \quad \mathbf{1893.} \quad \frac{3}{55}\operatorname{th}^{\frac{5}{3}}x \times$$

$$\times(11-5\operatorname{th}^2 x): \quad \mathbf{1894.} \quad x-\frac{1}{2}\ln\left((1+e^x)\sqrt{1+e^{2x}}\right)-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}e^x: \quad \mathbf{1895.} \quad x-\ln|1-e^x|+$$

$$+\frac{1}{1-e^x}+\frac{1}{2(1-e^x)^2}+\frac{1}{3(1-e^x)^3}: \quad \mathbf{1896.} \quad \frac{1}{4\operatorname{sh}1}\left(e^{-x}+\operatorname{chl}(x-\ln(1+e^x\operatorname{chl}))\right): \quad \mathbf{1897.}$$

$$-\left(1+\frac{x^2}{2}\right)e^{-x^2}: \quad \mathbf{1898.} \quad \frac{1}{2}\arcsin\frac{\sin x-\cos x}{\sqrt{3}}-\frac{1}{2}\ln(\sin x+\cos x+\sqrt{2+\sin 2x}):$$

$$\mathbf{1899.} \quad (1+e^x)\ln(1+e^{-x})+x: \quad \mathbf{1900.} \quad \ln\frac{\sqrt{1-x+x^2}}{x}-\frac{\ln(1-x+x^2)}{x}+\sqrt{3} \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}: \mathbf{1901.} \quad \frac{2x^2\sqrt{x}}{125}(25\ln^2 x - 20\ln x + 8): \mathbf{1902.} \quad \frac{1}{2}(\arcsin x - x) + \\
& + x\ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}): \mathbf{1903.} \quad (x-1)\operatorname{arctg} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2}\ln(x^2 - 2x + 2): \mathbf{1904.} \\
& \frac{1}{8}\left[(x^8 - 1)\operatorname{arctg} x - \frac{x^7}{7} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} + x\right]: \mathbf{1905.} \quad \frac{1}{9}\left(x^3 - 3x - 3(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \arccos x\right): \\
& \mathbf{1906.} \quad x - e^{-x} \arcsin e^x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}}): \mathbf{1907.} \quad \frac{1}{2}\left(x + \sqrt{1-x^2}\right)e^{\arcsin x}: \mathbf{1908.} \\
& \frac{x}{\ln x}: \mathbf{1909.} \quad \frac{x}{1 + \ln x}: \mathbf{1910.} \quad \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) - \frac{1}{2}\ln(x^2 + 1): \mathbf{1911.} \\
& \operatorname{arctg}\sqrt{x^2 - 1} - \frac{\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}|}{x}: \mathbf{1912.} \quad 2\sqrt{x-1}(\ln x - 2) + 4\operatorname{arctg}\sqrt{x-1}: \mathbf{1913.} \\
& \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x}{x+2}\right| - \frac{\ln|x|}{x+2}: \mathbf{1914.} \quad \frac{\ln|x|}{\sqrt{x^2 - 1}} + \arcsin \frac{1}{x}: \mathbf{1915.} \quad a\left(x\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \ln|x^2 - 1|\right) + \\
& + \frac{a+b}{4}\ln^2\left|\frac{x-1}{x+1}\right|: \mathbf{1916.} \quad \frac{\cos x}{3(2 + \sin x)} + \frac{4}{3\sqrt{3}}\operatorname{arctg} \frac{2tg \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}}: \mathbf{1917.} \\
& - \frac{4\sqrt{2}}{5}\sqrt{ctg^5 x}: \mathbf{1918.} \quad -2\ln(thx + \sqrt{1 + th^2 x}) + \frac{1}{\sqrt{2}}\ln \frac{\sqrt{1 + th^2 x} + \sqrt{2}thx}{\sqrt{1 + th^2 x} - \sqrt{2}thx}: \mathbf{1919.} \\
& e^x tg \frac{x}{2}: \mathbf{1920.} \quad \frac{\sqrt{2tgx}}{5}(5 + tg^2 x): \mathbf{1921.} \quad \frac{x}{1 + \cos x} - tg \frac{x}{2}: \mathbf{1922.} \quad -\frac{3}{2}(tgx)^{-\frac{2}{3}}: \\
& \mathbf{1923.} \quad \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}\ln \frac{(x-1)^2}{2x^2 - 2x + 1} - 3\operatorname{arctg}(2x-1): \mathbf{1924.} \quad \frac{5}{3}x^3 - 3\ln|x^5 + 3x^2 - 1|: \\
& \mathbf{1925.} \quad \frac{\sqrt{x^2 - 2x - 1}}{4(x-1)^2} - \frac{1}{4\sqrt{2}}\arcsin \frac{\sqrt{2}}{x-1}: \mathbf{1926.} \quad \frac{2x^2 + x + 7}{6}\sqrt{x^2 + 2x + 2} + \\
& + \frac{5}{2}\ln(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}): \mathbf{1927.} \quad \frac{1}{2}\ln \frac{t^2 + t + 1}{(t-1)^2} - \sqrt{3}\operatorname{arctg} \frac{2t+1}{\sqrt{3}}, t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}: \\
& \mathbf{1928.} \quad \frac{1}{2}\ln \frac{(z+1)^2}{1-z+z^2} - \sqrt{3}\operatorname{arctg} \frac{2z-1}{\sqrt{3}}, z = \sqrt[3]{\frac{1-x}{x}}: \mathbf{1929.} \quad \frac{1}{18}\ln \frac{t^2 + 2t + 1}{t^2 - t + 1} -
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
& -\frac{\sqrt{3}}{9} \operatorname{arctg} \frac{2t-1}{\sqrt{3}}, \quad t = \frac{\sqrt[3]{3+4x^3}}{x}: \quad \mathbf{1930.} \quad \frac{2\sqrt{5}}{25} \ln \frac{2t+\sqrt{5}+1}{2t-\sqrt{5}+1} + \frac{2(4t-3)}{5(t^2+t-1)}, \\
& t = \sqrt{x^2+x} - x: \quad \mathbf{1931.} \quad -\frac{3x^3+4}{8x\sqrt[3]{(2+x^3)^2}}: \quad \mathbf{1932.} \quad \frac{1}{4} \ln \frac{x^2}{1+x^2} - \frac{\ln|x|}{2+2x^2}: \quad \mathbf{1933.} \\
& x - \ln(1+e^x) - \frac{2\operatorname{arctg}\sqrt{e^x}}{\sqrt{e^x}} - (\operatorname{arctg}\sqrt{e^x})^2: \quad \mathbf{1934.} \quad \ln(e^x + \sqrt{e^{2x}-1}) + \\
& + \arcsin(e^{-x}): \quad \mathbf{1935.} \quad \frac{\arccos(x\sqrt{x})}{3(1-x^3)} + \frac{x\sqrt{x}}{3\sqrt{1-x^3}}: \quad \mathbf{1936.} \quad \frac{2(x^2+1)\operatorname{arctg}x}{\sqrt{x}} - 4\sqrt{x}: \\
& \mathbf{1937.} \quad \frac{1}{3} \left( \arcsin \frac{\sin x}{2} - \frac{x \cos x}{\sqrt{4-\sin^2 x}} \right): \quad \mathbf{1938.} \quad x^a \ln^b x: \quad \mathbf{1939.} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \sqrt{1+e^{2x}} + \right. \\
& \left. + \ln(e^{-x} + \sqrt{1+e^{-2x}}) \right]: \quad \mathbf{1940.} \quad -\frac{3}{2} (1 + \sqrt[3]{x})^{-2}: \quad \mathbf{1941.} \quad -\frac{1+9\sqrt[4]{x}}{18(1+\sqrt[4]{x})^9}: \quad \mathbf{1942.} \\
& \frac{1}{6} \ln \frac{t-1}{t+1} - \frac{1}{12} \ln \frac{t^2-t+1}{t^2+t+1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2t-1}{\sqrt{3}}, \quad t = \sqrt[6]{x^6+1}: \\
& \mathbf{1943.} \quad \frac{\sqrt{1+2x-x^2}}{2(1-x)} - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} + \sqrt{1+2x-x^2}}{1-x} \right|: \quad \mathbf{1944.} \quad \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{2x}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{2x}} \right| + \\
& + \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}: \quad \mathbf{1945.} \quad -2\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{t^2+1}}{\sqrt{2}} - 4\sqrt{3} \ln \left| \frac{\sqrt{3t^2+3} + \sqrt{2t}}{\sqrt{3t^2+3} - \sqrt{2t}} \right|, \quad t = \frac{1+x}{1-x}: \quad \mathbf{1946.} \\
& \frac{1}{\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}(2x+1) + \sqrt{3(x^2+x-1)}}{\sqrt{2}(2x+1) - \sqrt{3(x^2+x-1)}} \right|: \quad \mathbf{1947.} \quad -\frac{1}{\sqrt{6}} \ln \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2+2x-x^2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2+2x-x^2}} + \\
& + \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{2}}{3} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2+2x-x^2}}{\sqrt{2(1-x)}}: \quad \mathbf{1948.} \quad \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-x+2\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} \right| - \\
& - \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} + \ln \left( x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1} \right): \quad \mathbf{1949.} \quad x, \text{ при } |x| \leq 1; \quad \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3} \operatorname{sgn} x, \text{ при } \\
& |x| > 1: \quad \mathbf{1950.} \quad \frac{[x]}{\pi} \{ [x] - (-1)^{[x]} \cos \pi x \}: \quad \mathbf{1951.} \quad x - \frac{x^3}{3}, \text{ при } |x| \leq 1; \quad x - \frac{x}{2}|x| + \frac{1}{6} \operatorname{sgn} x,
\end{aligned}$$

$\text{tpp } |x| > 1$ : **1952.**  $x$ ,  $\text{tpp } -\infty < x \leq 0$ ;  $\frac{x^2}{2} + x$ ,  $\text{tpp } 0 \leq x \leq 1$ ;  $x^2 + \frac{1}{2}$ ,  $\text{tpp}$   
 $x > 1$ : **1953.**  $\frac{x}{4} + \frac{t}{4}(1 - 2|t|)$ ,  $t = x - [x] - \frac{1}{2}$ : **1956.**  $I_n = \frac{1}{a}x^n e^{ax} - \frac{n}{a}I_{n-1}$ : **1957.**  
 $I_n = \frac{x^{\alpha+1} \ln^n x}{\alpha+1} - \frac{n}{\alpha+1}I_{n-1}$ : **1958.**  $I_n = \frac{x^{n-1} \sqrt{x^2+a}}{n} - \frac{n-1}{n}aI_{n-2}$ : **1959.**  $I_n =$   
 $= -\frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n}I_{n-2}$ : **1960.**  $I_n = \frac{\text{sh}x \text{ch}^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n}I_{n-2}$ : **1961.**  $I_n =$   
 $= -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$ : **1962.**  $I_n = \frac{\text{sh}x}{(n-1)\text{ch}^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$ : **1963.**  $I_n =$   
 $= \frac{\text{tg}^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}$ : **1966.**  $\frac{2 \sin x - \cos x}{10(2 \cos x + \sin x)^2} + \frac{1}{10\sqrt{5}} \ln \left| \text{tg} \frac{x + \text{arctg} 2}{2} \right|$ : **1968.**  
 $-\frac{2}{n \cos a} \left( \cos \frac{x+a}{2} \right)^n \left( \sin \frac{x-a}{2} \right)^{-n}$ : **1969.**  $A = \frac{aa_1 + bb_1}{a^2 + b^2}$ ,  $B = \frac{ab_1 - ba_1}{a^2 + b^2}$ ,  $C =$   
 $= c_1 - c \frac{aa_1 + bb_1}{a^2 + b^2}$ : **1970.**  $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5\sqrt{21}} \ln \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}(2\text{tg} \frac{x}{2} - 1)}{\sqrt{7} - \sqrt{3}(2\text{tg} \frac{x}{2} - 1)} \right| - \frac{1}{5} \ln |3 \sin x +$   
 $+ 4 \cos x - 2|$ : **1971.**  $\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \text{tg} \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{8} \right) - \frac{1}{2} \ln (\sqrt{2} + \sin x + \cos x)$ : **1972.**  
 $A = \frac{2ab_1 + bc_1 - ba_1}{a^2 + b^2}$ ,  $B = \frac{ac_1 - aa_1 - 2bb_1}{a^2 + b^2}$ ,  $C = \frac{a^2c_1 + b^2a_1 - 2abb_1}{a^2 + b^2}$ : **1973.**  
 $3 \cos x - \sin x + 2\sqrt{2} \ln |\text{tg}(x/2 + \pi/8)|$ : **1974.**  $\frac{8}{5\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5} - 1 + 2\text{tg} \frac{x}{2}}{\sqrt{5} + 1 - 2\text{tg} \frac{x}{2}} \right| +$   
 $+ \frac{1}{5}(\sin x + 3 \cos x)$  **1975.**  $A = \frac{a_1(a - \lambda_2) + bb_1}{b(\lambda_2 - \lambda_1)}$ ,  $B = \frac{a_1(a - \lambda_1) + bb_1}{b(\lambda_1 - \lambda_2)}$ : **1976.**  
 $\frac{3}{5} \text{arctg}(\sin x - 2 \cos x) + \frac{1}{10\sqrt{6}} \ln \frac{\sqrt{6} + 2 \sin x + \cos x}{\sqrt{6} - 2 \sin x - \cos x}$ : **1977.**  $\frac{3}{4\sqrt{2}} \times$   
 $\times \ln \left| \frac{\sqrt{2}(\sin x + \cos x) + 1}{\sqrt{2}(\sin x + \cos x) - 1} \right| - \frac{1}{4\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}(\sin x - \cos x)}{\sqrt{3} - \sqrt{2}(\sin x - \cos x)} \right|$ : **1979.**  $\frac{\varepsilon^2 + 2}{2(\varepsilon^2 - 1)^{\frac{5}{2}}} \times$

$$\times \ln \left| \frac{\sqrt{\varepsilon - 1} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \sqrt{\varepsilon + 1}}{\sqrt{\varepsilon - 1} \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \sqrt{\varepsilon + 1}} \right| + \frac{\varepsilon \sin x (\varepsilon^2 - 3\varepsilon \cos x - 4)}{2(\varepsilon^2 - 1)^2 (1 + \varepsilon \cos x)^2}: \quad \mathbf{1981.} \quad \frac{2x^4 - 1}{6x^6} \sqrt{1 + x^4}:$$

$$\mathbf{1982.} \quad \frac{x}{2a} + \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{a-1}{a+1} \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \quad \text{тпп } a \neq -1 \text{ и } a \neq 0; \quad \sin x, \quad \text{тпп } a = 0; \quad -\frac{x}{2},$$

$$\text{тпп } a = -1: \quad \mathbf{1983.} \quad \frac{x}{a-1} - \frac{1}{\sqrt{a(a-1)}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{a}, \quad \text{тпп } a > 0, \quad a \neq 1; \quad \frac{x}{a-1} -$$

$$-\frac{1}{2(a-1)\sqrt{-a}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} x - \sqrt{-a}}{\operatorname{tg} x + \sqrt{-a}} \right|, \quad \text{тпп } a < 0; \quad \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}, \quad \text{тпп } a = 1; \quad -\operatorname{ctg} x - x,$$

$$\text{тпп } a = 0: \quad \mathbf{1984.} \quad \frac{1}{a^2 + b^2} \cdot \frac{a \sin x - b \cos x}{a \cos x + b \sin x}: \quad \mathbf{1985.} \quad \frac{\operatorname{tg} x}{a[a + (ax + b)\operatorname{tg} x]}: \quad \mathbf{1986.}$$

$$-\frac{4}{3 + 3\operatorname{tg}^3 x}: \quad \mathbf{1987.} \quad \frac{x \operatorname{arctg} x}{b\sqrt{ax^2 + b}} - \frac{1}{b\sqrt{a-b}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{ax^2 + b}{a-b}}, \quad \text{тпп } a > b;$$

$$\frac{x \operatorname{arctg} x + 1}{a\sqrt{b}\sqrt{x^2 + 1}}, \quad \text{тпп } a = b; \quad \frac{x \operatorname{arctg} x}{b\sqrt{ax^2 + b}} - \frac{1}{2b\sqrt{b-a}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax^2 + b} - \sqrt{b-a}}{\sqrt{ax^2 + b} + \sqrt{b-a}} \right|, \quad \text{тпп}$$

$$a < b: \quad \mathbf{1988.} \quad \frac{2}{(a-b)^3} \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| - \frac{2x+a+b}{(a-b)^2(x+a)(x+b)}: \quad \mathbf{1989.}$$

$$\left( \frac{1}{b} \operatorname{arctg} \frac{x}{b} - \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \right) \frac{1}{a^2 - b^2}, \quad \text{тпп } a^2 \neq b^2; \quad \frac{1}{2b^2} \left( \frac{x}{x^2 + b^2} + \frac{1}{b} \operatorname{arctg} \frac{x}{b} \right),$$

$$\text{тпп } a^2 = b^2: \quad \mathbf{1990.} \quad x + (a-b) \left[ n \ln|x+b| - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} C_n^{k-1} \left( \frac{a-b}{x+b} \right)^k \right]: \quad \mathbf{1991.}$$

$$\frac{ab_1 - ba_1}{a^2 - b^2} \ln|achx + bshx| + \frac{aa_1 - bb_1}{a^2 - b^2} x, \quad \text{тпп } a^2 \neq b^2, \quad \frac{a_1 \pm b_1}{2a} x + \frac{a_1 \mp b_1}{4a} sh2x +$$

$$+ \frac{b_1 \mp a_1}{2a} sh^2 x, \quad \text{тпп } a = \pm b: \quad \mathbf{1992.} \quad \frac{1}{5} \ln \left| 5th \frac{x}{2} + 3 \right|: \quad \mathbf{1993.}$$

$$-\frac{1}{7} \left( \frac{5}{4chx + 3shx} + \frac{4}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4th \frac{x}{2} + 3}{\sqrt{7}} \right): \quad \mathbf{1994.}$$

$$\frac{2}{3} \ln \frac{(th \frac{x}{2} - 2)^2}{th^2 \frac{x}{2} + 2th \frac{x}{2} + 4} - \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{th \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}}: \quad \mathbf{1995.} \quad \frac{2}{3} \ln |\sin^3 x + \cos^3 x|: \quad \mathbf{1996.}$$

$$\frac{1}{a^2 + b^2} \left( \frac{ab_1 - ba_1}{a \cos x + b \sin x} + \frac{aa_1 + bb_1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x + \varphi}{2} \right| \right), \text{ որպեսզի } \sin \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

$$\cos \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} : \mathbf{1997.} \frac{1}{2b^2} \left( \frac{\operatorname{tg} x}{a^2 \operatorname{tg}^2 x + b^2} + \frac{1}{ab} \operatorname{arctg} \left( \frac{a}{b} \operatorname{tg} x \right) \right), \text{ երբ } a \neq 0,$$

$$b \neq 0; -\frac{c \operatorname{tg}^3 x}{3a^4}, \text{ երբ } a \neq 0, b = 0; \frac{\operatorname{tg} x}{b^4}, \text{ երբ } a = 0, b \neq 0 : \mathbf{1998.} 4\sqrt[4]{\operatorname{tg} x} : \mathbf{1999.}$$

$$\frac{1}{2na^{2n-1}} \left\{ \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + \sum_{k=1}^{n-1} \left[ \cos \frac{k\pi}{n} \ln \left( x^2 - 2ax \cos \frac{k\pi}{n} + a^2 \right) - 2 \sin \frac{k\pi}{n} \times \right. \right. \\ \left. \left. \times \operatorname{arctg} \frac{x - a \cos \frac{k\pi}{n}}{a \sin \frac{k\pi}{n}} \right] \right\} : \mathbf{2000.} \frac{1}{|a|\sqrt{b^2 - a^2}} \ln \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{\sqrt{b^2 - a^2} x + |a|\sqrt{b^2 - x^2}}, \text{ երբ}$$

$$a^2 < b^2; -\frac{x}{b^2 \sqrt{b^2 - x^2}}, \text{ երբ } a^2 = b^2; \frac{1}{|a|\sqrt{a^2 - b^2}} \arccos \frac{\sqrt{a^2 - b^2} x}{|b|\sqrt{a^2 - x^2}}, \text{ երբ}$$

$$a^2 > b^2 : \mathbf{2001.} \frac{1}{n\sqrt{a}} \ln \frac{\sqrt{x^n + a} - \sqrt{a}}{\sqrt{x^n + a} + \sqrt{a}}, \text{ երբ } a > 0; \frac{2}{n\sqrt{-a}} \arccos \frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{x^n}}, \text{ երբ}$$

$$a < 0 : \mathbf{2002.} \frac{n}{b-a} \sqrt[n]{\frac{x-b}{x-a}}, \text{ երբ } a \neq b; \frac{1}{b-x}, \text{ երբ } a = b : \mathbf{2003.}$$

$$2(\ln x - 2)\sqrt{x+a} + 2\sqrt{a} \ln \frac{\sqrt{x+a} + \sqrt{a}}{\sqrt{x+a} - \sqrt{a}}, \text{ երբ } a \geq 0; 2(\ln x - 2)\sqrt{x+a} +$$

$$+ 4\sqrt{-a} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x+a}}{\sqrt{-a}}, \text{ երբ } a < 0 : \mathbf{2004.} -\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + a})}{x} + \frac{1}{\sqrt{a}} \times$$

$$\times \ln \frac{\sqrt{x^2 + a} + \sqrt{a}}{|x|}, \text{ երբ } a > 0; -\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + a})}{x} + \frac{1}{\sqrt{-a}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x^2 + a}}{\sqrt{-a}},$$

$$\text{երբ } a < 0; -\frac{1 + \ln 2x}{x}, \text{ երբ } a = 0 : \mathbf{2005.} \frac{x \sin x + \cos x}{b[(ax - b)\sin x + (a + bx)\cos x]}, \text{ երբ}$$

$$b \neq 0; \frac{\sin x - x \cos x}{a^2(x \sin x + \cos x)}, \text{ երբ } b = 0 : \mathbf{2006.} \frac{1}{2a\sqrt{a+1}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{a+1}x}{\sqrt{1-x^2}} -$$

$$-\frac{\arcsin x}{2a(1+ax^2)}, \text{ тпп } a \in (-1;0) \cup (0;+\infty); \left(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{4}\right)\arcsin x + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{4}, \text{ тпп}$$

$$a=0; \quad -\frac{\arcsin x}{2a(1+ax^2)} + \frac{1}{4a\sqrt{-a-1}} \ln \left| \frac{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{-a-1}x}{\sqrt{1-x^2} - \sqrt{-a-1}x} \right|, \text{ тпп } a < -1;$$

$$\frac{\arcsin x}{2(1-x^2)} - \frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}, \text{ тпп } a=-1: \quad \mathbf{2007.} \quad \frac{1}{3} \ln \frac{(tg \frac{x}{2} + 1)^2}{tg^2 \frac{x}{2} - tg \frac{x}{2} + 1} + \frac{2}{\sqrt{3}} \times$$

$$\times \arctg \frac{2tg \frac{x}{2} - 1}{\sqrt{3}}: \mathbf{2008.} \quad |x-a|: \mathbf{2009.} \quad \frac{n(2x-n-1)}{2}, \text{ тпп } x \in [n; n+1), n \in \mathbb{Z}:$$

$$\mathbf{2010.} \quad x \arctg \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln(1+x^2): \mathbf{2011.} \quad x \ln x - x, \text{ тпп } x > 0; x, \text{ тпп } x \leq 0:$$

### Գլուխ 8

$$\mathbf{2013.} \quad 12,5: \mathbf{2014.} \quad 88 - \frac{16}{n^2}: \mathbf{2015.} \quad \frac{\pi}{n} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n}}: \mathbf{2016.} \quad \omega)10;p)0: \mathbf{2017.}$$

$$\frac{49(n-1)}{n} - 35; \quad \frac{49(n+1)}{n} - 35: \mathbf{2018.} \quad \frac{10(2^{10}-1)}{n(2^{\frac{10}{n}}-1)}; \quad \frac{2^{\frac{10}{n}}10(2^{10}-1)}{n(2^{\frac{10}{n}}-1)}: \mathbf{2019.}$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi \cos \frac{n+1}{4n}\pi}{4n \sin \frac{\pi}{4n}}; \quad \frac{\sqrt{2}\pi \cos \frac{n-1}{4n}\pi}{4n \sin \frac{\pi}{4n}}: \mathbf{2020.} \quad 0; b-a: \mathbf{2021.} \quad 3: \mathbf{2022.} \quad 2: \mathbf{2023.}$$

$$\frac{a-1}{\ln a}: \mathbf{2024.} \quad 1: \mathbf{2025.} \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{b}: \mathbf{2026.} \quad \ln \frac{b}{a}: \mathbf{2027.} \quad C(b-a): \mathbf{2030.} \quad \Omega_2: \mathbf{2031.}$$

$$11,25: \mathbf{2032.} \quad \frac{\pi}{2}: \mathbf{2033.} \quad \frac{\pi}{6}: \mathbf{2034.} \quad \frac{\pi}{3}: \mathbf{2035.} \quad 1: \mathbf{2036.} \quad \frac{\pi}{2 \sin \alpha}: \mathbf{2037.}$$

$$\frac{1}{ab} \arctg \frac{a}{b}: \mathbf{2038.} \quad \frac{\pi}{12}: \mathbf{2039.} \quad \ln 2: \mathbf{2040.} \quad \pi: \mathbf{2041.} \quad 0,5: \mathbf{2042.} \quad \ln 2: \mathbf{2043} \quad 2/\pi:$$

$$\mathbf{2044.} \quad 2(2\sqrt{2}-1)/3: \mathbf{2045.} \quad \pi/4: \mathbf{2046.} \quad 1/(p+1): \mathbf{2047.} \quad \pi/6: \mathbf{2049.} \quad 0: \mathbf{2050.}$$

$$-\sin a^2: \mathbf{2051.} \quad 2t\sqrt{1+t^4}: \mathbf{2052.} \quad \frac{3x^2}{\sqrt{1+x^6}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^4}}: \mathbf{2053.} \quad (\sin x - \cos x) \times$$

$$\times \cos(\pi \sin^2 x): \mathbf{2054.} \quad 4x^3 e^{x^8}: \mathbf{2055.} \quad 1: \mathbf{2056.} \quad \frac{\pi^2}{4}: \mathbf{2057.} \quad 0: \mathbf{2058.} \quad 2: \mathbf{2059.} \quad \omega)$$

$5/6$ ;  $p$ )  $t/2$ : **2060.**  $\frac{1}{2} \ln \frac{e}{2}$ : **2061.**  $\pi$ : **2062.**  $4\pi$ : **2063.**  $1$ : **2064.**  $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ : **2065.**  
 $\frac{e^\pi - 2}{5}$ : **2066.**  $\ln 4 - \frac{3}{4}$ : **2067.**  $2\left(1 - \frac{1}{e}\right)$ : **2068.**  $1/6$ : **2069.**  $\ln \frac{3 + \sqrt{6}}{3}$ : **2070.**  
 $\frac{64\sqrt{2}}{15} - \frac{86}{15}$ : **2071.**  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ : **2072.**  $2 \ln \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}{1 + \sqrt{3}}$ : **2073.**  $\sqrt{3} - 1$ : **2074.**  $u) x = \frac{1}{t}$   
 ֆունկցիան  $t = 0$  կետում որոշված չէ;  $p) x = ctgt$  ֆունկցիան  $t = 0$  կետում  
 որոշված չէ: **2075.** Կարելի է: **2079.**  $\ln \frac{\sqrt{5} - 1}{2(\sqrt{2} - 1)}$ : **2080.**  $\ln 2e$ : **2081.**  $\ln \frac{2 + \sqrt{5}}{1 + \sqrt{2}}$ :  
**2082.**  $0$ : **2083.**  $1/6$ : **2084.**  $\frac{3}{8} \ln 2 - \frac{225}{1024}$ : **2085.**  $\frac{3}{5}(e^\pi - 1)$ : **2086.**  $\frac{3\pi}{16}$ : **2087.**  $u)$   
 բացասական է;  $p)$  դրական է;  $q)$  դրական է;  $\eta)$  բացասական է: **2088.**  $u) I_2 - \pi$ ;  
 $p) I_2 - \pi$ ;  $q) I_1 - \pi$ : **2089.**  $u) \frac{1}{(1 + \alpha)^\alpha}$ ;  $p) \frac{1}{2}$ ;  $1$ : **2090.**  $\frac{1}{4\sqrt{2}} < I < \frac{1}{4}$ ;  
 $p) 0,005 \cdot \theta < I < 0,01 \cdot \theta$ ,  $\theta = 1 - e^{-100}$ : **2091.**  $\frac{\theta}{50\pi}$  ( $0 < \theta < 1$ ): **2092.**  $\frac{2}{a}$   
 $(|\theta| < 1)$ : **2093.**  $u) 1$ ;  $p) 2$ : **2094.**  $u) \frac{\pi}{2}$ ;  $p) \sqrt{2}\pi$ : **2095.**  $u) -1$ ;  $p) \pi$ : **2096.**  $u)$   
 $\frac{1}{3e^3}$ ;  $p) \frac{1}{\ln^2 2}$ : **2097.**  $u) \frac{2}{3} \ln 2$ ;  $p) \frac{\pi}{2} - 1$ : **2098.**  $u) 0$ ;  $p) \ln 9$ : **2099.**  $u) \frac{1}{e}$ ;  $p)$   
 $\frac{\pi^2}{8}$ : **2101.**  $u)$  Ջուզամետ է;  $p)$  զուգամետ է: **2102.**  $u)$  Տարամետ է;  $p)$   
 տարամետ է: **2103.**  $u)$  Ջուզամետ է;  $p)$  զուգամետ է: **2104.**  $u)$  Ջուզամետ է;  $p)$   
 տարամետ է: **2105.**  $u)$  Տարամետ է;  $p)$  զուգամետ է: **2106.**  $u)$  Տարամետ է;  $p)$   
 զուգամետ է: **2107.** Ջուզամետ է  $\min\{p, q\} < 1 < \max\{p, q\}$  դեպքում: **2108.**  $u)$   
 $0$ ;  $p) 0$ ;  $q) 0$ ;  $\eta) \pi$ : **2125.**  $\frac{(a-b)(f(b) - f(a))}{2}$ : **2136.**  $u) A$ ;  $p) A$ : **2137.**  
 $5\pi/6$ : **2138.**  $\pi/\sqrt{3}$ : **2139.**  $x + 1/2$ : **2140.**  $1/\ln 2$ : **2142.**  $\Omega$ : **2145.**  $\frac{3}{2}e^{\frac{5}{2}}$ : **2146.**  
 $4n$ : **2147.**  $\pi/2$ , երբ  $|\alpha| \leq 1$ ;  $\pi/(2\alpha)$ , երբ  $|\alpha| > 1$ : **2148.**  $2$ , երբ  $|\alpha| \leq 1$ ;  $2/|\alpha|$ ,  
 երբ  $|\alpha| > 1$ : **2149.**  $\pi^2/4$ : **2150.**  $200\sqrt{2}$ : **2154.**  $u) 8/15$ ;  $p) 32/35$ ;  $q) 35\pi/128$ :  
**2164.**  $I_{m,n} = m!n!/(m+n+1)!$ : **2165.**  $I_n = (-1)^n n!/(m+1)^{n+1}$ : **2166.**

$$I_n = (-1)^n \left[ \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2k-1} \right]: 2167. \quad I_n = (-1)^n \left[ -\ln \sqrt{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right]: 2170.$$

$$\arccos(\cos x): 2171. -\frac{[x]([x]+1)(2[x]+1)}{12} + \frac{x^2[x]}{2}: 2172. \quad \frac{x^2}{2} - x[x] +$$

$$+ \frac{[x]([x]+1)}{2}: 2173. \quad \frac{1}{\pi} \arccos(\cos \pi x): 2174. \quad 14 - \ln(7!): 2175. \quad \ln n!: 2176.$$

$$- \frac{\pi^2}{4}: 2177. \quad 30/\pi: 2186. \quad I_n = n!: 2187. \quad I_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} C_n^k \ln(k+1): 2188.$$

$$I_n = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi a^{n-1} \operatorname{sgn} a}{(ac-b^2)^{n+\frac{1}{2}}}: 2189. \quad I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, \quad \text{երբ } n\text{-ը գույզ է;}$$

$$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!}, \quad \text{երբ } n\text{-ը կենսո է; } 2190. \quad I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \pi, \quad \text{երբ } n\text{-ը գույզ է;}$$

$$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!}, \quad \text{երբ } n\text{-ը կենսո է; } 2191. \quad \text{ա) } -\pi \ln 2/2; \text{ բ) } -\pi \ln 2/2; \text{ գ) } \pi \ln 2/2;$$

$$\text{դ) } -\pi \ln 2/2: 2193. \quad \text{Չուզամետ է, երբ } n > -1: 2194. \quad \text{Չուզամետ է: } 2195.$$

$$\text{Չուզամետ է, երբ } p < 1, q < 1: 2196. \quad \text{Չուզամետ է, երբ } p > -1, q > -1,$$

$$p+q < -1: 2197. \quad \text{Չուզամետ է, երբ } p > -1, q > -1: 2198. \quad \text{Չուզամետ է, երբ}$$

$$p > 1, q < 1: 2199. \quad \text{Չուզամետ է, երբ } p > 1, r < 1 \text{ և երբ } p = 1, q > 1, r < 1: 2200.$$

$$\text{Չուզամետ է: } 2201. \quad \text{Չուզամետ է, երբ } 1 < p < 2: 2202. \quad \text{ա) Չուզամետ է, երբ}$$

$$\alpha > 0; \text{ բ) տարամետ է: } 2203. \quad \text{ա) Չուզամետ է; բ) զուգամետ է: } 2204. \quad \text{ա)}$$

$$\text{Չուզամետ է, երբ } 0 < \alpha < 2; \text{ բ) զուգամետ է, երբ } \alpha > -1: 2206. \quad \text{Պայմանական}$$

$$\text{զուգամետ է: } 2207. \quad \text{Պայմանական զուգամետ է: } 2208. \quad \text{Բացարձակ զուգամետ է,}$$

$$\text{երբ } n < -1, \text{ պայմանական զուգամետ է, երբ } n > 1: 2209. \quad \text{Բացարձակ}$$

$$\text{զուգամետ է, երբ } -1 < (1-p)/q < 0; \text{ պայմանական զուգամետ է, երբ}$$

$$0 \leq (1-p)/q < 1: 2210. \quad \text{Բացարձակ զուգամետ է, երբ } p > -2, q > p+1;$$

$$\text{պայմանական զուգամետ է, երբ } p > -2, p < q \leq p+1: 2211. \quad \text{ա) } \Omega; \text{ բ) } \eta:$$

$$2214. \quad \Omega; 2215. \quad 1/e: 2223. \quad \int_a^b f^p(x) dx: 2243. \quad 1/2: 2245. \quad \int_0^1 \ln f(x) dx: 2246. \quad \text{ա)}$$

$$f(1)/g(1); \text{ բ) } \exp \left( \int_0^1 \ln g(x) dx \right): 2254. \quad 1: 2255. \quad \text{ա) } \pi/4; \text{ բ) } \pi/4; \text{ գ) } -\pi/4; \text{ դ)}$$

0 : 2256.  $\omega) 2 \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$ , երբ  $n = 2m$  ( $m \in \mathbb{Z}_+$ );  $\pi/2$ , երբ  $n$ -ը կենտ է;  $\rho) n\pi$  :

2259.  $\alpha = -\frac{1}{T} \int_1^{1+T} f(t) dt$  :

## Գլուխ 9

2265. 2 : 2266.  $1 - e^{-a}$  : 2267. 1 : 2268.  $\frac{a^2 - 1}{a} - \frac{(a-1)^2}{a \ln a}$  : 2269. 4,5 : 2270.

$1 + \frac{\pi^2}{8}$  : 2271.  $\frac{\pi}{2}$  : 2272.  $2 \ln 2 - 2e^{-1}$  : 2273.  $\frac{5}{3} \sqrt{2}$  : 2274.  $1 - e^{-a^2} (1 + a^2)$  : 2275.

$\frac{1}{12}$  : 2276.  $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}$  : 2277.  $\frac{1}{3} + \frac{2}{\pi}$  : 2278.  $\frac{20}{9} - \ln 3$  : 2279.  $\sqrt{2} - 1$  : 2280.  $\frac{2\pi + \sqrt{3}}{3}$  :

2281.  $\frac{37}{48}$  : 2282.  $\pi ab$  : 2284.  $\frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1)$  : 2285.  $4\sqrt{2} + \ln \frac{9 + 4\sqrt{2}}{7}$  : 2286.

$4 + \frac{\ln 3}{4}$  : 2287.  $\ln 3$  : 2288.  $3 + \ln 2$  : 2289.  $\ln(2 + \sqrt{3})$  : 2290.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  : 2291. 26 :

2292.  $6a$  : 2293.  $8a$  : 2294.  $a(2\sqrt{5} + \ln(2 + \sqrt{5}))$  : 2295.  $10a$  : 2296.  $\frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{b} \times$

$\times (e^{\pi b} - 1)$  : 2297.  $\frac{aT^2}{2}$  : 2298.  $0,5(ch^{\frac{3}{2}}(2T) - 1)$  : 2299.  $2\sqrt{5}\pi a$  : 2300.  $2shT$  :

2301.  $\frac{\sqrt{3}}{21} (27 - 2\sqrt{2})$  : 2302.  $\sqrt{5}(e^{2\pi} - 1)$  : 2303.  $\sqrt{a^2 + b^2} shT$  : 2304. 2,5 : 2305.

$\pi a \sqrt{1 + 4\pi^2} + \frac{a}{2} \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2})$  : 2306.  $\frac{1}{3} ((\pi^2 + 4)^{\frac{3}{2}} - 8)$  : 2307.  $\pi a$  : 2308.

$8a$  : 2309.  $\frac{1}{8} (2\pi + 3\sqrt{3})$  : 2310.  $\frac{1}{3} \pi r^2 h$  : 2311.  $\frac{1}{3} \pi h (R^2 + rR + r^2)$  : 2312.  $\frac{4}{3} \pi R^3$  :

2313.  $\frac{3}{7} \pi$  : 2314.  $\frac{\pi^2}{4}$  : 2315.  $\frac{\pi(\pi - 2)}{4}$  : 2316.  $4\pi$  : 2317.  $\frac{\pi^2(4\pi^2 - 15)}{24}$  : 2318.

$\frac{\pi}{2} (e^6 - 43)$  : 2319.  $\frac{\pi}{2}$  : 2320.  $\frac{4}{3} \pi ab^2$  : 2321.  $\frac{49}{3} \pi$  : 2322.  $\pi \left( \sqrt{2} - \frac{\sqrt{e^2 + 1}}{e^2} - \right.$



$$\begin{aligned}
& -\ln \frac{1+\sqrt{1+e^2}}{e(1+\sqrt{2})} \Big): \mathbf{2323.} \quad 2\pi(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})): \mathbf{2324.} \quad \pi \left( \sqrt{2} + \ln \frac{\sqrt{17}+4}{\sqrt{2}+1} - \right. \\
& \left. - \frac{\sqrt{17}}{4} \right): \mathbf{2325.} \quad \frac{196}{9} \pi: \mathbf{2326.} \quad \frac{\pi}{9}(20+9\ln 3): \mathbf{2327.} \quad \frac{\pi}{144} \left( 185+144 \ln \frac{3}{2} \right): \mathbf{2328.} \\
& \frac{\pi}{8}(sh4-4e^{-2}): \mathbf{2329.} \quad 4,5: \mathbf{2330.} \quad \frac{ab}{6}(3\sqrt{3}-\pi): \mathbf{2331.} \quad 1,6: \mathbf{2332.} \quad \text{u) } 2,25; \text{ p) } \\
& 2,25: \mathbf{2333.} \quad k=p: \mathbf{2334.} \quad \left( \frac{p}{2}; \pm p \right): \mathbf{2335.} \quad \pi ab: \mathbf{2336.} \quad \frac{3\pi}{8} a^2: \mathbf{2337.} \quad \frac{8a^2}{3}: \mathbf{2338.} \\
& 8/15: \mathbf{2339.} \quad 3\pi a^2: \mathbf{2340.} \quad a^2(4\pi^3+3\pi)/3: \mathbf{2341.} \quad 7\pi a^2/192: \mathbf{2342.} \quad (e^{4\pi k}-1) \times \\
& \times L^2/4k: \mathbf{2343.} \quad 3\pi a^2/2: \mathbf{2344.} \quad \pi P^2/(1-\varepsilon^2)^{\frac{3}{2}}: \mathbf{2345.} \quad \text{u) } 2/3; \text{ p) } \\
& (1-\ln 2+\pi/\sqrt{3})/2: \mathbf{2346.} \quad a^2/6: \mathbf{2347.} \quad a^2/60: \mathbf{2348.} \quad \pi a^2/8\sqrt{2}: \mathbf{2349.} \quad 3\pi a^2/8: \\
& \mathbf{2350.} \quad \pi a/\sqrt{2}: \mathbf{2351.} \quad 7\pi a^2/512: \mathbf{2352.} \quad 2\pi a/3: \mathbf{2353.} \quad a(1-\sqrt{2}/2): \mathbf{2355.} \quad \pi^3/3: \\
& \mathbf{2356.} \quad 6a: \mathbf{2358.} \quad 7/3: \mathbf{2359.} \quad 1: \mathbf{2360.} \quad ((R+4)^{\frac{3}{2}}-8)/3: \mathbf{2361.} \quad shR: \mathbf{2362.} \quad 8: \\
& \mathbf{2363.} \quad a \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2}+1)+1 \right): \mathbf{2364.} \quad 4 \frac{a^2+ab+b^2}{a+b}: \mathbf{2366.} \quad 9\pi: \mathbf{2367.} \quad \pi(1-\sin 1): \\
& \mathbf{2368.} \quad 128\pi/15: \mathbf{2369.} \quad \pi a^3(\ln 2-0,5): \mathbf{2370.} \quad 3\pi \ln 3(2\ln 3-1): \mathbf{2371.} \quad \text{u) } 32\pi a^3/105; \\
& \text{p) } 3\pi^2 a^3/4: \mathbf{2372.} \quad \text{u) } 16\pi a^3/15; \text{ p) } \pi^2 a^3/2; \text{ q) } 16\pi a^3/3; \text{ n) } 16\pi a^3/3: \mathbf{2373.} \quad \text{u) } \\
& 5\pi^2 a^3; \text{ p) } 6\pi^3 a^3; \text{ q) } 7\pi^2 a^3: \mathbf{2375.} \quad 8\pi a^3/3: \mathbf{2376.} \quad 2a^3\pi^2(\pi^2-6)/3: \mathbf{2378.} \quad \text{u) } \\
& 64\pi a^2/3; \text{ p) } 16\pi^2 a^2: \mathbf{2379.} \quad \text{u) } 18\pi^2 a^2; \text{ p) } 24\pi a^2: \mathbf{2380.} \quad \text{u) } \pi/2; \text{ p) } 10\sqrt{2}\pi/3: \\
& \mathbf{2382.} \quad 32\pi a^2/5: \mathbf{2383.} \quad 4\pi^2 a^2: \mathbf{2384.} \quad 4\pi \left( a^2 + \frac{2}{3}b^2 - \frac{b^4}{5a^2} \right): \mathbf{2385.} \quad \text{u) } \\
& 2\pi a^2(2-\sqrt{2}); \text{ p) } 2\sqrt{2}\pi a^2; \text{ q) } 4\pi a^2: \mathbf{2386.} \quad M_x = \frac{b}{2}\sqrt{a^2+b^2}, M_y = \frac{a}{2}\sqrt{a^2+b^2}: \\
& \mathbf{2387.} \quad M_x = b \left( b + \frac{a^2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a} \right), M_y = 0: \mathbf{2388.} \quad M_x = M_y = \frac{3}{5} a^2: \\
& \mathbf{2389.} \quad M_x = \frac{32a^2}{3}, M_y = 8\pi a^2: \mathbf{2390.} \quad x_c = y_c = \frac{2a}{5}: \mathbf{2391.} \quad x_c = \pi a, y_c = \frac{4a}{3}:
\end{aligned}$$

**2392.**  $\frac{1}{3} \left( (1+e)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2} \right)$ ; **2393.**  $\pi R(2a^2 + R^2)$ ; **2394.**  $M_x = \frac{\pi}{4}$ ,  $M_y = 0$ ; **2395.**  
 $M_x = M_y = \frac{3}{20}$ ; **2396.**  $x_c = 0$ ,  $y_c = \frac{4R}{3\pi}$ ; **2397.**  $x_c = y_c = \frac{9p}{10}$ ; **2398.**  $\frac{ah^3}{3}$ ;  
**2399.**  $8a^4/7$ ; **2400.**  $f$  -ը և  $g$  -ն նշանները չեն փոխում և գոյություն ունեն այն-  
 պիսի  $\alpha$ ,  $\beta$  թվեր, որ  $\alpha f(x) \equiv \beta g(x)$  և  $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ ; **2401.**  $\varphi(a) = b$ ; **2402.**  
 $f(x) = \frac{b}{a}x$ ; **2404.**  $f(x) = cx^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}$  ( $c > 0$ ); **2405.**  $\frac{a}{\sqrt{3}}$ ; **2406.**  $e^{2\pi k}$ ; **2408.**  
 $f(x) = cx^{\frac{1-\lambda}{2\lambda}}$  ( $c > 0$ ); **2411.**  $S = 6\pi ad$ ,  $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^2 d}{2}$ ; **2412.**  $x_c = 0$ ,  $y_c = \frac{2R}{\pi}$   
 (կիսաշրջանագիծ);  $x_c = 0$ ,  $y_c = \frac{4R}{3\pi}$  (կիսաշրջան); **2413.**  $x_c = \pi a$ ,  $y_c = \frac{5a}{6}$ :

## Բ ո վ ա ն դ ա կ ու թ յ ու ն

|   |     |
|---|-----|
| Երկրորդ հրատարակության նախաբան  | 3   |
| Առաջին հրատարակության նախաբան   | 4   |
| Գլուխ 1. Թվային բազմություններ, տարրական ֆունկցիաներ                          | 6   |
| Գլուխ 2. Թվային հաջորդականություններ  | 30  |
| Գլուխ 3. Ֆունկցիայի սահման  | 53  |
| Գլուխ 4. Անընդհատ ֆունկցիաներ, հավասարաչափ անընդհատություն                    | 73  |
| Գլուխ 5. Ֆունկցիայի ածանցյալ  | 92  |
| Գլուխ 6. Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները,<br>ածանցյալի կիրառությունները | 120 |
| Գլուխ 7. Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ                                   | 158 |
| Գլուխ 8. Ռիմանի ինտեգրալ, անխսկական ինտեգրալներ                               | 179 |
| Գլուխ 9. Ինտեգրալի կիրառություններ  | 212 |
| Պատասխաններ   | 225 |

Գ. Գ. Գևորգյան Լ. Հ. Գալստյան Ա. Կ. Թալալյան  
Գ. Վ. Միքայելյան Կ. Ա. Նավասարդյան

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ  
ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ

Առաջին մաս

Չորրորդ լրամշակված  
հրատարակություն

Համակարգչային ձևավորումը՝ Կ. Չալաբյանի  
Կազմի ձևավորումը՝ Ա. Պատվականյանի  
Տեխ. խմբագիր՝ Լ. Հովհաննիսյան

Չափսը՝ 60x84 1/16: Տպ. մամուլ 16,75:  
Տպագրությունը՝ օֆսեթ:  
Տպաքանակը՝ 300 օրինակ:

